



W. C. 64³

16028 / B

Vol 1

Vols 1 2 3 only





Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

GENEESKUNDIG
HANDBOEK.

EERSTE DEEL,

Quo communior autem morbus, frequentiorque est febris, eo intricatiorem esse ejus Theoriam, et consequenter empiricam in plurimis esse praxin, confirmat scriptorum medicorum dissensus; ita ut ne binos quidem exacte sibi consentientes in hoc puncto inveniatis, ut propterea ab alio in iisdem erudiri potius, quam sententiam aut, meam proferres, alios informare vellem.

MICHAËLIS ETTMULLER, *Opera Medica*, Tom. secund, pag. 488, Sect. XV. ed. Geneve, 1736.

GENEESKUNDIG HANDBOEK

VOOR

BEGINNENDE KUNSTOEFENAREN,

Bekroond door het geneeskundig gezelschap

onder de Zinspreuk:

UVO A.V.MO

te Amsterdam

DOOR

W. F. BÜCHNER

MED: CHIRURG: EN STADS DOCTOR TE GOUDA,


*Lid van het provinciaal Utrechts genoot-
schap van Kunsten en Wetenschappen,
van het genootschap ter bevordering
der Heelkunde te Amsterdam, enz.*



Te AMSTERDAM, bij

R. J. BERNTROP,

MDCCCXXI.





V O O R B E R I G T.

Gewoon, eenige der weinige uren, die eene uitgebreide praktijk mij nog overlaten, te besteden tot het onderwijzen van leerlingen in de Heelkunde, vervaardigde ik eene beknopte aanwijzing ter geneeskundige behandeling der meest voorkomende ziekten, om ten leiddraad bij mijne voorlezing te strekken, zonder voornemen van dezelve immer het licht te doen zien; dan ik veranderde van voornemen, totn mij inden jare 1817 het Programma van het Geneeskundig gezelschap onder de zinspreuk Uno Animo te Amsterdam, in handen kwam, waarin gevraagd werd de vervaardiging van een beredeneerd „Geneeskundig Handboek, in het Nederduitsch geschreven, rustende op de Natuur- en „Ziektekunde van den Mensch, en inhoudende eene „volledige beschrijving van de meest voorkomende ziekten, van derzelver oorzaken, kenteekenen, loop, „toevallen en eenvoudige manier van behandeling. Overtutgd van de nuttigheid van zoodanig een handboek, en begeerig, om tot het doel van het verdienstelijk gezelschap mede te werken, namelijk om tot uitbreiding der kunst en het heil des Vaderlands iets toe te brengen, besloot ik mijne zwakke krachten

te beproeven, en mijne handleiding volgens het doel des gezelschaps nader te bearbeiten, en uit te breiden; de kortheid des tijds echter veroorloofde mij slechts het eerste deel, de behandeling der koortsen bevattende, ter mededinging na den uitgeoefden prijs in te zenden.

In de maand, Mei van het jaar 1818 had ik het genoegen te ondervinden, dat het gezelschap Uno Animo mijnen arbeid met zijne goedkeuring ver eerde, en het ingezonden stuk, als het doel des gezelschaps het naastbijkomende den uigeloofden prijs waardig keurde; onder voorwaarde echter, dat het ontbrekende overeenkomstig het ingezonden gedeelte zoude worden bearbeid, en aan de beoordeeling des gezelschaps voldoen.

Edelmoedig deedt het gezelschap ten mijnen voordeele afstand van het regt van eigendom, bij de prijsuitlooving bedongen; onderscheiden onvoorziene oorzaken hebben de uitgaven van dit eerste deel, dat reeds in het jaar 1819 het licht had moeten zien, tot op dit oogenblik vertraagd. Smartelijk valt mij, onder dezen het afsterven van de helft der leden van Uno Animo te moeten tellen. Dit gezelschap, bij de bekrooning van dit werk bestaande uit de Heeren E. F. WILLET M. D., N. W. RAUWENHOFF M. D., A. BIESTERBOS M. D., A. BONN M. D. Anat. en Chir. Prof., G. BROEKMAN M. D., D. SWARTS M. D. H. HAAKMAN M. D. PH. H. THIEMMEN M. D. verloor in weinigen tijd de verdienstelijke mannen RAUWENHOFF, BONN, BROEKMAN en WILLET. Ik zie mij daardoor verstoken van hen, nevens de overgebleven le-

leden mijnen dank te betuigen, voor het in mij ge-
feld vertrouwen, hunne namen echter zullen mij
in dankbare nagedachtenis blijven.

Wanneer ik het door mij afgehandeld gedeelte
der geneeskunde naga, en overweeg hoeveel er
nog ter behandeling overschied, moet ik erken-
nen, dat mijn werk in breedvoerigheid de gren-
zen van een handboek verre weg overtreft. Dan
de moeilijkheid gevoelende om de noodige duidelijk-
heid, met de gewenschte kortheid te paren, ja
daarvan de onmogelijkheid ontwarende, heb ik al-
thans de eerste niet aan de laatste willen opofferen,
en ik vlij mij, dat mijne wijdloopigheid, meer zal-
worden toegeschreven, aan veelheid van zaken,
dan aan herhaling van overbodige woorden.

De moeilijkheid van eene keuze te doen tusschen
die ziekten, welke zeer dikwijls, en die welke zel-
den voorkomen, deze of geene al of niet te behan-
delen, zonder een onvolkomen geheel te leveren,
en de behoefte vooral van de scheeps en platte-
lands-heelmeesters deden mij besluiten tot het meer
of minder breedvoerig behandelen van alle bij ons
voorkomende ziekten, om aldus een geheel te le-
veren, waarin ieder min geoefende eenige aan-
wijzing kan vinden; daar toch mijn werk volgens
het doel des gezelschaps *Uno Animo* vooral hun,
tot eene verbeterde geneeskundige behandeling,
moest leiden, welke het aan een geregeld onderwijs
heeft ontbroken.

De hulpmiddelen, waarvan ik mij bij de bearbei-
ding van dit werk bediend heb zijn de meest geach-
te In- en Uitlandsche Geneeskundige Handboeken,

en de bijzondere beschrijvinvingen van sommige ziekten. Aan deze heb ik getracht, die kennis te paren, welke ik hoop door eige ervaring verzameld te hebben, gedurende mijne twintig-jarige geneeskundige praktijk zoo in de militaire hospitalen, als in de burgerlijke zamenleving.

De heeren boekbeoordeelaars zullen ondervinden dat ik alle bescheiden teregtwijzigingen, niet alleen dankbaar zal aannemen, maar ook bij de volgende deelen, ten nutte van mijn werk zal trachten aan te wenden, echter reken ik op de toegewendheid der kunstregters, daar in het Nederduitsch geen geneeskundig werk, in aanleg met het mijnen overeenkomende bestaat, en mijn taak dus zoo veel moeilijker moest zijn, en veel te wenschen en te verbeteren zal overlaten. De afwezigheid der drukpers en mijn landaard, die zich bij de beste wil en de meeste inspanning niet laat verloochenen, hebben veroorzaakt, dat vele drukfijlen zijn blijven staan, want ook in de correctie der proeven, heb ik grievende teleurstelling ondervonden, de meest zinslorende fouten zijn op een bijgevoegd blad aangewezen en verbeterd, voor de overige verzoek ik de toegewendheid van den bescheiden beoordeelaar en lezer.

Een gunstig onthaal van mijnen arbeid, waarvan een ieder de moeilijkheid zal erkennen, zal hoop ik mij aanmoedigen, om mijnen taak verder te volvoeren.

W. F. BÜCHNER.

Gouda, den 1 November 1821.

I N L E I D I N G.

De Kunst van ziekten te genezen, is eene wetenschappelijke, op ervaring en redenering gegronde kunst. Dezelve kan alleen verkregen worden, door zieken naauwkeurig en zonder vooroordeelen waar te nemen, en de fchriften van die Geneesheeren vlijtig te beoefenen, welke aan de natuur getrouw, de beelden van onderscheiden ziekten geschetst hebben. Het vermogen, om oordeelkundig het waargenomene te beredeneren, is een aangeboren vermogen van den geest, dat door oefening wel voor beschaving, uitbreiding en volmaking vatbaar is, maar nimmer door hem, die het minst kan verworven worden. De zaak uit dit oogpunt beschouwd, is het meermalen herhaalde gezegde waar: dat even min een Arts, als een Dichter gekweekt, maar geboren wordt. Waarnemen zonder oordeel, en zonder de gave van het waargenomene juist te beoordeelen en toe te passen, leidt tot blinde navolging (*Empirie*). Afgetrokken denkbeelden, als grondbeginfelen ter verklaring der ziekten vast te stellen, alles aan de daar uit afgeleide regels te onderwerpen, en op de genezing der ziekte toe te passen, baart herfenschimmen, die in een doolhof voeren, waarin men te vergeefs de draad van *Ariadne* zoekt; de kunst gaat daarbij achteruit, de Genees-

heer wordt een Phantast, en het leven der ingezetenen staat op het spel.

Het doel der Geneeskunst is, ziekten te verhoe- den en te genezen; en waar zij in deze bedoeling te kort schiet, het lijden der zieken te lenigen. Zij is de edelste aller kunsten, want zij streeft alleen na het goede, en komt voor, of lenigt op alle mogelijke wijze, de rampen die het menschelijke ge- flacht bedreigen en treffen, zij zorgt voor de onge- boren vrucht en voor den afgeleefden grijsaard, voor den armen niet minder als voor den rijken; voor den gebieder der aarde en voor den misdadigen, uit de maatschappij gebannen mensch; allen hebben bij haar gelijke regten, aan allen deelt zij hare welda- den uit.

Hij alleen verdient den naam van Arts, die den geheel en omvang der geneeskunst en hare hulpmid- delen kent, en weet dezelve aan te wenden, om zieken te genezen. Hij, die zonder deze kundighe- den de behandeling van zieken onderneemt, is mis- dadig, want hij bezigt middelen, waarvan hem de krachten en uitwerkfelen, onbekend zijn, en hij brengt het leven van anderen opzettelijk in gevaar.

De geneeskunde is een tak der natuurkunde, waar- van zij onscheidbaar is, want zij grondt zich even als deze, op ervaring door een gezond oordeel uit waarnemingen getrokken. Beide houden derhalve ook eenen gelijken tred. De geneeskunde wint, waar de natuurkennis uitgebreid en met nieuwe ont- dekkingen verrijkt wordt, en daalt waar deze van den regten weg afdwaalt. De natuur gade te slaan
en

en na te sporen, gelijk zij zich in hare gewrochten, bij de gezonden en zieken, ter waarneming aanbiedt, het waargenomene te vergelijken, het gelijkfoortige oordeelkundig zamen te voegen, het ongelijkfoortige te schiften, de wetten voor het een uit het ander te vinden, eenheid daar te stellen, waar alles verscheidenheid schijnt aan te wijzen, van het kleine tot het groote op te klimmen, daaruit algemeene regelen af te leiden, en deze te toetsen, zoowel aan de algemeene wetten der natuur uit de ervaring afgeleid, als aan de regelen gegrond op de waarnemingen van geloofwaardige mannen, in de gedenkschriften der geneeskunst bewaard, leert den weg kennen, die de heilzame kunst inslaat, om zich te volmaken. Om een waardig Arts te zijn, worden behalve de algemeene kundigheden, de vruchten eener beschaafde opvoeding, volledige kennis van den geheelen omvang der natuurkundige wetenschappen gevorderd; de Arts moet gewoon zijn wijsgeurig te denken, vrijmoedigheid en sterkte van geest bezitten, om te twijfelen, waar overtuigende gronden ontbreken; aan den Geneesheer past even min een blindt geloven, als aan den natuuronderzoeker.

De groote vorderingen, die de natuurkundige wetenschappen, sedert de laatste helft der jongst verloopene eeuw maakten, hebben ook de geneeskunst tot eenen hooger trap doen opklimmen. Jammer echter dat, de gedurige afwisselende wijsgeerige twisten, en de zucht van telkens nieuwe stelsels op te bouwen, de voortgang der geneeskunde belemmerden.

Op goede gronden mag men beweren, dat de hedendaagsche geneeskunde op een hooger stand-

punt staat, als die der vorige eeuwen. Vele vooroordeelen zijn verdwenen, vele dwalingen erkend en verbeterd, door de meerdere uitbreiding en volmaking der natuur- en ontleedkundige kennis van het menschelijke ligchaam, zoowel in daszelfs gezonde als zieke toestand. De ziektekunde wentelt niet meer om, op uit de lucht gegrepen oorzaken der ziekten, maar steunt op beginselen uit het leven zelve, zoo als het zich in zijne afwijking vertoont, afgeleid; de krachten der bewerktuigde en levende natuur, hare wijzigingen en veranderingen, door uit- en inwendig werkende oorzaken voortgebracht, met inachtneming en onderscheiding van het noodwendige en toevallige, leveren de stof voor hare bemoeijingen. De kennis der geneesmiddelen, steunt op derzelve natuurkundige eigenschappen, en niet meer gelijk voorheen, op ingebeelde krachten, die vooroordeel en bijgeloof daarin gelegd hadden. Eene menigte nuttelooze geneesmiddelen, zijn uit derzelve rei verbannen; de vermogende kent men beter, en de wijze van bereiding en toediening rust op natuur- en scheikundige beginselen. De behandeling der ziekten is vereenvoudigd en verbeterd; de kunst om heerschende ziekten te verhoeden en te beteugelen, is door toepassing der natuur- en scheikundige vorderingen, van een naauwelijks ontkiemd plantje, tot eene heerlijke vrucht-dragende boom opgekweekt. Vele ziekten, die voorheen, volgens haren aard, onbekend waren, heeft men leeren kennen; ongeneesbare leerde men genezen, en andere tot heil der lijdende menscheid beteugelen en lenigen. De scheikunde op de leer der ziek-

ten

ten toegepast, heeft menige duistere zaak opgehelderd, en tegen de zwaarste ziekten, vermogende geneesmiddelen aan de hand gegeven, die voorheen onbekend waren.

De meer uitgebreide kennis der onderscheiden volken op den aardbodem verbreid, de vruchten der pogingen van geleerde reizigers, die zich vrijwillig de grootste opoffering getroost hebben, werkten insgelijks mede tot uitbreiding, onderwijzing en verbetering der geneeskunde. Maar bovenal heeft de beoefening der ziektenkundige ontleding, een fakkel op den weg ter veredeling der ziektekunde ontstoken.

De onderscheiden stelsels, die tegenwoordig in de geneeskunst heerschen, zijn gegrond, op een willekeurig aangenomen levensbeginsel, op natuur-wijsgerige en bovennatuurkundige stellingen, waarin de magnetische, electriche en galvanische vloeistoffen de hoofdrollen spelen; of op de toepassing der scheikunde ter verklaring van het leven, gezondheid, ziekte en derzelver genezing. Dan, de voornaamste Geneeskundigen in alle beschaafde landen stemmen hierin overeen, dat iedere stelselmatige bearbeiding der geneeskunst, om haar eene wetenschappelijke zekerheid te geven, voor het tegenwoordige nog een ijdele onderneming is, en dat alle daarop gegronde toepassingen aan het ziekbed, door de uitkomsten worden gelogenstraft; dat integendeel de geneeskunde alleen in zooverre de naam eener wetenschap kan verdienen, als zij het weten van eene menigte verschijnselen, waarin zich de natuur in de staat van gezondheid en ziekte aan

onze zinnen ter waarneming aanbiedt, tot hare aanleering en beoefening noodig heeft. Hierom ging ik de onderscheidene stelsels, zonder in breedere ontwikkelingen te treden, met stilzwijgen voorbij; te meer nog, daar de onderscheidene stelsels van de latere tijden, in de Nederlanden dien algemeenen bijval niet vonden, waarmede zij in andere landen opgenomen werden, en flecht hier en daar eenen aanhanger hadden en behielden; terwijl de Nederlandsche geleerden onafgebroken den weg der ervaring, door de rede voorgelicht, bleven bewandelen, en door hunnen arbeid tot hare volmaking medewerkten.

Algemeene regels, die men bij de beoefening der geneeskunst niet moet uit het oog verliezen, zijn de navolgende: Men make zich een juiste kennis van den zieken toestand in het algemeen en van iedere ziekte in het bijzonder eigen; gelijk de natuuronderzoeker, die ieder voorwerp voor zich, in alle zijne kenteekenen, eigenschappen, betrekkingen en krachten opspoort, zoo moet ook de geneeskundige trachten, zich de kennis van iedere ziekte te vernieuwen, en gene gelegenheid, die zich aanbiedt, laten voorbijgaan, om de natuurlijke loop en uitslag eener ziekte aan zich zelve overgelaten te leeren kennen; want de natuur geneest vele ziekten, door haar eigen kracht spoedig en zeker, die door de kunst moeilijk, gevaarlijk en langdurig gemaakt werden; terwijl in andere de genezende krachten der natuur te kort schieten, en de bijstand der kunst behoeven. De afwachtende en werkdadigen geneeskunst, gronden zich op dit onderscheid. Men lette naauwkeurig bij iederen ziekte op den aard der

oorzaken die haar voortbragten, op de wijze hoe zij werkten, welk stelsel of deel der bewerktuiging aan haren schadelijken invloed het meest bloot stond, welke veranderingen zij daardoor leden, en welke verschijnselen en toevallen eigendommelijk, en welke toevallig of afgeleid zijn. Men onderscheide wat noodwendig is, van datgeen, wat tot het wezen der ziekte niet behoort. Men spore de verborgene oorzaken in de aanwezige verschijnselen zoo veel mogelijk op, en beoordeel de haren schadelijken invloed niet eenzijdig, maar in haren geheele omvang, door alle de hulpmiddelen te baat te nemen, die de natuur en ziektekunde en de ziektekundige ontleding van het menschelijke ligchaam aan de hand geven.

Bij de behandeling der zieken, volge men steeds bepaalde aanwijzingen, gegrond op de algemeene regels der ervaring, met toepassing op de bijzondere en individuele gesteldheden. Eerst wanneer ons deze verlaten, staat het den arts vrij den Empirischen weg, doch niet blindeligs, maar beredeneerd te betreden; het zij door vergelijkingen tusfchen gelijkfoortige en ongelijkfoortige gevallen, tot gids te nemen, of door middelen te bezigen, die hunne bekende krachten en uitwerkfels, aan de gewerkt hebbende oorzaken, of aan de gevolgen eener ziekte tegengesteld zijn; fomwijlen wijst ons de natuur, als het ware, instinctmatig den weg aan, die wij volgen moeten.

De aanwijzing voor de behandeling der oorzaken, heeft ten doel, dezelve op te ruimen, waar zij nog aanwezig zijn, of hare uitwerkfels regtstreeks tegen de werken en weg te nemen. Zij maakt in vele
ziek

ziekten het wezenlijkste deel der behandeling en der genezing uit. In anderen daarentegen vermag de kunst niets tegen de oorzaken, en kan alleen tegen derzelver uitwerkfels in het werk gesteld worden. Steeds alleen de oorzaken te willen bestrijden kan, voor den zieken verderfelijk zijn, daar vele oorzaken zoo kortstondig en plotseling haren nadeligen invloed op het menschelijke ligchaam uitoefenen, dat zij reeds hebben opgehouden te werken, wanneer de hulp der kunst kan toegediend worden. De ziekten volgens hare naam te behandelen, geeft eene algemeene regel voor de geneeswijze, die men bezigen moet, maar is hoogst schadelijk en verderfelijk, wanneer men daarop alleen vertrouwt, zonder acht te slaan op de bijzondere gesteldheden der lijders, op de Epidemische en jaars-gesteldheden, en de wijzigingen, die de ziekten, zoo door deze, als andere toevallige omstandigheden ondergaan, of de genezing altijd en overal met dezelfde middelen onderneemt; wie zoodanig handelt, is niet beter als een blind Empikus.

Ook de toevallen zijn niet uit het oog te verliezen, en hunne behandeling geeft eene andere niet minder belangrijke aanwijzing aan de hand. Volgens het gevaar, dat zij dreigen en insluiten, moeten zij te gelijk met de ziekte, of waar het gevaar zeer groot is, ook met ter zijde stelling van deze, bestreden, worden. Maar de middelen, die men aanwendt, behooren zoo veel slechts mogelijk is, met de algemeene aanwijzing ter genezing in verband te blijven, en daarmede niet strijdig te zijn. Tegen ieder toeval terstond een bijzonder middel te bezigen, zonder het verband in aanmerking te nemen, dat er tusschen het

het toeval en de ziekte bestaat, is eene geneeswijze die gebrek aan de nodige kennis verraad, en veel kwaad berokkend.

De geneesmiddelen, waarvan zich de arts bediend, moet hij grondig kennen, volgens hunne natuur- en scheikundige eigenschappen, de wijze hoe zij op de bewerktuiging inwerken, deze tot wederwerking brengen en veranderen; en volgens datgene wat de ervaring van andere geneeskundigen, omtrent derzelver nuttigheid in bepaalde gevallen, geleerd heeft. De geschiedenis van ieder geneesmiddel moet ons bekend zijn. Het is beter weinige geneesmiddelen, die men kent, te gebruiken, als vele toe te dienen, waarmede men geheel niet, of slechts ten halve bekend is. Men aarzele niet nieuwe geneesmiddelen te bezigen, als zij het gezag van geloofwaardige en ervaren mannen voor zich hebben; vooral in ziekten waartegen ons de gewone middelen verlaten; maar men volge niet iedere geneeswijze na, zoo ras men ter loops er iets van gehoord heeft; noch bezige ieder middel dat hier of daar voor bijzonder nuttig aanbevolen wordt, in ziekten waartegen ons goede en beproefde middelen bekend zijn. Men verwachte niet dat er een middel zij, geschikt alle lijders, door dezelfde ziekte aangetast, te genezen, want ook de meest vermogende, die bijna den naam van specifica verdienen, verlaten ons in enkele gevallen, en hunne nuttigheid of werkeloosheid hangt dikwijls van individuele en andere toevallige omstandigheden af, die men steeds met alle mogelijke oplettendheid moet gadeslaan. Middelen, die met al te grooten ophef en als onfeilbaar tegen zware en moeilijke ziek-

ten worden aangeraden, houde men steeds verdacht, en bediene er zich niet van, voor dat zij van meer ervaren mannen gunstige getuigenissen voor zich hebben en ook dan nog niet ligtvaardig, maar met de noodige omzigtigheid. Ook in de zoodanige middelen, die volgens hunne natuur- en scheikundige eigenschappen, weinige of gene geneeskundige krachten bezitten, stelle men geen vertrouwen, wanneer zij tegen ziekten worden aangeprezen, die na haren aard en de gewrochte veranderingen in de bewerktuiging voor ongeneesbaar te houden zijn. Bij ziekte, die voor als nog ongeneesbaar aan te merken, maar welkers geneesbaarheid niet voor volstrekt onmogelijk te houden is, vordert de plicht van den geneesheer, alle middelen, die daar tegen aangeraden worden omzigtig te beproeven, ten einde niets verzuimd worde, zonder echter te schaden, waar men niet helpen kan. Het staat den arts als dan vrij ook zelve middelen uit te denken, mits dat men op Analogische gronden daaraan een genezend vermogen mag toeschrijven. Op deze wijze zijn gewigtige ontdekkingen in het gebied der geneeskunst gedaan, men denke slechts aan het kwikzilver in venerische ziekten. Tegen huidziekten en melaatsheid had men het lang voor de verschijning der *lues Venerea* in Europa, in meerfelts met goed gevolg gebezigd; de uitbotting van huidziekten bij venerischlijders, deed het besluit geboren worden, ook tegen deze de kwikbereidingen aan te wenden. De vruchten dezer op Analogische gronden ondernomene geneeswijze, zijn in hare heilrijke gevolgen te algemeen bekend, om er breder van te spreken.

Door

Door oefening in het beschouwen van zieken, kan men zich eenen vasten blik eigen maken, om in het eerste oogenblik, dat men een zieken ziet, zijne ziekte op het spoor te komen. Oordeelkundig waarnemen der gelaatstrekken, van het voorkomen en de houding der lijders, die aan de meeste ziekten eene eigenaardig gekenschetste physionomie geven, is het middel om zich dien practischen blik of tact eigen te maken, die aan hem, die er bezitter van is, veel boven den ongeoeffenden vooruit geeft. De eerste vragen die men aan den lijder doet, wekken zijn vertrouwen, als zij met zijne ziekte in verband staan, en eene voorloopige kennis van zijnen toestand verraden. De jonge Geneesheer gewenne zich, op eene geregelde en bescheidene wijze zijne zieken te ondervragen; hij doorloope bij het eerste bezoek alles, wat tot kennis der ziekte leiden kan, bij de volgende vermijde hij allen onnoodigen omflag, en bepalen zich tot het gewigtigste; het belangrijke neme hij eerst, het min belangrijke het laatst in aanmerking; vermijde zoo veel mogelijk onnoodige vragen, veroorloven zich nimmer onbescheiden te zijn, noch dubbelzinnige gezegdens, die beleedigen, en tot ontdekkingen en vermoedens bij anderen kunnen aanleiding geven, die het geluk en de rust van bijzondere personen of geheele familien verwoesten. De geheimen der lijders moeten den arts heilig zijn, hij moet naar niets vragen, dat met de ziekte in geen verband staat, noch in familiezaken trachten in te dringen. Waar hij genoodzaakt is na dingen te vragen, die de lijder opzettelijk verzwijgt en geheim houdt, doet hij zulks in een gunstig oogenblik, waarin hij zich met

met den lijder alleen bevindt, op eene beschaafde en kiefche wijze. De bijzondere huisfelijke omftandigheden moet de Geneesheer niet veronachtzamen, want zij ontfteken dikwijls een groot licht voor de kennis der ziekten en hunne oorzaken; maar ongemerkt, en met geen ander inzicht, als om den lijder nuttig te zijn, make men zich met alle die omftandigheden bekend; en neme een diep ftilzwijgen omtrent datgene, wat men ontdekt heeft, in acht.

Ik koester de wensch, van den Heelmeester ten Platte Land en ter Zee eenige handleiding te geven, ter behandeling der inwendige ziekten, en hun bekend te maken met de verbeterde handelwijze der geoefendfte Geneesheren. Ik heb mijn werk in vier deelen gefplitst, het eerfte Deel, dat thans het licht ziet, bevat de *koortfen* zoo in het algemeen als in het bijzonder. Ik heb mij daarin veroorloofd alle koortfen, zoo als zij voorkomen, en door eene reeks van eigene toevallen de gedaante van bijzondere ziekte-vormen aannemen, bij een te brengen, met ter zijde ftelling van verdeelingen, alléén op leerftellige befpiegelingen gegrond. Men vind derhalven, zoowel de oorspronkelijke, als afgeleide en toevallige koortfen in dit Deel behandeld.

Het tweede Deel, in twee afdeelingen gefplitst, zal in de eerfte de *ontftekingen*, en in de tweede de ontftekingachtige huidziekten bevatten.

In het derde Deel zullen de pijnlijke ziekten, vloeijingen en opftoppingen voorkomen.

In het vierde deel zullen de overige fleepende ziekten behandeld worden.

EERSTE HOOFDSTUK.

I.

De koortfen in het algemeen.

Hoezeer er geene ziekten meer algemeen heerfchen dan de koortfen, de Geneesheer dezelve aan het ziekbed ligt kent en onderscheidt, zelfs de leek in de kunst weet wanneer hij koorts heeft, en de Geneesheeren van alle landen zich moeite gegeven hebben, eene befchrijving te geven en naauwkeurig te bepalen, wat eigenlijk eene koorts zij, blijft dit vraagftuk voor als nog onoplosbaar, en zal het, waarfchijnlijk, ook altijd blijven.

De vele, in haren aard verre van elkanderen afwijkende, oorzaken, die koortfen voortbrengen; de verfchillende verfchijnselen en toevallen, naar de bijzondere individueele gefteidheid der lijdens gewijzigd, de koortfen vergezellende; de door bekende en niet bekende uitwendige oorzaken veranderde loop en aard der koorts; hare verfchillende uitgangen, onder gelijk fchijnende omftandigheden, en gelijke uitkomsten bij fchijnbaar groote tegenftrijdigheden, maken het moeilijk, ja! ondoenlijk,

kenfchetsfende toevallen te vinden , die voor alle koortfen toepasfelijk zijn ; en nog meer , om het wezen der koortfen te bepalen , en te weten , wat eigenlijk eene koorts zij. Zoo lang men alleen uit aanwezige verfchijnselen het befluit trekken kan , dat er koorts aanwezig is , geeft ons zulks regt , die toevallen , welke men doorgaans en bij de meeste koortfen aantreft , voor wezenlijke koortstoevallen te befchouwen en aan te nemen , daar ons een meer ftellig beginfel ontbreekt , om het duistere wezen der koortfen te verklaren. Deze algemeene verfchijnselen zijn :

1°. *Een verfnelde omloop des bloeds , zonder dat eene uitwendige oorzaak daarvoor aanwezig is , waar andere koortstoevallen tegenwoordig zijn , en de verfnelde beweging des bloeds eenigen tijd voortduurt.*

De fnelheid van den bloedsomloop wordt beoordeeld uit het getal der polslagen , beter uit de kloppingen van het hart , in een bepaald tijdsbestek. In de beoordeeling der fnelheid van den pols , let men op het *temperament* , den *ouderdom* , de *natuurlijke gefteeldheden* der lijders , de *woonplaatsen* , het *klimaat* , de *gewoonten* , *leefwijze* en het *geflacht*. Wat in het eene geval te fchielik zijn zoude , is in het andere natuurlijk. De pols van een kind , beneden het jaar , kan honderd en twintig malen in eene minuut flaan , en natuurlijk zijn ; daar bij den grijsaard tachtig flagen reeds de grootfte fnelheid en de hevigfte koorts aanwijzen.

2°. *Ver-*

2°. *Vermeerderde warmte over de geheele oppervlakte des ligchaams.*

Als kenschetsend toeval van koorts, is dezelve minder beslissend dan de versnelde beweging des bloeds; daar vele oorzaken dezelve opwekken, zonder dat er koorts aanwezig is, en zij in andere gevallen, waar de koorts niet te miskennen is, ontbreekt. Alleen, voor zich zelve beschouwd, geeft zij nauwelijks immer recht op eene koorts te besluiten maar in vereeniging met andere koortstoevallen levert zij eene der meest standvastigsten op. Bij de beoordeeling als koortstoeval komt het voornamelijk daarop aan: dat zij met de versnelde beweging des bloeds in zekere evenredigheid sta; dat er geene oorzaken op den lijder gewerkt hebben, die de dierlijke warmte sterk vermeerderen; zoo als sterke en overmatige lichaamsbewegingen, verhittende spijzen en dranken, warme baden, eene geëxalteerde gemoedsgesteldheid, hevige hartstogten, enz.; dat er een gevoel van koude rillingen, geeuwen, benaauwde ademhaling zij voorafgegaan, dat er eene droogte van tong, dorst, en een inwendig gevoel van hitte en meerendeels hoofdpijn, gelijktijdig aanwezig zijn.

3°. *Een algemeen kwalijk bevinden,*

waarbij de geëvenredigde sterkte der onderscheidene verrigtingen, tot instandhouding der gezondheid noodig, verbroken is. Eenige verrigtingen zijn daarbij vermeerderd, andere verminderd, of bijzonder gewijzigd. De meest gewone toevallen, met dit kwalijk bevinden gepaard, zijn: lusteloosheid, moeiheid,

heid, loomheid en trekken door de leden, een algemeen gevoel van magteloosheid en zwakte, verminderde eetlust, onaangename smaak, walging, misfelijkheid en braken, pijn en spanning in de maag en bovenbuikstreek, drooge mond, verminderde afscheiding van het speeksel, dat daarbij taai en schuimend is, hevige dorst, gloeiende hitte, veranderde gelaatstrekken, woestheid, zwaarte en pijn in het hoofd, te veel, of te weinig en onrustige slaap, ongewone ontlastingen, met bijzondere wijzigingen in de afgescheidene vochten, veranderde menging des bloeds, met groote neiging om zich in zijne onderscheidene bestanddeelen te ontbinden. In den beginne der koorts groote aandoenlijkheid voor zinnelijke indrukfels, en geëxalteerde zielsverrigtingen, die, in den verderen loop der ziekte, doorgaans in stomphheid, gevoelloosheid en ijlhoofdigheid overgaan. Hoe meerder nu deze toevallen gelijktijdig met de versnelde beweging des bloeds en hitte aanwezig zijn, zoo veel minder moeite heeft het in, over het aanzijn of niet aanzijn eener koorts te beslissen.

4°. *Eene zekere duurzaamheid en beurtelingsche verslimmering van deze toevallen, in dier voege, dat zij eenen zekeren tijd noodig hebben, alvorens zij geheel verdwijnen, met meer of minder regelmatigheid op elkander volgen en afloopen, met bepaalde tusschentijden verminderen, of geheel ophouden, en dan weder met grootere hevigheid terug keeren en zich verslimmeren.*

Daar

Daar deze verschijnselen eerst nadat de ziekte eenigen tijd geduurd heeft waar te nemen zijn, zoo volgt daaruit, dat zij, alhoewel dezelve de zekerste kenteekenen eener koorts zijn, bij het eerste bezoek eens lijders, weinig baten, om de ziekte in haar beginfel te leeren kennen, maar dat daartoe herhaalde bezoeken en naauwkeurige waarneming gevorderd worden.

Bij die koortsen, welke zoo spoedig, hetzij ten goede of ten kwade, afloopen, dat haar de tijd ontbreekt dezen regelmatigigen loop te volgen, zijn de overige aanwezige toevallen zoo kenfchetfend, dat het voor den Geneesheer, met weinig oefening, niet moeilijk wezen zal, te beflifsen, of de lijder al of niet koorts hebbe.

Een eenig ftellig toeval, welks aanzijn bepaald koorts te kennen geeft, ontbreekt. Alleen de aanwezigheid van meerdere der meest ftandvastige koorts-aanwijzende toevallen, met eene behoorlijke waardering der toevallige oorzaken, die hen voortgebragt hebben, geven zekere uitkomsten, en beflifsen ftellig over de aanwezigheid eener koorts.

Daar het echter onder de Geneesheeren eenmaal de gewoonte is, waar er over de koortfen moet gehandeld worden, eene begripsbepaling te laten voorafgaan, wat eene koorts zij, zoo wil ik ook hier, hoe gebrekkig en onvolledig het zijn moge, dit voorbeeld volgen, eensdeels uit andere Schrijvers, anderdeels uit eigene overweging, ontleend.

„ Koorts is eene eigenaardige gefteeldheid der geheele bewerktuiging, wáarin dezelve van de ge-

„wone wijze afwijkend terug werkt, waarin de
 „onderscheidene tot instandhouding der gezondheid
 „noodige verrigtingen buiten evenredigheid tot el-
 „kander gebragt zijn, met eene vermeerderde we-
 „derwerking in het vaatstelsel.”

Eene gestoorde evenredigheid der onderscheidene verrigtingen is de naaste oorzaak der koorts; eene verhoogde aandoenlijkheid in de prikkelbare en gevoelige vezel is de voorbeschikkende, en de vreemd-aardige ongewone prikkels zijn de toevallige oorzaken, welke met elkander deze onevenredigheden voortbrengen.

De vermeerderde wederwerking van het vaatstelsel verwijdert dikwijls de vreemde prikkels en brengt de gestoorde verrigtingen tot haren gezondheidsmatigen toestand terug; in zoo verre nu kan men met de oude Geneesheeren zeggen: „Koorts
 „is eene heilzame beweging der natuur, waardoor
 „zij zich van schadelijke stoffen tracht te ont-
 „doen.”

II.

Verdeeling der koortsen.

Niet minder talrijk dan de onderscheidene omschrijvingen, wat eigenlijk eene koorts zij, zijn ook de verdeelingen en onderdeelingen der koortsen, bij de onderscheidene Schrijvers over deze ziekte voorkomende, zoodat het moeilijk valt, eene ver-

verdeeling te kiezen, welke aan alle vereischten, die men daarbij op het oog heeft, even doelmatig voldoet; te meer, daar zich tegen allen gewigtige redenen ter afkeuring in het midden laten brengen.

Zoo lang de naaste oorzaak der koortfen een raadsel voor den Geneesheer blijft, zal men het doelmatigste handelen, den loop der koortfen en de daarbij plaatshebbende volgreeds der toevallen tot grondbeginfel voor eene algemeene verdeeling aan te nemen.

Naar mate de toevallen en verschijnselen, die eene koorts daarstellen, onafgebroken gedurende haren geheelen loop aanhouden, nalaten, of tusfchenpoozingen maken, stellen wij met den beroemden RICHTER drie hoofdafdeelingen vast:

- I. *Aanhoudende koorts.* (*Febris continens*), die, als het ware, maar een' aanval maakt, onafgebroken van haar begin tot het einde voortduurt, en geene tusfchenpoozingen heeft.
- II. *Aflatende koorts.* (*Febris remittens*). De lijder heeft aanhoudend koorts, met afwifselende verminderingen en verheffingen der toevallen, meestal op bepaalde tijden.
- III. *Tusfchenpoozende koorts.* (*Febris intermittens*). Regelmatige koortsaanvallen met geheel koortsvrije tusfchentijden, waarin de lijder gezond fchijnt, de aanvallen meest met koude beginnen en met zweet eindigen; waarom men ze ook koude koortfen noemt.

Alle koortfen, geene uitgezonderd, kunnen, zonder dat men der natuur dwang behoeft aan te doen,

tot deze drie foorten gebragt worden, waarvan ieder weder hare onderdeelen heeft:

- 1°. Volgens de wijze hoe zij heerschen, verdeelt men de koortsen in *epidemische* of *algemeen heerschende*, met of zonder *befmetting* (*contagiosae*); in *sporadische*, *enkel heerschende*, *endemische*, *landëigen*, die aan het eene of andere *clima* of plaats gebonden zijn; in *staande koortsen*, (*Febres stationariae*), die gedurende eenigen tijd onafgebroken en onveranderd heerschen, en in *tuschenloopende*, (*Febres intercurrentes*).
- 2°. Volgens de jaargetijden, waarin zij heerschen, in *voorjaars-*, *zomer-*, *herfst-* en *winterkoortsen*.
- 3°. Volgens haren langeren of korteren duur, waarmede zij afloopen, in *heete* of *schielijk afloopende koortsen*, (*Febres acutae*, *per acutae*, *acutissimae*); in *slepende langdurige*, (*Febres hecticae*, *phthisicae*, *cachecticae*).
- 4°. Volgens hare oorzaken, in *oorspronkelijke koortsen*, (*Febres primariae*), en in *toevallige*, (*Febres symptomaticae secundariae*).
- 5°. Volgens het gevaar, dat zij insluiten, in *goed-aardige koortsen*, (*Febres benignae*), en in *kwaadaardige*, (*Febres malignae*, *perniciosae*).

III.

Oorzaken der koortsen.

Alles, wat op een bewerktuigd ligchaam inwerkt,
en

en deszelfs verrigtingen floort of bijzonder wijzigt , kan eene koorts voortbrengen , en dus haar tot oorzaak worden.

- Gelijk iedere andere ziekte eene zekere voorgeschiedheid of aanleg voor haar ontstaan in het ligchaam noodig heeft , is het ook met de koortsen gelegen ; maar deze aanleg voor zich zelve bestaande , is dit nog geene koorts , kan haar lang voorafgaan en aanwezig zijn , zonder haar volstrekt noodzakelijk te doen ontstaan. Gering zijnde , kan zij door zich zelve weder ophouden , of , door toevallige inwerkingen van buiten , weggenomen worden. Waar zij voortduurt , onderhouden door de schadelijkheden die haar voortbragten , en bij gevolg van tijd tot tijd grooter wordt , zal de ontwikkeling der koorts onvermijdelijk plaats grijpen. Langzamer of schieplicher , naar mate meerdere schadelijke invloeden , die op het ligchaam inwerken , daarbij komen.

Deze gesteldheid der bewerktuiging , die het ontstaan eener koorts voorbereidt , noemt men hare *voorbefchikkende oorzaak* , (*Causa praedisponens*). Als in het ligchaam zelf gelegen zijnde , moet zij als eene wijziging in de bewerktuiging zelve beschouwd worden , welke tusfchen gezondheid en ziekte inftaat.

In het ooglopende ziekteverschijnselen zijn niet aanwezig , hoezeer de onderscheidene verrigtingen niet met die ligtheid en gemakkelijkerheid gefchieden , en met geen welgevallen , maar meer met lusteloosheid en moeite ten uitvoer gebragt worden.

Deze aanleg of voorbefchikkende oorzaak kan al-

gemeen en over de geheele bewerktuiging uitgebreid zijn; hoe meer zij dit is, zoo veel te meer grenst zij reeds aan wezenlijke ziekte. Zij kan meer bepaald in het eene of andere stelsel of deel der bewerktuiging gelegen zijn; hoe noodzakelijker tot onderhouding van het leven het stelsel of deel is, waarin zij huisvest, of meerdere uitgebreidheid en invloed het op de geheele bewerktuiging heeft, zoo veel te ligter grijpt de overgang in ziekte plaats; hoe veel te geringer deze betrekkingen zijn, zoo veel te langer kan zij, zonder dat er eene koorts volgt, aanwezig wezen. Deze voorbeschikkende oorzaak is gelegen in meer of minder verhoogde prikkelbaarheid, groote gevoeligheid of aandoenlijkheid van het zenuwstelsel, of ongevoeligheid van hetzelfde; vermeerderde werkdadigheid in het stelsel der *reproductie*, verminderde of afwijkende verrigtingen van den gezondheidsmatigen toestand in hetzelfde, met den daarvan afhankelijken overvloed van bloed of mangel aan dezen levensbalsam; veranderde gesteldheden der afscheidende en ontlastende werktuigen en in de afgescheidene vochten. Onverschillig of zij algemeen en gelijkmatig, of bijzonder en ongelijkmatig, in de afzonderlijke stelsels en deelen plaats hebben, en met of zonder gebreken in de bewerktuiging der deelen zelve gegrond, gepaard gaan.

De aangeborene wijzigingen en betrekkingen der zamengestelde deelen, krachten, eigenschappen en vermogens der bewerktuiging, bekend onder den naam van *temperamenten*, de ouderdom, de leefwijze, het geslacht, de landaard, het klimaat,
en

en vele andere omftandigheden, waarmede de mensch geboren wordt, leeft en leven moet, leveren de beginfelen, waaruit zich het verfchil van dezen aanleg zelven, in het voortbrengen, dan van deze, dan van gene koorts laat verklaren, en waarom dezelfde toevallige of bijkomende oorzaken, bij het eene voorwerp deze, bij het andere gene koorts, doen ontftaan; belette uitwafeming bij den volbloedigen eene ontftekingkoorts, bij den zenuwenzwakken eene zenuwkoorts ten gevolge heeft.

Naauwkeurig bekend te zijn met den voorafgeganen aanleg zoo wel, als met de bijgekome ne fchadelijke invloeden, en deze met elkander vergeleken en gewaardeerd te hebben, is voor den Geneesheer van het grootfte belang; daar wij voor als nog geene andere hulpmiddelen bezitten, om de wezenlijke geaardheid eener ziekte, voor zoo verre de mogelijkheid daarvan mag vooronderfteld worden, te leeren kennen, onderscheiden, en doelmatig behandelen.

De aanleg of voorbefchikkende oorzaak om ziek te kunnen worden, op zich zelve genomen, nog even verre van wezenlijk ziek zijn, als van de gezondheid, verwijderd, zoo moeten andere op het ligchaam inwerkende fchadelijkheden daarbij komen, om den overgang in ziekte te bewerken. Alles, wat hiertoe medewerkt of bijdraagt, begrijpt men onder de algemeene benaming van *toevallige of bijkomende oorzaken*, (*Causae occasionales*).

Deze kunnen dikwijls met den aanleg zoo naauw verwant en verbonden zijn, dat het moeilijk valt, de juiste grensfcheidingen van beiden te onderscheiden,

den, of te bepalen, waar de aanleg eindigt en de toevallige oorzaak begint. Dezelfde invloed, die tot ziek worden voorbeschikt, kan voortwerkende den overgang in ziekte bewerken, zonder dat er andere toevallige oorzaken daarbij komen. Theoretisch beschouwd, blijft het intusfchen voor den Geneesheer, en bovenal voor den leerling in de kunst, belangrijk en noodzakelijk, aan dit door alle Geneesheeren aangenomen onderscheid vast te houden.

Het gevoegelijkst onderscheidt men de toevallige oorzaken in algemeene en bijzondere, in uitwendige en inwendige; of ook, volgens den aard harer inwerking, naar mate zij meer het eene stelsel of deel der bewerktuiging boven het andere aandoen, en daarop schadelijk inwerken, kunnen zij tot zoo vele afdeelingen gebragt worden, als er bijzondere stelsels en deelen in de bewerktuiging aanwezig zijn.

Algemeene noemt men ze, wanneer zij de geheele bewerktuiging, als met éénen slag en op één oogenblik, aandoen, en eene koorts daarvan het onmiddellijk gevolg is, zonder dat het eene deel sterker dan het andere lijdt en aangedaan is.

Bijzondere, wanneer zich de schadelijke inwerking tot een stelsel of deel bepaalt, in den beginne alleen plaatselijk is, eerst in een zeker tijdsverloop, niet op ééns of plotseling, van daar over het geheele gestel uitbreidt.

Uitwendige, wanneer dezelve buiten het ligchaam gelegen zijn, in dingen buiten ons haren grond heb-

hebben, en met ons ligchaam in zeker verband en aanraking moeten gebragt worden.

Inwendige, wanneer zij in het ligchaam zelf huisvesten, een deel van hetzelfde uitmaken, of in de bewerktuiging gelegen zijn, niet gelijk e voorgaande, van buiten naar binnen, maar veeleer van binnen naar buiten, werkzaam zijn.

De bijzondere van deze oorzaken, naar mate zij meer bepaald op het eene of andere stelsel en deel haren schadelijken invloed uitoefenen, verdeelt men in de zoodanige, welke vooral het vaat- en spierstelsel aandoen, hare schadelijke inwerking door verhoogde, verminderde of bijzonder gewijzigde prikkelbaarheid kenschetsen, en koortsen doen geboren worden, die de eigendommelijkheden eener veranderde prikkelbaarheid duidelijk aanwijzen.

2°. In die, welke bij voorkeur het hersen- en zenuwgestel aandoen, de gevoeligheid bijzonder wijzigen, en koortsen voortbrengen, welke in dat stelsel gepaard zijn met zinkelijke wederwerkingen, die, wegens den algemeenen invloed der gevoeligheid of van het zenuwvermogen op de geheele bewerktuiging, alle verrigtingen in deze stoornis doen deel nemen.

3°. Welker invloed zich voornamelijk op het *re-productive* stelsel te kennen geeft, waarbij het klier- en watervaatstelsel de meest lijdende deelen zijn, reeds in hunne verrigtingen gestoord, dewijl de andere daarvan onafhankelijke verrigtingen nog geene verhindering ondergaan.

4°. Het spijsverteringsstelsel en alle andere afzonder-

derlijke deelen en ingewanden kunnen al mede oorspronkelijk aangedaan worden , zonder dat daarbij gelijktijdig groote veranderingen in de drie hoofdstelsels waar te nemen zijn , en den ontvangenen indruk aan andere deelen mededeelen , de dus werkende toevallige koortsen voortbrengen , welke tevens plaatselijk en algemeen zijn of worden.

Tot de uitwendige behòoren de inwerkingen van den ons omgeevenden dampkring , volgens zijne zwaarte en ligtheid , zuiverheid , menging met vreemde daarin opgeloste of mede vermengde luchtvormige stoffen , zijne vochtigheid en droogte , zijne snellere of langzamere beweging , zijnen grooteren of geringeren warmtegraad , en eindelijk nog op vele andere wijzen , welke zich uit de genoemde veranderingen niet laten verklaren , die van bijzondere plaatselijke geteldheden , en den invloed der andere hemelligchamen op onzen dampkring , waarschijnlijk afhangen.

2°. De electriche en magnetische vloeistoffen , die dan eens in grootere , dan in kleinere hoeveelheden in den dampkring aanwezig zijn , en hare evenredigheid daarvan verschillend op den mensch inwerken.

3°. Voedsels , spijsen en dranken , vergiften , smetstoffen , en andere zelfstandigheden , kleeding , woonplaats , ligging , misbruik van geneesmiddelen , warme , koude en dampbaden , enz.

4°. Beweging en rust , slapen en waken , beroepsbezigheden en vooral onderscheidene handwerken.

Tot

Tot de inwendige behooren, hartstogten en gemoedsaandoeningen, overvloed of gebrek der noodige vochten, ophooping, ongelijkmatige verdeling, ziekelijke menging en ontbindingen in hare bestanddeelen, vermeerderde, verminderde en onregelmatige ontlastingen, langs gewone en ongewone wegen, tegennatuurlijke gesteldheden der vaste deelen, inwendige ontstekingen, verëtering, verhardingen, aanëengroeijingen, gezwollen, steenen, wormen, vreemde in het ligchaam verborgene zelfstandigheden, enz.

Eene meer volledige opgave van al de onderscheidene toevallige oorzaken, die koortsen kunnen voortbrengen, en de wijze hoe men haren schadelijken invloed tracht te verklaren, in de algemeene en bijzondere ziektekunde, meer dan hier, te huis behoorende, gaan wij dezelve hier, met terugwijzing op het *Handboek der Algemeene Ziektekunde*, door G. W. CONSBRUCH, vertaald door den verdienstelijken F. VAN DER BREGGEN, voorbij, daar het aldaar, in het derde en dertiende hoofdstuk, gezegd even zeer in het bijzonder op de koortsen, als in het algemeen op alle ziekten, betrekkelijk de wijze harer wording, toepasselijk is.

De naaste oorzaak (*Causa proxima*) der koortsen, in het afgetrokken beschouwd, blijft, niettegenstaande de veelvuldige pogingen der Geneesheeren, om dezelve te vinden en te verklaren, nog altijd een raadsel. Hare duurzaamheid, nadat reeds de schadelijke invloeden opgehouden hebben te werken,

ken, of verwijderd zijn, bewijst genoegzaam, dat zij iets inwendigs, in de bewerktuiging zelve gelegen, en geenszins iets uitwendigs is, of zijn kan.

De inwerkingen der aanwezig geweest zijnde, en nog aanwezige schadelijkheden, op een tot ziek worden voorbeschikt ligchaam, brengen eene zekere stemming in de levensvermogens en krachten, veranderingen in de menging en gedaante der vaste deelen, in de van hunne bewerktuiging afhankelijke verrigtingen, in de menging en den samenhang der vloeibare deelen, voornamelijk in het bloed, te weeg, waardoor het geheel verandert, in zijne werkingen en verrigtingen nieuwe wetten volgt, welke zich door bijzondere, van den gezondheidsmatigen toestand afwijkende, verschijnselen doen kennen. Deze verschijnselen zijn het, die het gezonde van het zieke onderscheiden, en verschijnselen en toevallen der naaste oorzaak *Symptomata causae proximae* genoemd worden.

In de zeer onderscheidene gesteldheden der bewerktuiging, door de veranderingen der van buiten inwerkende schadelijkheden voortgebracht, ligt de oorzaak der verscheidenheid der koortsen onderling, zoo wel als van hare gelijkvormige en verre van elkander afwijkende toevallen, loop, gevaar, gevolgen, uitgang en genezing.

Alleen uit het uitwendige, de toevallen en verschijnselen, waardoor zich eene koorts te kennen geeft, kan men met waarschijnlijkheid, op de inwendige plaatshebbende veranderingen, een besluit trekken, welke veranderingen, even zeer als het

leven zelf niets anders dan noodwendige en onvermijdelijke gevolgen der bewerktuiging en van de daarin gegronde vermogens en krachten zijn.

Waarin het naaste van deze veranderingen bestaat, of gezocht moet worden, weten wij niet; want allen, die, om zulks te verklaren, hunne pogingen aangewend hebben, leverden iets meer of min onvolledigs, en dikwijls strijdende met dat, wat ons eene gezuiverde ervaring leeraart. Kenden wij haar, de naaste oorzaak der koorts lag dan voor ons bloot.

De koorts en hare naaste oorzaak vloeijen als het ware ineen, en kunnen niet van elkander gescheiden, ieder afzonderlijk beschouwd en onderzocht worden. Zoo lang deze kennis in de geneeskunst ontbreekt, zoo lang zal men zich ook aan de voornaamste, meest algemeene en kenschetsende toevallen en verschijnselen, welke deze ziektevorm kenschetst, moeten houden, zoo wel om de koorts van andere ziekten, als in hare verschillende soorten en geaardheden, die zij kan aannemen, te onderscheiden. Wat ons tot het eerste leidt, noemen wij hare algemeene kenmerken, toevallen en verschijnselen, omdat wij ze bij alle koortsen, alleen trapsgewijze verschillende, wedervinden; die ons de koorts volgens hare soort en geaardheid leeren kennen, noemen wij hare bijzondere.

Het aanhouden, nalaten, en tusschenpoozen der algemeene toevallen, die men bij iedere koorts aantreft, heeft ons tot grondslag gediend, om dezelve in drie geslachten te verdeelen. De vermeerderde of verminderde wederwerking, waarmede alle verrig-

tingen, gedurende eene koorts, plaats hebben; de onevenredigheden in de onderscheidene verrigtingen van de bijzondere stelsels en werktuigen, betrekkelijk tot elkander, dus kwantitatief; en in ieder afzonderlijk, vergeleken met deszelfs gezondheidsmatigen toestand, dus kwalitatief, zal ik tot grondbeginsel aannemen in de bepaling van het karakter der koortsen, om daaruit de onderafdeelingen voor ieder geslacht te vinden.

I.

Aanhoudende koorts.

(*Febris continens, continua*).

- a. *Aanhoudende koorts*, met eene algemeen versterkte, gelijkmatige, niet zeer hevige, wederwerking, zonder uitstekend lijden van een bijzonder stelsel of deel. (*Febris simplex, ardens, καύσος* der ouden, *ephemera, synochus non putris, febris benigna*).
- b. Met eene algemeen gelijkmatig sterke, hevige wederwerking, vooral van het vaatstelsel, zonder uitstekend lijden van een afzonderlijk deel. (*Febris inflammatoria, continens, synocha, febris sthenica, fièvre angio-tenique* van PINEL).
- c. Met algemeen en plaatselijk vermeerderde hevige wederwerking, vooral in het vaatstelsel. (*Febris inflammatoria continua cum inflammatione topica*).
- d. Met algemeen verminderde wederwerking, voor-
al

al in het vaatstelsel en de *reproductive* werktuigen. (*Febris putrida, typhus, febris maligna, pestilentialis, fièvre adynamique* van PINEL).

- e. Met algemeen verminderde wederwerking, voornamelijk in het zenuwstelsel. (*Febris nervosa asthenica, acuta, atacta, maligna, typhus nervosus, fièvre ataxique* van PINEL).
- f. Met algemeen en plaatselijk verminderde wederwerking. (*Febris putrida, et nervosa cum inflammatione topica asthenica*).

II.

Aflatende koorts.
(*Febris remittens*).

- a. *Aflatende koorts*, met algemeen vermeerderde wederwerking, die beurtelings afneemt en verheft, voornamelijk in het vaatstelsel. (*Febris inflammatoria remittens*).
- b. Met algemeen en plaatselijk vermeerderde wederwerking in het vaatstelsel. (*Febris inflammatoria remittens cum inflammatione topica*).
- c. Met algemeen verminderde wederwerking, vooral in het vaatstelsel en de *reproductive* werktuigen. (*Febris putrida remittens*).
- d. Met algemeen verminderde wederwerking in het zenuwstelsel. (*Febris nervosa remittens*).
- e. Met algemeen en plaatselijk verminderde wederwerking in het vaat- of zenuwstelsel. (*Febris*

putride, v. Nervosa remittens cum inflammatione topica asthenica).

- f. Met algemeen verminderde wederwerking der spijsverteringswerktuigen. (*Febris inter mittens gastrica, saburralis, biliosa, mucosa, verminosa, enz.*
- g. Met ongelijkmatige wederwerkingen in de onderscheidene stelsels en werktuigen. (*Febris remittens complicata et symptomatrica, catarrhalis, rheumatica, hectica, phthysica, puerperalis, enz.*

III.

Tusfchenpoozende koorts.
(*Febris intermittens*).

- a. *Tusfchenpoozende koortsaanvallen, met algemeen vermeerderde wederwerking. (Febris intermittens inflammatoria, sthenica).*
- b. Met algemeen verminderde wederwerking. (*Febris intermittens asthenica*).
- c. Met algemeen verminderde wederwerking, voornamelijk in het zenuwgeftel. (*Febris intermittens nervosa, maligna, soporosa, comentosa, enz.*
- d. Met algemeen verminderde wederwerking, vooral van het vaatftelsel. (*Febris intermittens putrida*).
- e. Met algemeen verminderde wederwerking der spijsverteringswerktuigen. (*Febris intermittens gastrica*).

f. Met

f. Met ongelijkmatige wederwerking der onderscheidene stelsels en werktuigen. (*Febris intermittens irregularis, erratica, localis, topica*).

IV.

Nadere verdeeling der koortsen.

De hier aangenomene verdeeling der koortsen, zoo veel mogelijk gegrond in de toevallen en verschijnselen, die men, over het algemeen genomen, bij koortszieken waarneemt, kan men even min, als zoo vele andere verdeelingen, door onderscheidene geneeskundige Schrijvers aangenomen, voor volledig, en in alle opzigten aan alle vereischten, die daarvan gevorderd worden, als voldoende beschouwen. Gebrekkig, gelijk alle andere, is het mij genoeg, indien zij slechts niet gebrekkinger dan andere bevonden wordt. Een harer voordeelen, die ik hope, dat men daaraan zal toekennen, schijnt mij daarin gelegen, dat zij de verdeelingen, van anderen aangenomen en vastgesteld, zonder moeite op zich, en wederkeerig, zich op andere laat toepassen; en dat zij voornamelijk aanwijst, waarop in de behandeling van de onderscheidene koortskaracters moet gelet worden. Dat mij daarbij de opmerkingen eener gezuiverde opwekkingstheorie van REIL, en eenigermate ook die der nieuwste geneeskundige theoriën, geleid hebben, zonder uit het oog te verliezen, wat eene regtschapen *empirie* aan de

hand geeft, zal de deskundige al spoedig ontdekken. Ten minste was het mijn voornaamste doel, het goede, onverschillig van wien het afkomstig zij, zamen te stellen en, zoo mogelijk, te omvatten.

Ten aanzien van het karakter der koortsen, wanneer men daarbij alleen let op den graad van sterkte der wederwerkingen; waarmede de onderscheidene verrigtingen plaats hebben, kan men een drievoudig koortskarakter aannemen:

- 1°. *Koorts* met vermeerderde werkdadigheid in het geheele gestel. (*Sthenia*, *Hypersthenia*, *Synocha* van REIL).
- 2°. *Koorts* met verminderde werkdadigheid in het geheele gestel. (*Asthenia*, *Typhus* van REIL).
- 3°. *Koorts* met ongelijkmatige werkdadigheid, van enkele stelsels, deelen of werktuigen, in evenredigheid tot en onder elkander. (*Complicatio*).

Indien wij eenen zekeren maatstaf bezaten, die den graad van wederwerking in ieder stelsel en deel, zoo wel in dien staat, waarin zij aan de gezondheid beantwoorden, als in ziekten, naauwkeurig aanwees, zoude men welligt vinden, dat de meeste koortsen dit laatste karakter vertoonen, en er bij de meeste niet zoo zeer een meer of minder, dan wel een kwalitatief verschil plaats heeft. Zoo schijnt de ontstekings- of vaackoorts alleen in eene onevenredige te sterke wederwerking in het vaatstelsel, betrekkelijk het geheele *organismus*, en de daardoor bewerkte veranderle menging van het bloed, gegrond te zijn; plaatselijke ontstekingen komen daarbij,

bij, wanneer de wederwerking in een deel meer dan in het andere opgewekt en onderhouden wordt. Bij andere koortsen zien wij de wederwerking in het herfen- en zenuwgestel bijzonder en bij uitstek van hunne gezondheidsmatige verrigtingen afwijken, verhoogd, verminderd en buiten evenredigheid, met betrekking tot de wederwerking zoo wel van de geheele bewerktuiging als in hare bijzondere deelen. Bij sommigen zien wij bij voorkeur het *reproductive* stelsel, en het bloed, dat de stof ter verarbeiding van dat stelsel moet opleveren, het eerste in zijne verrigtingen, het andere in zijne zamenstellende deelen veranderd, gewijzigd en ontbonden. In eenige gevallen zien wij bijzonder de spijsverterings-werktuigen en het leverstelsel; bij andere de ademhalings-werktuigen, de spiervezel, de slijm afscheidende vliezen, de klieren, enz., aangedaan, en in hunne verrigtingen niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief veranderd.

Daar nu de onderscheidene verrigtingen der bewerktuiging, niet alleen in het meer of minder, maar ook in hare betrekkelijke evenredigheden tot het geheel en onderling, en in de hoedanigheid veranderd zijn, niet op ééne, maar op verschillende wijzen van de gezondheid afwijken, zoo laat zich ligt inzien, dat eene verdeeling der koortsen, alleen volgens dit meer of minder, voor eenzijdig, onvolledig en met de natuur strijdig, te houden is; dat men van een ander beginsel moet uitgaan, om de verschillende karakters der koorts te bepalen, en zich bij de verdeeling dienvolgens te rigten. Wie

zal toch kunnen en willen beweren, dat, bij een gevoel van algemeene zwakte, verminderden polsslag en kwijnende verrigtingen van het *reproductieve* stelsel, de raaskallende ijlhoofdigheid, de opgewekte verrigtingen der zin-werktuigen en spelingen eener buitenfporig opgewekte en werkzame verbeelding, zoo gewone toevallen bij zenuwkoortsen, alleen uit zwakte voorkomen, omdat middelen, dien wij versterkende krachten toeschrijven, de genezing bevorderen, verzwakkende den dood veroorzaken, en de lijdens nog langen tijd, nadat zij de koorts doorgegaan hebben, zwak blijven.

Onevenredige wederwerkingen der onderscheidene stelsels en deelen in de bewerktuiging zijn, mijns bedunkens, de eenige veilige hulpmiddelen, waardoor wij in het bepalen der karakters, die de koortsen aannemen, eenen zekeren weg bewandelen. Want noch de valsche zwakte der ouden, noch de gemengde der nieuweren, kan ons iets baten in de verklaring van de zoo verre uiteen loopende trappen van sterkte en zwakte, in de verrigtingen, gedurende den loop van eene koorts, in hare onderscheidene tijdperken waar te nemen; nog minder zijn zij geschikt om een licht te ontsteken, waarop men zich veilig, in de geneeskundige behandeling, verlaten kan.

Steeds de veranderde werkdadigheid der bewerktuiging tot grondslag houdende, met inachtneming der stelsels, waarin zij zich het duidelijkste openbaren, neme ik vier hoofdkarakters der koortsen, in navolging van den beroemden RICHTER, aan:

1°. De

- 1°. De ontstekingskoorts met de sterke wederwerking. (*Febris inflammatoria, sthenica*).
- 2°. De zenuwkoorts, met verminderde wederwerking. (*Febris nervosa, asthenica*).
- 3°. De koorts met neiging der vochten tot ontbinding en rotting, of de rotkoorts. (*Febris putrida*).
- 4°. De gastrische, of met schadelijke stoffen in de darmbuis gepaarde koorts. (*Febris gastrica*).

V.

Tijdperken der koortsen.

De koortsen doorloopen van haar begin tot aan hare beslissing zekere tijdperken, die men, met elkander in verband, den loop der koorts of haren duur noemt. Bij iedere koorts, die aan zich overgelaten blijft, of ongestoord in haren loop zich beflist, neemt men steeds deze onderscheidene tijdperken waar. Door eene doelmatige geneeskundige behandeling kunnen zij in vele gevallen verkort, en uit het eerste tijdperk in een der laatste verplaatst worden, zonder noodig te hebben de tusschenliggende te doorloopen. Eene ondoelmatige behandeling, daarentegen, verlengt en verslimmert dezelve, of brengt den lijder uit de ligte in de zware en gevaarlijke.

Deze tijdperken zijn de volgende:

- 1°. *Het tijdperk der voorloopers.* (*Stadium pro-*

B 5
do-

domorum, diathesis). Het geeft zich door een meer of minder gevoel van kwalijk bevinden te kennen; verschillend volgens het karakter dat de koorts aanneemt, en de stelsels en werktuigen, welke de voornamelijk lijdende deelen bij de eenmaal ontwikkelde koorts zijn zullen; door lusteloosheid, verdrietelijkheid, loomheid, verminderden eetlust en afwisselend gevoel van hitte en koude; somwijlen door opgebeurdheid en vlugheid van geest, vermeederden eetlust, een gevoel van voor den lijder ongewoon welvaren en gezondheid, vooral bij stenische of ontstekingskoortsen.

- 2°. *Het tijdperk der beginnende koorts. (Stadium initii, principium febris)*. Het is doorgaans van korten duur en onduidelijk. Koude rillingen, hevige koude met spoedig daarop volgende hitte, hoofdpijn, misfelijkheid, walging, braken, flauwten, hevige pijnen, zijn de meest gewone toevallen, waarmede eene koorts begint, die dan later door regelmatige koortsaanvallen gevolgd worden, waarmede de koorts zich in haar bepaald karakter ontwikkelt.
- 3°. *Het tijdperk der toenemende koorts. (Stadium incrementi)*. De koorts ontwikkelt zich steeds meer en meer duidelijk, de toevallen en verschijnselen vermeederen en worden zwaarder, totdat zij haren hoogsten trap van sterkte bereikt heeft.
- 4°. *Het tijdperk, waarin de koorts haren hoogst mogelijken trap van hevigheid bereikt heeft.*

(Sta-

(*Stadium status, acme*). Het is slechts van korten duur; de groote afwijkingen in alle verrigtingen van den gezondheidsmatigen toestand, met de daarvan afhankelijke hevigheid der toevallen, voeren de noodzakelijkheid van eene spoedige beslissing met zich, hetzij ten goede of ten kwade. In het eerste geval heeft de overgang plaats in het:

- 5°. *Tijdperk der afnemende koorts. (Stadium decrementi, paracme)*. Gelijk in het derde tijdperk de toevallen vermeederen en zwaarder worden, nemen zij in dit steeds af en verminderen, totdat de meeste ziekteverschijnselen verdwenen zijn, en de herstelling als het:
- 6°. *Tijdperk intreedt. (Reconvalescentia)*. Alle ziekteverschijnselen zijn nu verdwenen, de krachten beginnen te herstellen, de eetlust, slaap, de uit- en afscheidingen zijn natuurlijk. De lijder keert tot zijne vorige gezondheid terug.

VI.

Duur der koortsen.

Alle koortsen, van wat aard zij ook zijn mogen, hebben altijd een zeker tijdsbestek noodig, alvorens zij haar einde bereiken, in gezondheid of dood.

Maar de tijd, waarin zij afloopt, is geenszins bij allen van gelijken duur. De eenvoudige koorts doorloopt alle tijdperken in zoo vele uren, als de aanhou-

houdende dagen en dikwijls weken noodig heeft. De meeste echter verloop en in-den tijd van veertien tot acht en twintig dagen, wanneer men ze geheel aan de natuur overlaat, en geene geneesmiddelen toedient. In vele gevallen zijn hare tijdperken en geheele duur zoo standvastig, dat het buiten de magt van den Geneesheer blijft, dezelve te verkorten.

Hoezeer wij nu wel geene algemeene regelen hebben, waaruit zich reeds, bij het eerste begin eener koorts, haren duur met eenige zekerheid vooruit bepalen laat, zoo kan men toch met eenige waarschijnlijkheid, volgens den *typus*, de meer of mindere kwaadaardige natuur, de voortbrengende oorzaken, derzelve voortdurend of ophouding, uit den duur van het eene tijdperk, tot dien van het andere, uit gedane waarnemingen bij andere, gelijktijdig door dezelfde koortsen aangetaste, lijders den geheelen duur der koorts berekenen.

a. Volgens den typus. De aanhoudende koortsen verloop en steeds schiep lijk er, dan de aflatende; deze schiep lijk er dan de tuschenpoozende; en van deze weder het schiep lijkst die, welke aanvallen op de kortste koortsvrije tuschentijden wederkeeren; de daagsche koorts schiep lijk er dan de anderendaagsche, deze schiep lijk er dan de derdendaagsche, enz.; alhoewel de kwaadaardige tuschenpoozende, de slepende zenuwkoortsen en de *hectische*, uitzonderingen op dezen regel zijn; welke uitzonderingen dezen regel echter geenszins omver stooten, daar dezelve doorgaans met plaat-

plaatselijke aandoeningen en bijzonder lijden van enkele deelen gepaard gaan, en bijgevolg meer tot de *symptomatische*, dan wel tot de *idiopathische* behooren.

b. De kwaadaardigheid. Hoe kwaadaardiger eene koorts is, dat is, hoe belangrijker tot onderhouding des levens de bijzonder aangedane deelen en stelsels zijn, zoo veel te korter is haar duur. De kwaadaardigste van alle koortsen, de pest van het Oosten, de gele koorts der Amerikanen, de oorlogspest der Europeërs en de kwaadaardige tusfschenpoozende in moerasfige landstrekken, eindigen doorgaans binnen de eerste zeven dagen.

c. De voortbrengende oorzaken. Koortsen, welker oorzaken in misbruik van spijs en drank, overmatige beweging en rust, belette uitwaseming en andere onmiddellijk op de bewerktuiging materiëel en voorbijgaande inwerkende schadelijkheden, gelegen zijn, eindigen, wanneer zij een^e aanhoudenden *typus* hebben, binnen zeven, met de nalatende of tusfschenpoozende binnen veertien dagen, mits de oorzaken uit den weg geruimd, en geene nieuwe schadelijkheden daarbij komen.

Koortsen, door besmetting voortgebracht, houden haren loop het standvastigt en minst veranderlijk vol; de verschillende finetstoffen brengen hier een groot onderscheid te weeg; de meeste echter duren van een en twintig tot vijf en dertig dagen, totdat de lijder hersteld is; de dood volgt

volgt meerendeels op de ongelijke dagen, voor den dertienden.

Koortfen, uit oorzaken, welke niet weggenomen worden, hetzij de mogelijkheid daarvoor befta of niet, duren altijd zeer lang, en volgen het minfte eenen regelmatigigen loop in hare onderscheidene tijdperken. Onverteerde fpijzen, vreemde ligchamen in de eerfte wegen, niet herftelde ontwrichtingen, beenbreuken, beensplinters, verhardingen, vernaauwingen, veretteringen, inwendige gezwellen, vreemde van buiten in het ligchaam gebragte dingen, splinters, ingetrapte fpijkers, naalden, fpelden, kogels, en wat dies meer zij, hebben dikwijls koortfen doen ontftaan, die weken, maanden en jaren geduurd hebben.

- d. *De onderscheidene tijdperken*, die de koortfen doorloopen, zijn zoo juist en duidelyk niet van elkander afgefcheiden, dat men fteeds met naauwkeurigheid het einde van het eene, en het begin van het andere onderscheiden kan; dikwerf vloeijen zij zoodanig te zamen, of gaan zoo onmerkbaar in elkander over, dat ook de geoeffendfte en meest oplettende waarnemer ze kent, noch weet aan te wijzen. Bij andere zijn zij daarentegen zoo duidelyk, dat de minst geoeffende dezelve onderkennen kan. Daar, waar dit plaats heeft, heeft men eenen wegwijzer te meer, zoo wel om den geheelen duur der koorts, als dien der afzonderlijke aanvallen, welke de koorts zamenftellen, te bepalen. Vooral heeft dit

dit plaats met de tusschenpoozende. De onderscheidene tijdperken, die zich hier door koude, hitte en zweet, duidelijker dan bij andere openbaren, — ten minste voor zoo verre men hier iederen aanval, voor zich bestaande, beschouwt, — hebben gewoonlijk een' gelijken duur onderling, zoodat men, waar de koude twee uren geduurd heeft, met zeer veel waarschijnlijkheid vooruit bepalen kan, dat de hitte en het zweet, ieder voor zich, insgelijks twee uren duren zullen, en de geheele aanval bij gevolg in zes uren zal afloopen.

Dezelfde evenredigheid heeft in de tijdperken plaats, zoodat men, waar de duur van het eene bekend is, daarnaar den overigen en dus den duur der koorts berekenen kan. Haar geheele duur verdeelt zich in zoo vele gelijke deelen als er tijdperken zijn; voornamelijk heeft zulks plaats tusschen het derde en vijfde, de overige zijn aan vele afwijkingen onderhevig.

- e. Bij *epidemische*, *endemische* en *contagieuse* koortsen leert ons de ervaring, uit reeds behandelde gevallen afgeleid, tot den waarschijnlijksten duur besluiten; de meerdere gelijkvormigheid der voortbrengende oorzaken brengt ook meer overeenstemming in den loop der koortsen; het heerschende karakter blijft dikwijls maanden lang onveranderd hetzelfde, onverschillig welke voorwerpen de koortsen aantasten. Den loop der koorts bij éénen lijder kennende, kent men dien ook doorgaans bij alle anderen.

Voor

Voor jonge Geneesheeren kan niet te dikwijls herhaald worden, dat de meeste dezer koortsen een bepaald tijdsverloop noodig hebben, alvorens zij zich beflissen. Geen Geneesheer zal er wellicht te vinden zijn, die niet eenmaal in den waan gedeeld heeft, om koortsen te kunnen genezen, zonder daarbij aan den tijd gebonden te zijn; maar ook geen Geneesheer, die gewoon is meer te doen dan een *recept* te schrijven, zal ontkennen: dat hem treurige ervaringen iets anders en beters geleerd, en van dwalingen genezen hebben.

VII.

Uitgangen der koortsen.

Iedere koorts aan zich zelve overgelaten, of geneeskundig behandeld, volbrengt spoediger of langzamer haren loop, en eindigt op eene drievoudige wijze:

- a. in gezondheid,
- b. met den dood,
- c. of door in eene andere ziekte over te gaan.

Ontstaat er eene nieuwe alleen plaatselijke ziekte, bekend onder de benaming *verplaatsing der ziektestof*, dan noemt men het *metastasis*. Is de volgende ziekte algemeen, *gedaanteverwisseling* (*metaschematismus*). In beide gevallen houdt de eerste oorspronkelijke koorts of geheel op, en er ontwikkelt zich eene

eene ziekte, die in haar karakter, hare verschijnselen, toevallen en geneeskundige behandeling, van de eerste geheel afwijkt; of er heeft alleen eene wijziging in het koortskarakter plaats, zoodat de aanwezige ziekte toevallen en verschijnselen, met andere vereenigd, vermeerderd of verminderd worden; het eenvoudige karakter, dat de koorts eerst had, wordt zamengesteld, of het zamengestelde tot een eenvoudig terug gebragt. De geneeskundige behandeling bestaat in wijzigingen, maar niet in volstrekte verandering. Hoedanig de uitgang eener koorts ook zij, dezelve is altijd het gevolg van eene werking der natuur, gegrond op de verandering, welke de schadelijkheden, door haren prikkel, op de bewerktuiging, zoo in hare krachten als vermogens, voortbrengen, zijnde deze verandering gewijzigd door de bijzondere menging en stoffe van ieder werktuig. Deze terugwerking der organen moet noodwendig eene wijziging in de schadelijke prikkels aanbrengen.

Met iedere ziekte wordt er voor de bewerktuiging een nieuwe leefkring geopend, waarin zij aan nieuwe wetten en betrekkingen onderworpen, in alle verrigtingen wijzigingen en veranderingen ondergaat. Het meeste hebben wij daarbij te bewonderen, dat de algoede Schepper de bewerktuiging alzoo heeft ingerigt, dat de wederwerking, op elken schadelijken invloed volgende, mits zij niet te hevig zij, blijkbaar geschikt is tot het verwijderen der schadelijke stoffe, tot het onschadelijk maken derzelve, en tot het uitwisschen van den ontvangen' indruk, en zij dus ook het vermogen bezit, om uit zich zelve de

gestoorde verrigtingen tot den natuurlijken staat terug te brengen. Dit pogen geeft zich door vermeerderde werkdadigheid te kennen, of in het algemeen, of bepaaldelijk in het eene of andere stelsel en deel, om den tegenwoordigen toestand der bewerktuiging te veranderen; van deze poging is behoud of vernietiging het gevolg.

Deze geschiktheid of dit vermogen der bewerktuiging, om zich zelve te veranderen en ziekten te beslissen, noemen de Ouden de *Geneeskrachten der natuur* (*Vires medicatrices naturae*). Zij beschouwden dezelve als bijzondere, onafhankelijk werkende krachten, die steeds op zelfsbehoud doelden. In zoo verre zij dit niet ten volle zijn en niet kunnen wezen, hadden die Geneesheeren, welke dezelve loochenden, gelijk; maar als noodwendige gevolgen der gewrochte wederwerkingen in de bewerktuiging, zal het voor een iegelijk, die de beschouwing der natuur in hare uitwerkselen boven spitsvondige begripsverdraaiingen stelt, tot de dwaasste en ijdelste ondernemingen behooren, de geneeskrachten der natuur te betwisten.

In geene andere ziektevormen vindt men dit vermogen der bewerktuiging, haren toestand door zich zelve te veranderen, zoo algemeen, regelmatig en standvastig, dan in de koortsen; men is derhalve ook gewoon, de geheele leer der *krisis*, en kritische ontlastingen, bij de leerstellige behandeling der koortsen, tevens in het algemeen en in het bijzonder af te handelen.

Ons doel vordert hier, dat wij alleen datgene, wat in het algemeen en in het bijzonder op de koortsen

fen toepasselijk, en noodzakelijk te weten is, kortelijk aanhalen.

Bij iedere koorts neemt men op zekere tijden, in dat tijdperk, waarin de ziekte haren hoogsten trap bereikt heeft, vermeerderde en veranderde afscheidingen en ontlastingen, door de gewone en ook langs buitengewone wegen, waar, waarmede de koorts zich befrist. Voordat deze ontlastingen plaats grijpen, blijft de koorts steeds toenemen; tegen dat zij plaats hebben, worden de toevallen doorgaans zeer verontrustend; na haren afloop, of reeds gedurende dezelve, houdt de koorts op, en de gezondheid keert terug.

Deze ontlastingen nu noemt men *krisis*, of kritisch. De stoffen, welke daardoor ontlast worden, wijken steeds meer of min van hare gewone natuur af. Zulks heeft tot de stelling der Ouden, „ dat daarmee, de de stoffelijke oorzaken der koortsen zouden ontlast worden, ” aanleiding gegeven. Men beschouwde deze afgescheidene stof als volstrekt schadelijk, als het ware voor de ziekte zelve; hierop grondde zich dan ook de leer der ruwheid en koking, vooronderstellende dat de koorts zelve niets anders ware dan eene poging der natuur, om deze stoffen van zich te verwijderen. Wijders nam men aan, dat deze stoffen tot de ontlasting moesten voorbereid en geschikt gemaakt worden; waar er dus ontlastingen met verligting der koorts volgden, noemde men deze stoffen, gekookt (*materia cocta*); zoo lang er geene ontlasting volgde en de koorts bleef toenemen, raauw, (*materiae crudae*).

Hoezeer het nu geenszins te ontkennen is, dat zoodanige ontlastingen aan de beslissingen der koortsen voorafgaan, daarop eenen zeer wezenlijken invloed oefenen, en de ontlaste stoffen van haren gewonen aard en menging afwijken, dikwijls langs ongewone wegen, dan eens in zeer groote, dan weder in nietsbeduidende hoeveelheden, doch steeds met hetzelfde weldadige gevolg plaats hebben, geeft zulks toch geenszins regt, om de meeningen der Ouden voor juist en overeenkomstig met de natuur te beschouwen. Vele der nieuwere geneeskundige Schrijvers hebben dezelve betwist, en voor hersenschimmen van stelsels en stelselzucht willen gehouden hebben, doch met geen beter gevolg, dan reeds de in vroegere tijden daarheen strekkende pogingen gehad hebben.

De zaak zelve staat als onomstootbare daadzaak te vast, door duizendjarige ervaringen der beste practische Geneesheeren gestaafd, om, ten gevalle eener *theorie*, welke zij ook wezen moge, met eenigen grond ontkend te worden. Geenszins genegen, om het gevoel der oude Geneesheeren onbepaald als het mijne aan te nemen, met te beweren, dat de ontlaste stoffen voor een wezenlijk deel der ziekte, en steeds voor volstrekt schadelijk zouden te houden zijn, schijnt het mij toch toe, dat de aardheid der ontlaste stoffen, hare menging en bestanddeelen een belangrijk deel hebben in de gunstige of ongunstige beslissing der koorts. Ook alleen als een *product* der van den gezondheidsmatigen toestand afwijkende gesteldheid der bewerktuiging

be-

beschouwd, zijn zij, ten aanzien der stoffen, waarvan zich de bewerktuiging daardoor ontdoet, van het uiterste belang, daar zij ons zoo duidelijk aanwijzen, dat het wezenlijke der koortsen niet alleen in een meer of minder der vermogens, krachten en verrigtingen der bewerktuiging, maar ook in hare veranderingen en wijzigingen, en de stoffelijke verhouding der onderscheidene bestaandeelen, zoo wel van de vaste als vloeibare deelen, te zoeken en te verklaren is. De dagen, waarop men deze beslissende ontlastingen ziet plaats hebben, noemt men kritische (*dies critici*).

De natuur, standvastig en regelmatig in haren loop, geeft ons hier een bewonderenswaardig bewijs, hoe zij, ook bij afwijkingen, aan dezen regel getrouw blijft; want hoezeer iedere dag kritisch zijn kan, zijn toch voornamelijk de ongelijke dagen, van het begin der koorts af gerekend, de derde, vijfde, zevende, negende, elfde, dertiende, zeventiende, een en twintigste en negen en twintigste, merkwaardig, als zijnde die, waarop de meeste koortsen beëindigd worden.

Doorgaans gaat er aan deze ontlastingen eene vermeerdering en verslimmering in de ziekteverschijnselen en toevallen vooraf; de koorts bereikt haren hoogst mogelijken trap, en de lijders bevinden zich schijnbaar in de ongunstigste omstandigheden; men noemt deze *perturbationes criticae*; in eenen korteren of grooteren tusschentijd volgen daarop de ontlastingen. Zijn deze duidelijk en merkbaar, dan noemt men ze kritisch, (*crisis*). Wordt daarmee

de koorts geheel ten goede beëlist, zoodat het tijdperk der genezing er op volgt, volkomene krisis, (*crisis perfecta*). Grijpt er slechts eene kortstondige vermindering der koorts, met daarop volgende verflimmering, plaats, of verdwijnen er alleen maar eenige toevallen, terwijl de andere blijven aanhouden, dan is de krisis onvolkomen, (*crisis imperfecta*). Zijn de ontlastingen onduidelijk of onmerkbaar geweest, met daarop volgende verbetering, dan noemt men het eene onduidelijke krisis, (*lysis*).

Geschieden de ontlastingen langs éénen weg, dan is het eene eenvoudige krisis, (*crisis simplex*). Hebben er onderscheidene ontlastingen gelijktijdig plaats, eene zamengestelde, (*crisis composita*).

Houden de algemeene ziekte-verschijnselen en toevallen op, maar grijpt er eene plaatselijke ziekte plaats, — eene verplaatsing der ziektestof, (*metastasis*). Heeft deze verplaatsing naar een uitwendig, of tot instandhouding van het leven minder noodwendig deel plaats, waardoor de toestand des lijders verbetert, — eene ten goede neigende verplaatsing, (*metastasis bona*). Wordt de algemeene ziekelijke wederwerking op een der edelere deelen, tot onderhouding des levens onmiddellijk noodig, overgebracht, zoodat de eerst aanwezige koorts wel ophoudt of vermindert, maar het gevaar vergroot, — eene kwade verplaatsing, (*metastasis mala*).

Wordt de ziekelijke wederwerking, die zich bij voorkeur tot een der bewerktuigde stelsels bepaalde, dewijl de andere weinig te lijden hadden, van het eerste tot een ander overgebracht, zoodat de eerst

aan-

aanwezige ziekteverschijnselen bijna geheel ophouden, maar andere daarvoor in de plaats treden; om kort te zijn: wanneer de eene ziekte ophoudt en er eene andere geboren wordt, dan heeft er eene vormsverwisseling (*metaschematismus*) plaats. Deze uitgang der koorts behoort tot de onvolkomene ziekteverplaatsingen; wat bij deze ten aanzien van enkele deelen geschiedt, heeft hier met geheele stelsels plaats; dezelve is ten goede, wanneer het gevaar voor het behoud des lijders er door vermindert, (*metaschematismus bonus*); ten kwade, wanneer de tweede ziekte het gevaar vergroot, (*metaschematismus malus*).

De kritische ontlastingen hebben zelden door een afscheidend werktuig en eene enkele ontlasting plaats, meerendeels door onderscheidene te gelijk. In eens en plotseling geschieden zij door braking, buikloop, pisafscheiding, vermeerderde uitwaseming, zweet- en bloedontlastingen, langs gewone of ongewone wegen. Of zij hebben langzaam niet op ééns, maar allengskens, door dezelfde afscheidingen en ontlastingen, plaats. In het laatste geval verdwijnen de ziektegevallen en verschijnselen van tijd tot tijd, zoodat de overgang in gezondheid langzaam, en in een langer tijdsverloop volgt.

De hoeveelheid der ontlaste stoffe staat niet altijd met de hevigheid der koorts, en het gevaar dat zij insluit, in eene juiste evenredigheid. De zwaarste koortsen beslissen zich menigwerf door zeer geringe, in schijn niets betekenende ontlastingen; eenige weinige droppels bloed zich uit den neus ontlast hebbende, bedaren de zwaarste toevallen, en de ge-

zondheid keert daarop spoedig terug. Ligte koortsen, daarentegen, beslissen zich niet zelden door zeer ruime en zich veelmalen herhalende ontlastingen. Intusschen ziet men ook, in andere gevallen, eene zekere evenredigheid tusschen de hevigheid en het gevaar der koorts, en de hoeveelheid der ontlaste stoffen. De oorzaken van deze verschillen zijn te zoeken: eensdeels, in de individuëele gesteldheden des lijders en de geaardheid der koorts; anderdeels, in de uitwendige oorzaken, de epidemische gesteldheden, de landstreek, gewoonten, leefwijze, geneeskundige behandeling, enz.

Tot algemeene regelen, waarnaar men de kritische ontlastingen te beoordeelen hebbe, laten zich de volgende vaststellen:

- 1°. De ontlastingen moeten niet te overvloedig, maar ook niet te gering zijn; hoe meer zij eene zekere evenredigheid, met de hevigheid der koorts, met hare geaardheid, de gesteldheid des lijders en zijne krachten, in acht nemen, zoo veel te beter. De ontlastingen moeten bewerkt worden door die werktuigen, welke oorspronkelijk ziek, of met de lijdende stelsels en deelen in een meer of minder onmiddellijk verband, en tevens tot ontlastingen geschikt zijn, zoodat daaruit geene nadeelige gevolgen en een sterker plaatselijk lijden kunnen voortvloeijen.
- 2°. Eene ontlasting alleen heeft zelden eene volkomene en spoedige beslissing der koorts ten gevolge: waar zulks intusschen plaats heeft, moet de ontlasting eenigen tijd aanhouden, en de

de andere verrigtingen, voornamelijk de afscheidingen, allengskens tot den gezondheidsmatigen toestand wederkeeren; de afgescheidene stof eene bijzondere menging in hare samenstellende deelen te kennen geven. Meerendeels grijpen de kritische ontlastingen door onderscheidene wegen te gelijk plaats; een algemeen zweet, met pis, die sterk afzet; bloedontlastingen door twee of meer wegen; braken en buikloop, enz. Het verband, waarin de onderscheidene afscheidingen te dezen opzichte onder elkander staan, is zoo groot, dat de gunstige uitgang eener koorts dan eerst volkomen is, wanneer er tevens ook veranderingen in de afgescheidene stof door andere werktuigen plaats vinden. Een algemeen zweet, bij voorbeeld, wordt meerendeels dan eerst kritisch, wanneer de *urine* troebel wordt, en een zetsel vallen laat.

3°. De ontlastingen moeten niet in de eerste dagen der koorts, maar eerst na eenig tijdsverloop, en wel op onevene dagen, volgens de leer der kritische dagen, volgen. De juiste tijd, wanneer zij behooren plaats te hebben, laat zich niet bepalen, daar hij zeer verschillend is, volgens de hevigheid, de kwaadaardigheid en het karakter der koorts, volgens de bijzonder lijdende deelen, de jaargetijden en bijzondere gesteldheden des lijders.

4°. Onmiddellijk op de ontlastingen moet er beterschap en vermindering van alle ziekte-verschijnselen en toevallen volgen. In de meeste geval-

len zijn dit de eenigste en onfeilbaarste teekenen eener kritische ontlasting: want niet alle ontlastingen, die gedurende den loop eener koorts voorkomen, zijn kritisch; ook ontbreken zij zelden geheel; daarbij missen wij onfeilbare kenteecken, om zelfs dan, wanneer zij met andere gunstige omstandigheden gepaard zijn, bij voorraad het kritische eener ontlasting te bepalen. Omzigtigheid is derhalve van de zijde des Geneesheeren noodig, zoo wel om zich in zijne voorzegging eener gunstige uitkomst niet te misleiden en te leur gesteld te zien, als om te verhoeden, geene ontlastingen, die toevallig of een wezenlijk deel der koorts zelve zijn, eene bijzondere behandeling vereischende, tot groot nadeel voor den lijder, voor kritische te houden. Bij bijzondere epidemische gesteldheden en geaardheid der koortsen neemt men niet zelden ruime ontlastingen waar, die het zekerste kenteecken zijn, dat de koorts nog steeds toeneemt, en voorspellen eenen ongunstigen uitgang, door uitputting der zoo noodige krachten om het leven te behouden: somwijlen gebeurt het ook, dat eene in den beginne en volgens haren aanleg kritische ontlasting, door fouten in de geneeskundige behandeling, door fouten des lijders, of door toevallige omstandigheden, van den regten weg afwijkt, overmatig, en in de gevolgen voor den lijder hoogst schadelijk wordt.

5°. Gewoonlijk gaan er aan de kritische ontlastingen

gen zekere voorboden vooraf, die verschillende zijn naar de werktuigen, waardoor dezelve geschieden zullen: fomwijlen volgen zij echter plotseling zonder deze voorboden, of deze zijn zoo gering, dat zij niet waargenomen worden; ook kunnen zij aanwezig zijn, zonder dat er de *kritische ontlasting* op volgt.

a. Het *kritische zweet* heeft tot voorboden: eenen zachten, weeken, golvenden pols, die te voren klein, hard en ingetrokken geweest is. De eerst drooge, brandend heete huid wordt minder brandend, en eenigzins vochtig. De lijders klagen over jeukte, kieuwelen en steken in de huid; de *urine* wordt in eene kleine hoeveelheid afscheiden, en heeft een wolkje als hij koud is; de dorst vermindert, de tong is meer of minder vochtig bij koortsen, welker oorzaak voornamelijk onderdrukte en belette uitwasering is; bij katarrhalische en rheumatische, heeft men de afscheiding door zweet voornamelijk te verwachten; daarbij verdient er opgemerkt te worden, dat deze voorboden alsdan zelden bedriegen.

b. Eene *kritische pisontlasting* wordt aangewezen: door een gevoel van zwaarte, spanning en hitte in de lendenen, die het liggen op den rug moeilijk maken. De lijders zijn onrustig, de geslachtsdeelen en omtrek der blaas heet, gespannen en jeuken, de ballen opgetrokken. De pisontlasting is moeilijk, met sterken, telkens wederkeerenden aandrang, drooge, barre huid, dorst,

dorst, drooge tong, zachten, en niet zelden tusfcherpoozenden, pols.

- c. *Kritifche neusbloeding* heeft tot hare gewone voorboden: een' huppelenden, dubbelflagigen pols *palsus discrotus*). De hals-flagaderen beginnen fterk te kloppen, de ftrotaderen zijn met bloed opgevuld, het aangezigt rood en opgezet; hevige hoofdpijn, duizelingen, drukking en fpanning in de flapen en het voorhoofd boven de oogen, vonken en andere lichtverfchijnfelen voor de oogen, roodheid en tranen van dezelve, ruifchen in de ooren, jeukte en roodheid van den neus met eene waterachtige ontlasting, dikwijls niezen, zonder bepaalde oorzaken.

Hoezeer neusbloedingen de meest gewone kritifche bloedontlastingen zijn, kunnen dezelve echter ook door andere wegen gefchieden; als: door de baarmoeder en fchede, de fpeenaderen, de lùchtpijp en longen, de maag, enz.: hoogst zelden kunnen de twee laafte voor volkomen kritifch gehouden worden, daar het plaatselijke lijden van zoo gewigtige deelen, dat daarmede noodwendig gepaard is, veel grooter gevaar kan aanbrengen, als dat is, waarvan zij den lijder bevrijden.

Kloppende pijnen, fpanning, jeukte, hitte in de lendenen, de geflachts- en andere nabij gelegene deelen, aandrang tot de gewone ontlastingen, gepaard met die verfchijnfelen, welke ook buiten ziekten, bij anders gezonde perfonen, bij

man-

mannen aan de speenaderen of aanbeijen, en bij vrouwen aan de maandelijksche zuiveringen, voorafgaan.

Bloedspuwingen en bloedbrakingen geven zich door die teekenen te kennen, welke, met den vermeerderden aandrang van bloed, naar die deelen, waaruit zij plaats hebben, steeds gepaard gaan, en aan deze ziekten eigendommelijk zijn.

d. *Kritische buiksonstlastingen* hebben tot voorboden: een eigenaardig beven en trekken der bovenlip, stamelende spraak, weeken, tusfchenpoozenden pols, krimpelingen, en rommelen in den onderbuik, pijnlijke spanning, opzwellling en hitte in de bovenbuikstreek, onrust, pijn in den rug, ontlastingen van winden, spaarzame pisontlasting, fchielijk vochtig wordende tong, die te voren nog droog was.

e. *Kritische brakingen* zijn aangewezen: door onrust, duizelingen, verduistering der oogen, hoofdpijn, benaauwdheden, oprispingen, hik, drukking en zwaarte in de maagstreek, walging, misfelijkheid met dikwijls uitspuwen van een wit en taai slijm, vochtig wordende tong, koude rillingen, plaatfelijk zweet in het aangezigt, voornamelijk op het voorhoofd, witte kringen rondom den neus, beving der bovenlip, onregelmatigen pols en fomwijlen flauwten.

f. *Kritische fluimen* hebben spanning op de borst, droogen, kort afbrekenden hoest, benaauwdheid, korte ademhaling, gevoel van hitte en kitzeling in de luchtpijp en borstholte, zachten pols,

- pols, en katarrhalische aandoeningen der borst, gedurende den geheelen loop der koorts, tot hare gewone voorboden.
- g. *Kritische kwijling* heeft men te verwachten, wanneer de klieren van den hals, het aangezicht, de geheele omtrek van den hals en nek, en de handen opzwellen, met pijn in de keel, achter de ooren, in den nek, en vooral rondom de onderkaak, bij drooge huid en spaarzame ontlastingen door de gewone wegen.
- h. *Kritische verzweringsen* geven zich door pijn, roodheid, zwelling van eenig deel, onvermogen om hetzelfde te bewegen, koude rillingen, spaarzame uitwafeming en pisontlasting, vermindering van alle ziekte-verschijnselen en toevallen, zonder vermeerderde ontlasting, te kennen.
- i. *Kritische verstervingsen* worden door hitte, roodheid, pijn en ontvelling der opperhuid, voornamelijk aan die deelen, waarop bij het liggen de zwaarte van het ligchaam rust, aangewezen. De deelen worden spoedig gevoelloos, hard en zwart, de ziekte-verschijnselen nemen af, zonder aanwezigheid van andere kritische ontlastingen. In onze gewoonlijk heerschende kwaadaardige koortsen heeft deze beflissing dikwijls plaats.
- k. *Kritische huidsuitslag* heeft geene voorboden, die, met eenige zekerheid, aanwijzende kunnen genoemd worden, en zijn zoo verschillend, als deze uitlagen onderscheiden zijn. De meest gewone, die men waarneemt, zijn: volle golvende pols, roodheid, ligte zwelling, prikkeling en jeuk-

jeukte in de huid, hoofdpijn, ijlhoofdigheid, afwisselende koude rillingen met een gering zweet, prikkeling en steken in de leden, vooral in de gewrichten, lendenen, in het heiligbeen en onder de nagels, onrustigheid, doofheid der vingers en toonen, stamelende spraak en hoest.

Behalve de hier aangewezene en meest gewone wegen, waarvan zich de natuur tot behoud en herstelling bedient, zijn er nog vele anderen, waarvan zij zich tot dat einde bedienen kan, en somwijlen ook bediend heeft, die wij echter hier als minder algemeen, en wegens de onzekerheid harer voorboden, kunnen voorbijgaan. De oplettende zal zich met het gezegde, op bijzondere voorkomende gevallen verstandig toepasfende, wel weten te helpen. Voor hem, die dit niet is of kan, zoude ook de breedvoerigste uiteenzetting van alle mogelijke gevallen en wijzigingen niet genoeg zijn of baten.

Daar ons, gelijk reeds vroeger is aangemerkt, voor als nog een zeker en onfeilbaar teeken, behalve de volgende en duurzame beterschap, die op de voorafgegane ontlastingen volgt, ontbreekt, is het intusfchen voor den Geneesheer van het grootste belang, eene plaatsgrijpende ontlasting juist te beoordeelen, namelijk, of zij kritisch of toevallig is; daar zij in het laatste geval verslimmering der ziekte na zich sleept, en de genezing vertraagt, zal het hier niet ongepast zijn, kortelijk, die teekenen op te geven, waaruit men, wel niet met onbepaalde zekerheid, doch met veel waarschijnlijkheid, de kri-

kritische waarde der onderscheidene ontlastingen kan beoordeelen.

1°. *Het kritische zweet*, de gewoonste van alle kritische ontlastingen, zoodat het zelden geheel ontbreekt. Koortsen, door belette uitwaseming en schiekelijk afwisselende hitte en koude veroorzaakt, komen daarmede gewoonlijk tot scheiding. Het zweet moet gelijkmatig over het geheele ligchaam, niet te gering, maar ook niet te overvloedig zijn; de huid moet overal gelijkmatig van warmte, niet brandend heet, de pols ook week en golvend zijn, de tong vochtig worden, de dorst verminderen, de pis, gedurende of kort na het zweet geloosd, een bezinkfel laten vallen: na den afloop van het zweet gevoelt de zieke zich verligt, iedere der nog volgende koortsverheffingen is minder sterk, en eindigt met een algemeen zweet. Het zweet heeft een' eigenaardigen reuk, en verft het linnen dat de lijder draagt, meer dan gewoon, met eene gele kleur.

2°. *Kritische pis*, overvloedige, gemakkelijke ontlasting, in een tijdperk der koorts, waarin men kritische ontlastingen te verwachten heeft. Koud geworden zijnde, vertoont hij eerst een wolkje, dat bij langer staan in een bezinkfel overgaat. Dit bezinkfel is wit of rood, zamenhangend, ligt, vlokkig, gelijksoortig, in het midden een weinig verheven; de daarop staande pis is meer helder dan troebel, en zonder reuk. De toe-

val-

vallen verminderen, de pols wordt week, noch gespannen, noch hard, en de huid eenigermate vochtig. De pis, die des morgens en bij het afgaan der koortsverheffingen geloosd wordt, kiest men bij voorkeur tot dit onderzoek; zij moet met geene vreemde stoffen gemengd, in een glas gedaan en eenen genoegzamen tijd blijven stilstaan, daar de tijd, waarin zich het bezinkfel afzet, zeer verschillend van duur is, dan eens binnen eenige, dan ook eerst na verloop van tien tot twaalf uren plaats grijpt.

3°. *Kritische bloedontlastingen*, ontstekingsziekten bij jonge volbloedige lijdens, na onderdrukte en verzuimde bloedontlastingen, na misbruik van sterken drank, eene zeer prikkelende leef- en prikkelende geneeswijze, beslissen zich doorgaans met kritische bloedvloeijingen. Zij gaan gepaard met eene in het geheel slagaderlijke vaatstelsel gelijkmatig vermeerderde wederwerking, geëvenredigd aan de krachten des lijdens. Zij moeten niet te overvloedig zijn, en door organen geschieden, die, zonder eenige nadeelige gevolgen, bloedontledingen uit hunne vaten verdragen. Te overvloedig zijnde, putten zij de krachten uit. Bij groote slapheid der vaste, en dunheid der vloeibare deelen, zijn zij zeer gevaarlijk, en ontaarden ligtelijk in uitputtende (*colliquationes*) vloeijingen. Bij zenuwkoortsen kunnen zij slechts onder zekere omstandigheden, als plaatselijke ontstekingen of *congesties* daarmede

gepaard gaan, nuttig zijn. Bij rotkoortsen zijn zij steeds nadeelig.

- 4°. *Kritische buikontlastingen* kan men verwachten bij alle koortsen, waarin materiële oorzaken in de eerste wegen aanwezig zijn; bij gastrische en alle andere met eene bijzondere aandoening der buiksingewanden verbonden. De epidemische en jaarsgesteldheden geven aan eenige eene bijzondere neiging, om zich door deze soort van ontlastingen te beflissen; daar deze een deel der materiële oorzaken ontlasten, moeten zij door eene spoedige verligting in de toevallen gevolgd worden, gedurende de *remissie* of *intermissie* der koorts niet overmatig en zonder de krachten uit te putten, plaats hebben; de tong wordt daarbij vochtig; de huid gelijkmatig warm, vochtig, door een zacht zweet bedekt; de ontlaste stoffen zijn meer gebonden dan vloeibaar, en wijken niet zeer van den gezondheidsmatigen toestand af, alhoewel er ook aanmerkelijke afwijkingen kunnen plaats hebben.
- 5°. *Brakingen* zijn vooral dan voor kritisch te houden, wanneer zij in het begin der koorts van zelve ontstaan, en de materiële oorzaak, die de koorts voortbragt en onderhoudt, in de maag nog aanwezig, er door ontlast wordt, als: onverteerde spijsen, taai slijm, gal, wormen of andere in de maag gebragte vreemde aardige stoffen: een algemeen en gelijkmatig zweet volgt gewoonlijk daarop, de lijder gevoelt zich met
iede-

iedere braking verligt. In de latere tijdperken der koortfen, waar geene materiële oorzaken in de maag meer aanwezig zijn, is het braken doorgaans een kwaadvoorspellend toeval. Hoewel het niet te ontkennen is, dat de ontlaste schadelijke stoffen het niet alleen zijn, waardoor het braken heilzaam wordt, de algemeene wederwerking, die het opwekt, de schudding, die de geheele bewerktuiging daarbij ondergaat, hebben daarbij een gewigtig aandeel, en kunnen alleen toereikende zijn, om eene verandering ten goede te bewerken.

6°. *Kritische fluimen* moeten dik, geelwit van kleur, zonder reuk en smaak zijn; van elkander afgescheiden blijven; niet in een vloeijen; door een schuimend slijm voorafgegaan worden; verligting in die toevallen, welke gevolgen van de aandoening der borst zijn, aanbrengen; niet in het begin, maar in de meer gevorderde tijdperken der koorts ten voorschijn komen; met eene gelijkmatig warme en vochtige huid, weeken pols en pis met een witachtig zakfel gepaard gaan.

7°. *Kritische kwijling* neemt men somwijlen bij de kinderpokjes, mazelen, gierstuitslag, keelontstekingen, zenuw-, rot- en *catarrhale* koortfen waar; waar zij kritisch voorkomt, ontstaat zij geheel uit zich zelve; men moet oplettende zijn, om geene kwijling, die een gevolg van kwik of andere de speeksel afscheiding bevorderende geneesmiddelen is, voor kritisch te houden;

zij moet niet te overmatig zijn; eenige dagen aanhouden, gepaard met eene zachte huiduitwaseming en afzettende pis; in een tijdperk der koorts te voorschijn komen, waarin men kritische ontlastingen te verwachten heeft.

8°. *Kritische verzweringsen* ontstaan in de uitwendige of oppervlakkig gelegene deelen; meeren-deels in het celwijze weeffel, als eene ware *phlegmone*; in de oorklieren, de klieren onder de oksels en de liezen; plaatselijke niet zeer langdurende ontstekingen, met eene algemeen vermeerderde wederwerking in het vaatstelsel, gaan vooraf. Binnen twee of drie maal 24 uren heeft er eene volkomene verëtering plaats; de etter is geelwit van kleur en dik als melk-room, zonder reuk en smaak; zijne afscheiding is ruim, maar niet overmatig; de krachten nemen daarbij meer toe dan af; alle ziekteverschijnselen en toevallen verminderen; de lijders voelen zich steeds meer verligt; hunne voormalige gezondheid keert terug.

9°. *Kritische verstervingen* moeten, wanneer de koorts haren hoogsten trap bereikt heeft, in eene zekere niet te zeer beperkte uitgebreidheid, schielijk, binnen het tijdsverloop van vier en twintig uren, ontstaan, zich niet te verre en over geene zeer belangrijke deelen uitbreiden, daar zij anders in hare gevolgen doodelijk kunnen worden. Zenuw- en rotkoortsen hebben somwijlen eene bijzondere geneigdheid, vooral in *epidemiën*, om zich op deze wijze te beflissen.

10. *Kri-*

10°. *Kritisch huiduitslag* gaat met vermeerderde wederwerking van het huidorgaan en flagaderlijk vaatstelsel gepaard. Het uitslag is meer algemeen dan plaatselijk; de huid vochtig, de pistroebel, met een wolkje of zetsel; de aanwezige ziekteverschijnselen verminderen in dezelfde evenredigheid, als het uitslag uitbot.

VIII.

De voorzegging in koortsen.

(*Prognosis*).

De voorzegging in koortsen is de gewigtigste, maar tevens ook de moeilijkste kunst des Geneesheeren. Hij moet uit het tegenwoordige tot het toekomstige besluiten, en voorzeggen wat er gebeuren zal. Juiste beoordeeling, bekend zijn met de waarnemingen en ervaringen der beste Geneesheeren uit alle eeuwen en landstreken, zijn de middelen, welke hem daartoe in staat stellen. Het menigvuldige der ziekteverschijnselen en toevallen, dat bij koortsen plaats heeft, hare *complicatiën* en vele andere bijkomende gesteldheden en omstandigheden, gegrond in het ligchaam zelf, of in de ons omgevende natuur, zijn de zwarigheden, welke het hem zoo uiterst moeilijk maken, de uitgangen der koortsen in gezondheid, dood, of in een' anderen ziektevorm, de wijze hoe, en den tijd wanneer, te voorspellen. Zij is gewichtig voor den Geneesheer, omdat zij

hem leeraart, zijne behandeling in dier voege in te rigten, dat zij aan den verderen loop der koorts beantwoorde en afwere, wat nog af te weren is. Ook verschaft zij hem, aan de uitkomst beantwoordende, een zeker aanzien bij den leek in de kunst, en een overwigt boven zijnen minder oplettenden kunstgenoot.

Als algemeene regelen voor de voorzegging in koortsen komen voornamelijk in aanmerking :

- 1°. Dat men nimmer bij het eerste bezoek van eenen koortslijder, zoo lang er nog twijfelingen omtrent het karakter der koorts, de bijzondere gesteldheid des lijders, en ten aanzien van andere belangrijke omstandigheden en betrekkingen, overig blijven, eene stellige voorzegging uitspreke.
- 2°. Dat men alles, wat tot den toestand des lijders betrekking heeft, naauwkeurig onderzoekte, en steeds in het oog houde, dat eene schijnbare niets beteekenende koorts, zonder kwade teekenen, spoedig eene andere gedaante aannemen en doodelijk eindigen kan.
- 3°. Dat men zijne voorzegging niet al te stellig inrigte; eene daaraan niet beantwoordende uitkomst brengt den besten Geneesheer in wantrouwen bij zijne lijders; men spreke, gelijk de beroemde REIL zegt, naar de zeden der orakels in tweeledige bewoordingen. Intuschen moet zulks niet beletten, daar, waar de ligtheid of gevaarlijkheid der toevallen eene meer stellige verklaring toelaat, bepaald leven of dood te verkondigen.

4°. Men

- 4°. Men beoordeelde de koortfen steeds eenigzins gevaarlijker dan zij zijn , en rigte daarnaar zijne voorzegging. Eene gunstige uitkomst , na eene kwade voorspelling , doet minder kwaad aan de beoordeeling des Geneesheeren , door den leek in de kunst , dan eene kwade uitkomst na eene gunstige voorspelling. „ De Dokter „ heeft de ziekte niet gekend , en er geen ge- „ vaar in gezien ,” hoort men dan duizend malen herhalen.
- 5°. De voorzegging moet niet op een enkel goed of kwaad voorspellend toeval gegrond zijn , maar alle onder elkanderen vergeleken en beoordeeld worden. Wegens een kwaad verschijnsel moet men niet terstond alle hoop verloren geven ; maar , om een goed teeken ook niet te veel beloven , steeds in het oog houdende , dat enkele in het afgetrokkenene beschouwde goede of kwade voortekens niets beslissen , wanneer zij met de algemeene gesteldheid des lijders in tweestrijd staan. Temperament , gewoonte , karakter , *idiosyncrasien* en vele toevalligheden kunnen daartoe de oorzaken geven , en dezelve onafhankelijk van de koorts zelve voortbrengen.

De voorzegging zelve moet gegrond zijn :

- 1°. *Op de algemeene geaardheid der koorts* , waarbij in aanmerking komt :

a. Haar karakter. De ontstekingskoortfen zijn minder gevaarlijk dan de gastrische , de gevaarlijkste zijn de zenuw- en rotkoortfen ; de

toevallige koortfen (*Febres symptomatiae*) zijn zelden zonder gevaar; de hoegrootheid daarvan is geëvenredigd aan de mogelijkheid, gemakkelijheid, of moeilijheid in het wegnemen van hare oorzaken.

Van eene kwade voorbeteekenis zijn, hoedanig haar karakter ook wezen moge, fterk, fmeltend, de krachten uitputtend, kleverig, ftinkend, meer koud dan warm en plaatselijk zweet; aanhoudende buikloop zonder verligting der ziekteverfchijnselen, in de meer gevorderde tijdperken der koorts, waarin anders kritifche ontlastingen plaats hebben; zwarte, troebele, met bloed gemengde, ftinkende pis; belemmerde, fpaarzame en moeilijke ontlasting van dezelve; blaauwe kleur van het aangezicht, lippen, neus en ooren, der nagels aan handen en voeten, zonder gevoel van koude; drooge, zwarte, gekorvene tong, lippen en inwendige oppervlakte der mondholte, zonder dat de lijder over dorst klaagt, geene verkiezing maakt in het gebruik van dranken, en niets of alles zwelgt, wat hem in den mond gebragt wordt, wanneer de adem en het geheele ligchaam een' onaangenamen eigenaardigen reuk van zich geven; groote aandoenlijheid of gevoelloosheid der zinnwerktuigen, zenuwtoevallen, tandenknaarsen, mondklem, verftijving, watervrees, kramp-trekkingen, verlammingen, vooral van de fluitfpieren, de daarvan afhankelijke onwillekeurige

ge ontlasting der drekstoffen en pis, het zogenoemde muggevangen, pluizen met de handen, opspringen der pezen, slaapzucht of geheele slapeloosheid, flauwten, kaauwende bewegingen met de lippen, enz.

- b. *Haar typus.* De aanhoudende koortsen, met het karakter van *Typhus*, zijn gevaarlijker dan de nalatende, en deze gevaarlijker dan de tusschenpoozende; het gevaar, dat zij insluiten, wordt beoordeeld uit de aanwezigheid of niet aanwezigheid der opgenoemde toevallen.

Een onregelmatige *typus* in het begin eener koorts voorspelt niet veel goeds, het grootste gevaar, wanneer deze onregelmatigheid blijft voortduren; een steeds vooruitspringende *typus*, het verdubbelen van denzelfven en geheel in elkander loopen, is mede van eene kwade voorbeteekenis.

- c. *Haar duur.* Langdurige koortsen laten eene verborgene oorzaak vermoeden, die niet ligt weg te nemen is; de chronische zijn derhalve over het algemeen gevaarlijker dan de *acutae*; hoe langer eene koorts duurt, zoo veel te gevaarlijker is zij.

- d. *De voornamelijk lijdende deelen.* De eenvoudige koortsen, waarbij geen deel bijzonder aangedaan is, zijn de minst gevaarlijke; de gevaarlijkste die, waarbij de belangrijkste stelsels en deelen het meeste liden. De zenuwkoortsen zijn derhalve de gevaarlijkste van alle, de vaatkoortsen gevaarlijker dan de gas-

trifche en galkoortfen, en deze gevaarlijker dan de zuivere, zinking- en rheumatische koortfen; omdat bij de eerfte het herfen- en zenuwftelfel, bij de tweede de vaten, bij de derde de fpijsverterings- en galaffcheidende werktuigen, bij de laafte de flijmvliezen en fpiervezel, de voornaamst lijdende deelen zijn. Hoe meerdere ftelfels er te gelijk lijden, en hoe gewigtiger zij tot onderhouding des levens zijn, zoo veel te grooter is het gevaar. Vooral is het van eene flechte voorbeteekenis, wanneer de ingewanden der drie groote holligheden door fthenifche of afthenifche ontftekingen aangedaan zijn, of als er ophooping van vochten, die de vaten te zwak zijn voort te ftuwen, gelijktijdig plaats grijpen.

Deze aanwijzende toevallen zijn voor het hoofd: flaperigheid, flaapzucht, zware, drukkende of kloppende hoofdpijn, belemmerde verrigtingen der zinwerktuigen, verfehijningen voor de oogen, flaa met half opene oogen, gefloten zijn van het eene en openftaan van het andere, — een teeken dat meestal doodelijk is, — raaskallende ijlhoofdigheid, fterk kloppende hals- en hoofdflagaderen, rood opgezwollen aangezigt, ftrakftaande, roode, tranende oogen, het hooren van vreemde klanken, groote onrust, vrees voor niet beftaande gevaren, voor vervolgingen, gevangennemingen, enz.

Voor

Voor de borstholte: moeilijk liggen op den rug, overeind zitten in het bed, ontblooten der borst, grijpen naar dezelve en krabben, dat dikwijls een wroeten in het vleesch wordt, moeilijke, zware ademhaling, kort afgebrokene en schielijke, tegennatuurlijke hitte of koude der uitgeademde lucht, reutelende, met krampachtige bewegingen van de borst- en buikholte, waarbij de ribben en het borstbeen onbewogen blijven, sterke beweging der neusvleugels bij iedere inademing, en achterovergebogene stand van het hoofd, gepaarde ademhaling, is hoogst gevaarlijk, meerendeels doodelijk, daar zij verlamming en versterking in de ademhalingswerktuigen aanwijzen.

Voor de buikholte: pijnlijke, trommelzuchtige zwelling van den buik, gevoel van hitte, drukking, klopping en benaauwdheid, korte, moeilijke ademhaling, braken met ontlasting van zwarte stinkende stoffen, voortgelijke buiksonstastingen, stinkende pis of terughouding van dezelve. Meerendeels voorstellen deze toevallen den nabijzijnde dood.

Algemeene hieronder nog behoorende toevallen, die groot gevaar en dikwijls den dood aanwijzen, zijn: ongelijkmatige warmte, ijskoude neus, aangezicht, handen en voeten; brandend heet voorhoofd en borst; uitwendig gevoel van koude, met inwendige brandende hitte, of uitwendige hitte met een ijskoud gevoel in de inwendige deelen; versterking
van

van het eene of andere ingewand is daarvan de oorzaak. Ook is het zeer kwaad, wanneer de eerst over hevige pijnen en andere onaangename ontwaarwordingen aanhoudend klagende, of raaskallend ijhoofdige lijder, zich plotseling verligt gevoelt en het verstand terug keert.

- 2°. *Op de natuurlijke gesteldheid des lijders.* Gezonde, sterke personen staan ligter eene koorts door dan zwakke, die vooraf reeds zickelijk en met plaatselijke aandoeningen der ingewanden behebt waren; personen van een traag en min prikkelbaar temperament, gemakkelijker, dan zeer aandoenlijke en prikkelbare gestellen.

Bij hoogbejaarde lieden zijn koortsen gevaarlijker dan bij jonge, in den mannelijken leeftijd doorgaans het minst gevaarlijk; maar deze regel heeft vele uitzonderingen: er zijn epidemiën, die voor de gezondste en sterkste, in den vollen bloei harer jaren levende personen, het gevaarlijkste zijn; andere zijn gevaarlijker voor kinderen, andere voor jongelingen, andere voor deze of gene sekse.

- 3°. *Op de gesteldheid der levenskrachten.* Hoe meer de onderscheidene verrigtingen aan elkander gegevenredigd zijn, en met gelijkmatige sterkte geschieden, hoe meer de wederwerking der bewerktuiging op gewone en ongewone, en onder deze, voornamelijk op de ziekmakende schadelijkheden, aan den gezondheidsmatigen toestand wederwerken, zoo veel te geringer is het ge-

gevaar ; hoe meer zij afwijken , zoo veel te grooter. Van eene zeer flechte voorbeteekenis zijn derhalve :

- a. *Schielijk verminderende spierkracht.* De lijder blijft onbewegelijk in zijne eenmaal aangenomene ligging ; hij kan zich niet bewegen ; zinkt onder de handen weg , wanneer men hem wil oprigten ; zakt bestendig naar het voeteneinde zijner legerstede ; de oppassers klagen over zijne meer dan gewone en steeds toenemende zwaarte.
- b. *Groote zwakte van het h art en vaatstelsel,* waardoor de bloedsomloop gestoord wordt , kleine , schielijke , naauwelijks voelbare tuschenpoozende pols , flauwten , bleek ingevallen aangezicht , wegzinkende pols , moeijelijk waarnemende hartslag , die eene trillende beweging aanneemt , verkondigen den dood.
- c. *Zwakte en werkeloosheid van het hersen- en zenuwgestel.* Ongevoeligheid voor zinnelijke ontwaarwordingen , onverschilligheid , bevende tong , flauwe oogen , doofheid , verlammingen , openstaande mond , ne rhangende oogleden en onderkaak , onwillekeurige ontlastingen der drekstoffen en van de pis , onzekerheid en onvermogen , om willekeurige bewegingen ten uitvoer te brengen ; de lijder wil spreken , maar heeft het vermogen niets om toonen te articuleren ; hij wil drinken , maar maakt ondoelmatige bewegingen , en laat het vocht weder uit den mond loopen. Hij laat
zij-

zijne ledematen bevrozen en verbranden, zonder daarvan iets te gevoelen.

d. Verminderde prikkelbaarheid. Prikkel, die bij andere voorwerpen sterk op de huid inwerken, blijven onverschillig; vliegenpleisters en mostaardpappen doen zeer weinig, langzaam of geheel geene werking; de lijder gevoelt er niets van; al de afscheidingen gaan traag voort, verminderen, eenige houden geheel op; zweren en etterdragten geven geen etter meer; de *pupil* is zeer verwijderd en onaandoenlijk voor het licht.

4°. *Op de geaardheid der toevallige oorzaken.* Deze hebben mede eenen zeer gewigtigen invloed op de voorzegging; hoe veelsoortiger zij zijn, die eene koorts voortbrengen, zoo veel te slimmer is zij, vooral dan, wanneer zij bij voorkeur op die werktuigen en stelsels ingewerkt hebben, welke tot onderhouding van het leven volstrekt noodzakelijk zijn, en van welker doelmatige werking de gezondheid afhankelijk is. Oorzaken, die op het zenuwstelsel, het slagaderlijke vaatstelsel en de ademhalingswerktuigen onmiddellijk inwerken, verbinden steeds het grootste gevaar met haar aanwezen, dat nog grooter wordt, wanneer zij op eenige, of op alle te gelijk, haren schadelijken invloed uitoefenen. De langere duur harer inwerking, de moeilijkheid of onmogelijkheid om ze weg te nemen en te bestrijden, doet zoo veel te meer eenen ongunstigen uitslag vreezen. Eene
flech-

lechte lucht, die de lijder moet blijven inademen, ongezonde woningen, waaruit hij niet kan verwijderd worden, bedorvene spijsen en dranken, gemoedsaandoeningen en hartstogten, welker schadelijke inwerkingen blijven voortduren, leveren zeer gewigtige momenten voor de voorzeggings, die, onder zulke omstandigheden, zeer zeldzaam gunstig zijn kan.

5°. *Eene gunstige voorzeggings* moet zich voornamelijk daarop gronden, dat de kritische ontlastingen ten behoorlijken tijde en onder de daartoe behoorende verschijnselen plaats grijpen; dat de ontlastingen niet overmatig, de ontlaste stoffen natuurlijk, de krachten welgesteld, de pols langzamer en week, de huid en tong vochtig, de slaap natuurlijk, de zielsverrigtingen van hare plaatshebbende afwijkingen tot den gezondheidsmatigen toestand wederkeeren, en de zinwerktuigen, door hunne gewone en eigenaardige prikkels, noch te sterk noch te zwak aangedaan worden, en de daarvan afhankelijke ontwaarwordingen in het zielsorgaan overeenkomstig de gewone regelen zijn. Waar de kritische ontlastingen geheel achterwege blijven, overmatig worden, de krachten uitputten, te voorschijn komen, maar zeer spoedig onderdrukt worden en ophouden, de ziekteverschijnselen en toevallen vermeederen, de lijder zich slimmer gevoelt, bevindt hij zich in het grootste gevaar.

6°. *Onderlinge evenredigheids der ziekte toevallen.*

Hoe

Hoe meer de ziekteverschijnselen onder elkander in zekere evenredigheid en verband blijven, hoe regelmatig de geheele loop der ziekte, zoo veel te beter: kwaad is het, wanneer het tegendeel plaats heeft. RICHTER zegt: „het is altijd „goed, wanneer de lijder de ziekte, aan hare „natuur geëvenredigd, doorworstelt, kwaad- „het tegendeel.” Kwaad is het derhalve, wanneer alle toevallen eenen hoogen trap der koorts en pijnen aanwijzen, en de lijder zegt: zich wel te bevinden, en geene pijnen te gevoelen. Minder kwaad is het, wanneer de lijder zich zeer ziek waant, en tevens wegens zijnen toestand zeer beangst is, zich, onder het aanhoudendste uitboezemen van klagten en zuchten, onrustig in het bed heen en weder werpt. Dikwijls is zulks alleen in *idiosyncratien*, verkeerde opvoeding, en de zedelijkheid des lijders gegrond. Ongewone opgeruimdheid en vrolijkheid zijn van even kwade voorbeteekenis, als groote treurigheid, stille wanhoop en volstrekte onverschilligheid. Groote dorst met vochtige tong en weinig koorts, of geheel geen dorst, bij drooge, ruwe tong en hevige koorts, voorspellen nimmer iets goe s.

- 7°. *De uitwendige omstandigheden en betrekking des lijders.* Hieronder behooren, in het algemeen, de geheele huishoudelijke en burgerlijke betrekking des lijders, zijne woonplaats, verpleging, het karakter der omstanders, en van hen, welke met zijne oppassing belast zijn, voornamelijk

lijk hun gedrag tegen hem; het gedrag en de behandeling des Geneesheeren, en het vertrouwen, dat de lijder in hem stelt.

Wanneer deze onderscheidene betrekkingen voor de omstandigheden ongunstig zijn, kan eene ook anders ligte koorts gevaarlijk worden, en de voorzegging ongunstig maken.

Als bijzondere stellingen, waarop de voorzegging gegrond is, laten zich uit het voorafgegane voor de koortsen de volgende afleiden:

Het is kwaad, wanneer alle ligchamelijke en zielsverrigtingen geheel van hare, bij den lijder natuurlijke geaardheid afwijken; wanneer de zedelijk goede en wezenlijk vrome vloekt en raast; de goddelooze en zedelooze bidt en om vergiffenis smeekt; de zachtzinnige beleedigend en woest; de ruwe woesteling zachtzinnig en bescheiden; de schaamachtige schaamteloos; de schaamteloze schaamachtig; de teeder aan zijne naastbestaanden en vrienden verknochte, onverschillig tegen de hem anders dierbaarste personen wordt; wanneer de lijders niet weten waar zij zijn, zich steeds aan eene andere plaats, en door voorwerpen omringd wanen, die er slechts op uit zijn om hun kwaad te berokkenen; wanneer de gelaatstrekken veranderen, de lijder onkenbaar wordt, het aangezicht invalt, de oogen flauw en de neus spits worden (*facies Hippocratica*) en de zinwerktuigen onaandoenlijk of al te gevoelig zijn. Aanhoudende ijlhoofdigheid, pijn, slaapzucht, roode, halfgeflotene, tranende, verdraaide oogen; drooge, geheel zwarte, bevende tong; moeilijke, schielijke, kortafbrekende, ongelijke, reutelende, koude

ademhaling; harde of samengetrokkenene, bij het aanraken pijnlijke bovenbuikstreek; trommelzuchtige opzwellling van den buik; brakingen met ontlasting van zwarte, wankleurige, stinkende, stoffen; koude ledematen; kleverig, stinkend, koud zweet; geel gekleurde huid, zonder voorafgegane geelzucht; buikloop met zeer stinkende en wankleurige stoffen; langdurige, hardnekkige verstopping; verminderde afscheiding, opstopping of onwillekeurig afloopen van de pis, welke zwart, wankleurig, stinkend en troebel is; opspringen der pezen, stuipen, kramptrekkingen, de hik, verstijving, mondklem, watervrees, blaauwe, bruine, zwarte vlekken, plaatselijke ontstekingen met versterkingen, flauwten, bloedvloeiingen, bloedige ontlastingen en zweet; onderdrukking of uitblijven der maandelijke zuivering bij vrouwen; rommelend geluid bij het slikken, enz.: hoe meerdere van deze toevallen er gelijktijdig aanwezig zijn, zoo veel te grooter is het gevaar, dat zij aanwijzen.

IX.

Algemeene geneeswijze der koortsen.

Zoo lang het eigenlijke wezen en de kennis van de naaste oorzaak der koortsen voor den geneesheer een onbekend veld blijft, zoo lang zal ook derzelver geneeskundige behandeling meer empirisch dan rationeel zijn en blijven. De ervaring leert, dat zich weinige algemeen geldende regelen voor de behandeling laten vaststellen; dat bijna ieder koortsvorm, volgens deszelfs onderscheidene wijzigingen en geaardheden, ten aanzien der verwijderde oorzaken, der gesteld-

fteldheid van de levenskrachten, der toevallen, der uitwendige omftandigheden des lijders, en vele andere oorzaken, eene verfchillende en bijzondere geneeswijze vordert. Intusfchen laten zich eenige regelen vastftellen, die wel hunne uitzonderingen hebben, doch op vele gevallen toepasselijk zijn, en zoo lang voor algemeene moeten aangenomen worden, als ons betere ontbreken, om in hunne plaats te ftellen.

Niet in alle koortfen mag de geneeskundige behandeling even werkdadig zijn. Vele genezen even spoedig en zeker, wanneer men ze aan zich zelven overlaat, als wanneer men krachtige geneesmiddelen daartegen aanwendt. Waar geene materiële oorzaken aanwezig, de ftoornis der verrigtingen niet groot, de gefteeldheid der levenskrachten en hare wederwerking alleen in zekere mate verhoogd, verminderd en veranderd zijn; waar de natuur zelve de materiële oorzaken door doelmatige ontlastingen verwijderd heeft, of bezig is zich daarvan te ontdoen; waar men in den beginne eener koorts nog twijfelachtig is, om den juisten weg te vinden, die ter genezing leidt, behoort de verftandige, eerlijke man, wien het belang zijner kunst, boven eigenbelang, of ijdele roemzucht, naar welke de kwakzalver dingt, gaat, de genezing geheel aan de natuur, of zoo lang, tot dat er omftandigheden plaats grijpen, die zijne hulp vereifchen, over te laten.

Waar het tegendeel der genoemde omftandigheden beftaat, materiële oorzaken aanwezig zijn, waarvan zich de natuur zonder hulp niet ontdoen kan; waar de levenskrachten en de daarvan afhankelijke wederwerking der bewerktuiging, door te veel, te weinig

of door hare onevenredigheid vernietiging dreigt ; waar de koorts door haren langeren duur het leven in gevaar brengt , moet de geneesheer een handelende perfoon zijn , en geen onverschillig aanschouwer blijven.

Men onderscheidt derhalve de geneeskundige behandeling der koortsen in de afwachtende (*methodus expectativa*) en werkdadige (*methodus activa*).

1°. *Methodus Expectativa*. Bij ligte koortsen met matig vermeerderde wederwerking, (*febris phrenica*) ; bij koortsen , die met plaatselijke natuurlijke gesteldheden gepaard gaan , en daarbij noodzakelijk zijn , bijv. de zogkoorts , de wondkoortsen , de koortsen bij huiduitslag , goedaardige pokken , mazelen , roodvonk , enz. ; bij koortsen , die door eene ligte en voorbijgaande oorzaak voortgebracht zijn , en waar men omtrent hare geaardheid twijfelachtig is , (het is beter in de beginfelen eener rot of zenuwkoorts niets te doen , dan dezelve voor eene ontstekingskoorts te houden en *antiphlogistisch* te behandelen) , behoort de afwachtende geneeswijze door den geneesheer steeds gevolgd te worden. In vele gevallen blijft het ten hoogste moeilijk , de juiste grenzen af te palen , waar de geneesheer een waarnemend aanschouwer , of een handelende perfoon zijn moet. De geschiedenis der geneeskunst is rijk aan voorbeelden , hoe nadeelig het voor de menschheid worden kan , wanneer de grenzen op de eene of de andere zijde overschreden worden. Niets doen , heeft

heeft in de geneeskunst even zoo wel zijne offers aan het menschdom gekost, als het te veel doen.

In vele gevallen bevindt de Geneesheer, ten volle overtuigd, dat de afwachtende geneeswijze, het niets doen, de beste voor den lijder zijn zoude, zich in de noodzakelijkheid, ten minste in schijn, iets te doen, indien hij waarlijk het welzijn zijns lijders bedoelt. De lijder wil een recept en geneesmiddelen; men ontdoet zich van eenen Geneesheer, die het niet te schrijven weet, en roept eenen anderen, die meer gediensfig en vaardiger in het voorschrijven is.

De verstandige man zal zich weten te helpen, en zoo er toch een recept moet geschreven worden, ligtelijk iets voorschrijven, dat onschadelijk te gebruiken is. Een aftreksel van vlierbloemen met vlierconserf, *spiritus mindereri, nitri dulcis*, het eene of andere middenzout in kleine giften, *oxymel simplex* met water of iets dergelijks, waarbij men echter steeds de oorzaken, die de koorts voortgebragt hebben, de gesteldheid der levenskrachten en de wederwerking, die den trap harer opwekking aanwijzen, in het oog houdt. Vooral zorg men daarbij, om aan den lijder eene strenge diët voor te schrijven, en als drank niets dan limonade, flappe thee, zoete wei, water en melk, of eene andere verdunnende drank toe te staan.

Voor min geoefenden kunnen de volgende voorschriften tot voorbeeld en aanleiding dien-

ftig zijn, waaruit men naar welgevallen eene keuze doen kan:

N^o. 1.

R_φ. *Niti deparati* 3j.
Rob. samb. 3j.
Aq. coct. 3vj.
M. D. S.

Om de twee uren een'
 of twee lepels.

N^o. 2.

R_φ. *Infus. flor. samb.* 3vj.
Spirit. mind. 3j.
D. S.

Om het uur een' lepel vol.

N^o. 3.

R_φ. *Sal. polych.* 3ij.
Tart. emet. gr. j.
Aq. cort. 3vj.
Oxym. simpl. 3 iij.
M. D. S.

Om het uur een' lepel.

2^o. *Methodus activa.* De toediening der werkdadige geneeswijze vordert meerdere geneeskundige kennis en diepere inzigten in de bewerktuiging en hare verrigtingen, daar het doel, dat men daarmede te bereiken tracht, de genezing der koorts is.

De wegen, welke men daartoe inflaat, de regelen, welke men volgt, die gegrond zijn moeten op eene juiste beoordeeling der geheele gesteldheid des lijders en de geaardheid der koortsen, noemt men de aanwijzingen ter genezing, (*indicationes*).

De

De onderscheidene, algemeen door de Geneesheeren aangenomene volgregelen ter behandeling der koortsen, met uitzondering van die, welke alleen uit enkel stelselmatige en leerstellige beschouwingen afgeleid zijn, zullen wij hier, als daartoe de plaats zijnde, nader trachten te ontwikkelen.

1°. „Men spore de verwijderde en toevallige oorzaken der koortsen op, en trachte dezelve op te ruimen en weg te nemen, waar zij nog aanwezig zijn en voortwerken.”

Waar zoodanig eene oorzaak bestaat, zonder dat zij verwijderd wordt, onderhoudt zij niet alleen de koorts, maar doet haar ook verslimmen; de geheele en volkomene genezing rust op derzelver opruiming.

De eerste en voornaamste bezigheid des Geneesheeren behoort derhalve ook hierin te bestaan, dat hij naauwkeurig onderzoekte, waarin de uitwendige of toevallige oorzaak gelegen zij, en de middelen berame en in het werk stelde, waardoor dezelve langs den kortsten weg en het spoedigst kan opgeruimd worden. Men verwijdere vreemdaardige prikkels, neme splinters of andere vreemde lichamen weg, herstelle beenbreuken en ontwrichtingen, ontlaste de schadelijke stoffen uit de maag en darmbuis, waar zij aanwezig zijn.

Zeldzaam zijn de gevallen, waar men, alleenlijk door opruiming der toevallige oorzaken, de koorts geheel meester kan worden; want meerendeels hebben zij door hare schade-

lijke inwerkingen reeds zoodanig eenen invloed op de bewerktuiging geöfend, die veranderingen in de verrigtingen heeft voortgebracht, welke voortduren en de koorts onderhouden, nadat de oorzaken zelven verwijderd zijn.

Waar dit het geval is, of de koortsen zich zonder kennelijke toevallige oorzaken ontwikkeld hebben, moeten de voortgebragte veranderingen in de bewerktuiging regtstreeks bestreden, en de verrigtingen tot haren gezondheidsmatigen toestand teruggebragt worden. Dit leidt ons tot de tweede aanwijzing.

- 2°. *Bestrijding der naaste oorzaak*, waarin de naaste werking gelegen is, en welke veranderingen de geneesmiddelen, tot dat einde gebezigd, in de bewerktuiging te weeg brengen, zijn ons even min, als het eigenlijke wezen der naaste oorzaak van de koorts, bekend. Intusschen kennen wij uit de ervaring eene reeks van geneesmiddelen, die zich standvastig, niet zelden ten spijte der stelselzucht en onderscheidene geneeskundige stelsels, welke zich in de laatste vijf en twintig jaren, als het ware, onderling verdrongen, als beweerde koortsmiddelen doen kennen. Even als de veranderingen in de bewerktuiging, waarvan de koorts afhangt, iets eigenaardigs (*specifiks*) schijnt te zijn, zoo schijnt ook de werking dezer geneesmiddelen eigenaardig, op eene bijzondere, nog onbekende wijze veranderingen in de bewerktuiging voort te brengen, welker aanzijn het bestaan eener koorts

koorts niet toelaat. Die verklaring der werking van deze middelen schijnt mij het waarfchijnlijkfte te zijn, waarin men aanneemt, dat zij genoemde veranderingen voortbrengen door eene regftreekfche mededeeling dier ftoffen, welke gedurende en door de koorts aan het ligchaam ontnomen zijn; dat zij gelijktijdig eene veranderde ftemming in de prikkelbaarheid en gevoeligheid te weeg brengen, waardoor de verrigtingen van het *reproductive* ftelfel mede veranderingen ondergaan. Zoo veel ten minfte is zeker, dat men, deze verklaring aannemende, niet ontkennen kan, dat het eene middel meer op deze, het andere meer op gene wijze werkzaam is, het andere beide wijzen van inwerking met elkander vereenigt. Ook ftemt de ervaring daarmede overeen; men denke flechts aan de fpoedige herftelling der krachten, na het doelmatig gebruik der kina; het fpoedig bedaren der toevallen, uit eene verhoogde prikkelbaarheid en gevoeligheid voortgefproten, na het gebruik van *opium* en andere bedarende geneesmiddelen.

Niet ten onregte noemt men deze middelen koortsverdrijvende (*febrifuga*), of fpecifieke (*fpecifica*), daar de ervaring leert, dat koortfen, welke na het opruimen der toevallige oorzaken niet ophouden, en hoe verfchillend haar oorfprong ook moge geweest zijn, alleen door een tijdig en doelmatig gebruik van deze koortsverdrijvende geneesmiddelen kunnen genezen worden.

Ik noem de werking dezer middelen eigenaardig of specifiek, naar aanleiding van de straks, als meest waarfchijnlijke, aangenomene verklaring, daar alle andere verklaringswijzen aan nog meerdere en grootere zwarigheden onderhevig zijn. Indien hunne inwerking op de bewerktuiging alleen prikkelend, opwekkend, verfterkend, verzwakkend, onderdrukkend, verdoovend, of op eene andere gewone wijze plaats vond, vooronderftellende, dat deze woorden juifte, genoegzaam verklaarde denkbeelden uitdrukken, en niet geheimzinnig zijn, (hetgeen intusfchen niet wel te verdedigen is,) zoude immers hetzelfde koortsmiddel tegen alle koortfen, en alle middelen tegen iedere koorts, met hetzelfde gevolg, toegediend worden. Dat zulks echter geenszins het geval is, leert ons de gefchiedenis der koortfen, en hare verfchillende behandelingen, door de beste Geneesheeren uit alle tijden. Hoe verre verheft zich niet deze meer empirifche geneeswijze boven die van zoodanige Geneesheeren, welke de werking der geneesmiddelen, volgens algemeene wetten, hoe fcherpzinnig zij ook uitgedacht zijn, verklaren? Zij dwaalden niet minder dan zij, die flechts ééne koorts en één koortsmiddel wilden vastgefteld hebben.

De voornaamfte dezer koortsmiddelen, welke hier onze aandacht verdienen, zijn: het *Nitrum* (*Nitras potasfae*), en bloed-ontlastende middelen, aderlatingen (*venae sectiones*), bloedzuigers (*hirudines*), inkervingen
en

en bloedige koppen (*scarificationes*), tegen ontstekingskoortsen; *kina*, tegen tusfchenpoozende, aflatende en aanhoudende, met het karakter van *typhus*; minerale zuuren (*acida mineralia*), tegen rotkoortsen; *moschus*, *castoreum*, *radix valeriana*, *radix serpentaria*, *naphta*, enz., tegen zenuwkoortsen; bittere middelen (*amara*), tegen flijmkoortsen, enz. Ieder dezer middelen levert, tegen eenen bepaalden koortsvorm, een meerendeels, zeker hulpaanbrengend geneesmiddel, bij tijds en behoorlijk toegediend wordende; maar nimmer, of ten hoogfte zeldzaam, kan het eene de plaats van het andere volkomen doelmatig vervangen. De ongelukkigfte uitkomsten zijn, in de meeste gevallen, de gevolgen van eene practisch onberekenende, alleen theoretisch gegronde toediening, waarbij niet bijzonder op den vorm der koorts en de bijzondere geaardheden der geneesmiddelen gelet wordt.

Hoe veelvuldig waren niet de proefnemingen en pogingen, die men in de jaren des oorlogs aanwendde, om voor het eerfte aller koortsmiddelen, de *kina*, wegens hare ontzettend hooge prijzen, een plaatsvervangend middel, of *surrogaat*, te vinden! en wat heeft dit alles geholpen? Mifchien alleen om den twijfelenden Geneesheer te overtuigen, dat het geene onverschillige zaak zij, welk koortsmiddel men toedienne; dat wij nog verre van het standpunt verwijderd zijn, waarop wij ftellig zouden kunnen

nen beweren, dat er slechts ééne koorts, ééne naaste oorzaak zij, die in onze magt staat, regtstreeks weg te nemen; dat er nog geene rationeele geneeswijze bestaat, en de empirische, door de voortgangen der natuurkundige wetenschappen verlichte, weg de eenigste veilige voor als nog zijn kan.

En leert ons niet de geschiedenis van den dag, dat, hoe diepzinnig ook de geleerdheid der aanhangers van de nieuwste stelsels in de geneeskunst zijn moge, hunne aangewende pogingen niet alleen de mogelijkheid, maar ook het bestaan van zoodanig eene rationeele bestrijding der naaste oorzaak, in duistere woorden te betoogen, vruchteloos afgehoopen zijn? De beste Geneesheeren volgen nog steeds, in de behandeling hunner koortslidder, eene verstandige *empirie*, voorgelicht door de nauwkeurige kennis der bewerktuiging en harer verrigtingen, voor zoo verre deze, op het tegenwoordig standpunt der natuurkundige wetenschappen, mogelijk is; van vooroordeelen verwijderd, zoo door eene verstandige toepassing der ervaring van aan de natuur getrouw geblevene waarnemers, als door betere kennis der geneesmiddelen, waarvan zich de arts ter genezing der koorts bedient, de vrucht der groote voortgangen, welke de natuurlijke geschiedenis en de scheikunde in de laatste dertig jaren gemaakt hebben.

De bijzondere toepassing van het tot hiertoe
ge-

gezegde op de onderscheidene koortssoorten en vormen hier niet op hare plaats zijnde, zal zulks bij de bijzondere behandeling der koortsen nader ontwikkeld en aangewezen worden.

- 3°. *Behoorlijke leiding der krachten.* Een zekere gemiddelde trap van werkdadigheid der geheele bewerktuiging en harer deelen, bij koortslidders, brengt de levenskrachten en de daarvan afhankelijke verrigtingen tot den gezondheidsmatigen toestand terug; te veel of te weinig kan vernietiging na zich slepen. Waar de natuur in hare pogingen, om de koorts te genezen, te kort schiet, om dezen trap van werkdadigheid en wederwerking voort te brengen en te onderhouden, moet de Geneesheer dezelve trachten daar te stellen, dat is: de natuur ondersteunen. Is de werkdadigheid en wederwerking in de bewerktuiging te zwak, zoodat de hevigheid der koorts met de krachten des lijders in geene behoorlijke evenredigheid staan, zoo beflist zich de koorts niet volgens hare gewone wijze, maar wordt langdurig en vermeerderd het gevaar des lijders; al te sterke werkdadigheid en wederwerking putten de krachten uit, door verspilling der stoffen, waarvan zich het *reproductive* stelsel bedient, om de bewerktuiging in stand te houden, door het verlorene te herstellen, het noodige zich gelijk te maken, met zich te vereenigen, het onbruikbare af te scheiden en te ontlasten; de levenskrachten verminderen, worden uitgebluscht, de
koorts

koorts neemt eene kwaadaardige natuur aan, de harmonifche zamenwerking der bewerktuiging tot het gemeenfchappelijke doel ter genezing is geftoord, er ontftaan algemeene en plaatselijke vernietiging der levenskrachten, die met den dood eindigt. Op deze wetten grondt zich eene dubbele geneeswijze, de opwekkend-verfterkende, en de bedarend-verzwakkende, waarvan zich de arts bedient, om de werkdagheid tot dien trap te vermeederen of te verminderen, welke aan het doel der genezing beantwoordt.

Waar de toevallige oorzaken niet kunnen opgeruimd worden, of ons geheel onbekend blijven; waar wij geene geneesmiddelen kennen, die op eene eigenaardige wijze de naaste oorzaak beftrijden, (de Oosterfche pest, de gele koorts, en de meest befmettende, kwaadaardige zijn van dezen aard) blijft er niets anders overig, dan ons van deze *methode* te bedienen, waarom zij dan ook zeer dikwijls, en wel het meeste, moet gevolgd worden. Nimmer verliezen men daarbij den koortsprikkel of de materiële oorzaak der koorts uit het oog, maar men trachte deze op te fpooren, en gelijktijdig langs den kortften en doelmatigften weg te verwijderen. De genezing wordt daarmede onmiddellijk bewerkt of befpoedigd, daar het verfterken en verzwakken de natuur in hare heilzame pogingen wel onderfteunt en in ftaat ftelt, den koortsprikkel langzaam van zich te verwijderen, of te afsimile-

leren , maar de genezing dan ook op den langsten weg verkregen wordt. Een splinter wordt door ontsteking en verettering losgemaakt en ten laatste ontlast ; maar het zoude geenszins doelmatig zijn , waar zulk eene oorzaak plaats heeft , te willen beproeven , door opwekkende of bedarende geneesmiddelen , de werkdadigheid tot den daartoe noodigen trap op te voeren , ten einde de ontsteking te vermeerderen en te onderhouden , ten einde de verettering te bevorderen , en langs dien weg den splinter te verwijderen , waar men denzelven onmiddellijk door uittrekken verwijderen kan. Het gevolg , wel is waar , is bij beide handelwijzen hetzelfde , de splinter wordt verwijderd ; maar , in het laatste geval in zoo vele oogenblikken , als er in het eerste dagen en weken noodig zouden zijn , alvorens de natuur zich daarvan ontdoen kan.

- 4°. *Behandeling der gewigtigste toevallen.* Zoo lang de toevallen bij koortsen geëvenredigd en overeenkomstig zijn aan de geaardheid der koorts , den trap , waartoe dezelve geklommen is , aan de oorzaken , welke haar voortbragten , aan de overige omstandigheden , waarin zich de lijder bevindt , aan de heilzame pogingen , die de natuur aanwendt ter daarstelling van kritische ontlastingen , moeten zij nimmer in het afgetrokkene beschouwd en bijzonder behandeld , maar door bestrijding der koorts zelve opgeruimd worden. Maar somwijlen zijn er toevallen aanwezig , welke tot zulk eene hoogte klimmen , dat zij de
koorts

koorts in haren gewonen loop storen, hare beflissing tegenwerken, haar verslimmeren en tot nieuwe ziekten aanleiding geven; waar dit het geval is, maakt de behandeling der toevallen een zeer gewigtig deel der bezigheden van den Geneesheer uit. De aanwijzing, welke men daarbij te volgen heeft, moet steeds gegrond zijn in eene naauwkeurige kennis der oorzaken der koorts, der omstandigheden des lijders, van zijne krachten, van de voorafgegane behandeling, zoo dikwijls de eenigste aanleidende oorzaak van zware en dreigende toevallen, ja zelfs van het karakter der koorts; men moet steeds de aangewezen behandeling der koorts in het oog houden en niet verwaarloozen, maar de behandeling, die bijzondere toevallen vereischen, zoo veel mogelijk daarmede verbinden en in overeenstemming brengen.

Ten laatste: moet men nimmer te veel belang in een enkel toeval stellen, en door eene al te naauwgezette behandeling van hetzelfde de ziekte verwaarloozen. De middelen, welke ter bestrijding der toevallen toegediend worden, moeten de ervaring voor zich hebben en beproefd in hunne geneeskrachten zijn. Tegen de zucht tot proefnemingen met weinig bekende geneesmiddelen, die hoe langs zoo meer de overhand neemt, bij de verschijning van eenigzins vreemde toevallen, kan men den jong beginnenden kunsttoefenaar niet genoeg waarschuwen; onberekenbaar is het nadeel, dat daaruit

voor

voor de menschheid in het algemeen, voor de geneeskunst, en bijzonder ook voor het karakter en de verdere ontwikkeling des jongen Geneesheeren, voortvloeit; teleurstelling op teleurstelling zijn de onafscheidbare geleiders der proefnemingen met nieuwe geneesmiddelen, die eindelijk op onverschilligheid en lusteloosheid, om ter verdere volmaking der kunst iets te doen, uitloopen.

5°. *Behandeling der krisis.* De krisis en kritische ontlastingen zijn eene werking der natuur, gegrond in de regelmatige samenwerking tot één doel der bewerktuiging; namelijk eene verandering in de menging der bewerktuigde stoffen, door de vreemdeardige te assimileren, de onbruikbare en dus schadelijke af te scheiden en te ontlasten. Hiertoe is een zekere trap van werkzaamheid in de bewerktuigde stelsels noodig; alles, wat daaraan hinderlijk is, vertraagt dezelve, en maakt de koorts langdurig. De Geneesheer moet hier, als een oplettend dienaar der natuur, alles verwijderen, waardoor deze heilzame werkingen kunnen gestoord worden; dezelve matigen, waar zij te hevig, ondersteunen, waar zij te zwak zijn; daar heen leiden, waar zij het doelmatigst plaats hebben; den lijder een geschikten leefregel doen houden, en zoo lang de natuur zich met de afscheiding bezig houdt, alle hevig werkende geneesmiddelen, die haar zouden kunnen storen, ter zijde stellen.

Eene al te hevige wederwerking, onverschillig

of zij toevallig of door ſterk werkende geneesmiddelen voortgekomen is, belemmert de kρίς en kritiſche ontlaſtingen, doordien zij de levenskrachten uitput, en hare werkdadigheid henen leidt naar deelen, die ongeſchikt of ontoereikende zijn, om de noodige ontlaſtingen te bewerken. De zoogenaamde verplaatſingen der ziekteſtof zijn hiervan het gevolg; gelukkig genoeg, wanneer zij zich tot deelen bepalen, die, zonder het leven in gevaar te brengen, in hunne verrigtingen belemmeringen ondergaan kunnen.

Waar zij door krampachtige geſteldheden en andere ziekelijke wederwerkingen, vooral van het zenuwſtelfel, of andere toevalligheden, verhinderd worden, zorge men dezelve door doctmatige hulpmiddelen, voor zoo veel zulks geſchieden kan, uit den weg te ruimen en te bedaren. *Opium, moſchus, caſtoreum, valerian*, koude en warme baden, zijn daartoe dikwijls de meest nuttige hulpmiddelen, ja, veel malen onvermijdelijk noodzakelijk.

- 6°. *Behandeling der complicatiën.* Zonder ons hier met een wijdloopig onderzoek bezig te houden, of er wezenlijke complicatiën, dat is: of er gelijktijdig meer dan ééne koorts, van onderscheidene geaardheden, in één en hetzelfde ligchaam beſtaan kunnen, noch in eene wederlegging te treden van hen, die dezelve verwerpen; nemen wij koorts-complicatiën aan, gegrond op het gezag der meest ervarenene Geneesheeren, wier waarnemingen ligtelijk opwegen tegen de aan-
- ran-

randingen van hen, die zich steeds bezig houden, om alles aan den dwang hunner stelsels, uit bespiegelende beschouwingen der natuur afgeleid, te onderwerpen.

Practisch beschouwd, verdienen de complicatiën te meer onze oplettendheid, daar zij niet zelden het karakter en de gedaante der oorspronkelijke koortsen veranderen, en daardoor eene geheel andere geneeskundige behandeling vorderen, die niet meer op ééne indicatie alleen, maar op onderscheidene te gelijk, moet gegrond zijn. De ervaring leert ons, dat er gevallen zijn kunnen, waarin twee tegen elkander overgestelde geneeswijzen, te zamen vereenigd, moeten aangewend worden.

Rot- en zenuwkoortsen, waarin ontlastende, en dus de krachten uitputtende geneesmiddelen, wegens de geaardheid der koorts hoogst nadeelig, en te vermijden zijn, kunnen met ophooping in de eerste wegen, met plaatselijke ontstekingen, met *congesties* naar de edele deelen gepaard gaan, die noodwendig, de eerste wegen zuiverende, plaatselijke bloedontlastingen, en andere met de eerste *indicatie* strijdige hulpmiddelen, vorderen. Ontstekingskoortsen gaan somwijlen in eenen *typhus*, catarrhale en rheumatische koortsen in eene ontstekingskoorts over, en vorderen, ter harer genezing, dan eens verzwakkende, dan eens prikkelende en versterkende, of eerst deze en later gene geneesmiddelen. Hoedanig de aangewe-

zene behandeling ook zijn moge, moet echter daarbij steeds de oorspronkelijke koorts in het oog gehouden, en volgens hare geaardheid bestrijden. De toe te dienen geneesmiddelen wijzigt men in het gebruik zoodanig, dat de werking van het eene, niet die van het andere vernietige. Somwijlen vindt eerst de eene, dan de andere geneeswijze plaats, en zijn achtereenvolgens ieder voor zich aan te wenden; somwijlen moet de eene algemeen, en de andere slechts plaatselijk zijn. Het karakter der koorts, de aanwezige toevallen, de lijdende deelen, de trap, waarop de koorts reeds gestegen is, moeten in overweging komen, het oordeel des Geneesheeren het juiste geneesplan aantoonen en in de aanwending doelmatig befluten.

2°. *Behandeling der herstellenden.* De toestand, waarin zich de van koortsen herstelde lijdens bevinden, grenst nog aan ziekte, en moet als zoodanig beschouwd en behandeld worden. De voorafgegane koorts, de meer of minder gevorderde genezing, de natuurlijke gesteldheid der lijdens, de omstandigheden, waarin zij verkeerren, leveren de aanwijzingen voor de verdere behandeling. Het wegnemen der nog overig zijnde ziekte-verschijnselen, de vermindering van instorting, en de volkomene herstelling der gezondheid, zijn het doel, dat de Geneesheer daarmede zoekt te bereiken.

Zwakte, ziekelijke gevoeligheid en prikkelbaar-

baarheid, traagheid in de verrigtingen, te veel of overmatige ontlastingen, door zweet, buikloop, enz., ziekelijke gesteldheden van enkele stelsels en deelen, plaatselijke aandoeningen, geneigdheid tot instorting, blijven genoegzaam, na het doorstaan van iedere koorts, meer of minder terug, die naar hare geaardheden onderscheidene geneesmiddelen vereischen; versterkende, als kina, ijzer, bittere middelen, voedzame, ligt verteerbare spijsen, bier en wijn, spijsen en dranken, waaraan de lijder zeer gehecht en gewoon is, om de overgeblevene zwakte tegen te gaan en de krachten te herstellen; kleine giften, *opium*, *hyosciamus*, enz., om de teruggeblevene al te groote gevoeligheid en prikkelbaarheid te verdooven; *valeriaan*, *serpentaria*, geestrijke wijnen, of soortgelijke middelen, die bepaaldelijk de eene of andere ontlasting vermeerderen, om de verrigtingen uit hare kwijning op te wekken, en tot den gezondheidstoestand terug te voeren; inwikkende, slijmige, stoppende, met prikkelende of bedarende middelen verbonden, naar mate de omstandigheden vereischen, om de overmatige ontlastingen te bedaren.

Na voorafgegane ontstekingskoortsen blijft er veelmalen een aanleg voor deze ziekte overig, die door zacht-ontlastende en zweetmiddelen moet weggenomen worden.

Voor al drage men zorg, dat de weder genezene eene zuivere en versche lucht inademe,

door behoorlijke kleeding, ligging en dekfel, tegen den invloed eener gure weêrsgesteldheid, en spoedige veranderingen in dezelve, bevrijd blijve; dat hij met behoorlijk en genoegzaam voedsel verpleegd worde; matige beweging hebbe; voor het overige rust naar ligchaam en ziel en behoorlijken flaap geniete; dat men hem het leven veraangename, en alles vermijde, wat zijne hartstogten opwekken, hem fterk aandoen en verzwakken kan.

- 8°. *Algemeene leefregel in koortfen.* De leefregel in koortfen, in eenen uitgebreiden zin genomen, namelijk als wijziging en besturing van alle buiten het ligchaam zijnde dingen, die op hetzelfde invloed oefenen, en van welker regelmatig inwerking, leven, gezondheid, ziekte en dood zoo dikwijls onmiddellijk afhangen, maakt een gewigtig deel der geneeskundige behandeling der koortfen. In vele gevallen is hij alleen genoegzaam, behoorlijk bestuurd, om zonder geneesmiddelen eene koorts te genezen; in andere maakt deszelfs vereeniging met de geneesmiddelen de genezing mogelijk, welke, door de laatste alleen niet daar te stellen zoude geweest zijn. In alle koortfen is hij van zoo veel belang, dat de arts dien nimmer uit het oog verliezen mag, maar met oordeel en verstand behartigen, leiden en aanwenden moet.

In deszelfs afzonderlijke deelen in overweging genomen, behooren tot den leefregel: de lucht, die de lijder inademt, volgens hare *temperatuur*,

tuur, bestaandeelen en veranderingen; spijs en drank, beweging en rust, slapen en waken, de prikkels en hunne inwerkingen voor de uitwendige zinswerktuigen, en den inwendigen zin; reinheid, woonplaats, oppassing, kleding, enz.

Hetzelfde, wat wij ten aanzien der onderscheidene koortsverdrijvende geneesmiddelen, betrekkelijk de onderscheidene geaardheden der koortsen, gezegd hebben, is ook op den leefregel toepasfelijk; even min als er een universeel koortsmiddel bestaat, evenmin is er een onveranderlijke leefregel, die op alle toepasfelijk is. Bij eene doelmatige behandeling moet hij, even zeer als de geneesmiddelen, volgens de verfchillende geaardheid der koorts beftuurd en aangewend worden. Intusfchen zijn er eenige algemeene regelen, die de grondbeginfelen opleveren, volgens welke de leefregel, in de algemeene behandeling der koortsen, moet ingerigt zijn. Volftrekt algemeen kunnen zij echter niet genoemd worden, daar men dezelve, op een afzonderlijk geval toepasfende, volgens den aard der koorts, der toevallen, der tijdperken, waarin zich de koorts bevindt, de bijzondere gefteeldheden der lijders, gewoonten, enz., moet wijzigen.

Voor zoo verre dus het hoofdzakelijke van den leefregel eene meer algemeene toepassing toelaat, waarop de bijzondere leefregel voor iedere koorts gegrond, en waaruit hij zich voor deszelfs bijzondere

geaardheden laat afleiden , noemen wij dien algemeen. Deze zijn het dan ook , met welker vaststelling wij ons hier zullen bezig houden , daar de bijzondere tot de dadelijke behandeling van iedere koortssoort behoort , en aangewezen zal worden.

- 1°. De leefregel moet overeenkomstig de algemeene aanwijzingen ter genezing ingerigt en daaraan geëvenredigd zijn , ten einde hij medewerke , om de toevallige en naaste oorzaken op te ruimen en te bestrijden.
- 2°. Hij moet overeenkomstig met de geaardheid der koorts zijn : nu eens opwekkend , prikkelend , versterkend ; dan eens verzwakkend , bedarend , verkoelend , verzachtend , de uitwaseming en andere ontlastingen bevorderende ; dan weêr dezelve te gengaande , stoppende , terughoudende , geëvenredigd aan de vermeerderde , verminderde of veranderde wederwerking in alle , of in bijzondere deelen en stelsels der bewerktuiging , die het karakter der koorts kenschetsen.
- 3°. Men wijzige denzelven in dier voege , dat hij medewerke , om de dringendste toevallen te bedaren.
- 4°. Dat hij de krisi en kritische ontlastingen bevordere , ondersteune , en alle hinderpalen , die dezelve belemmeren , helpe wegnemen , en zoo veel van haren schadelijken invloed ontneme , als de mogelijkheid toelaat.
- 5°. Steeds houde men het tijdperk in het oog , waarin zich de koorts bevindt ; in de eerste tijdperken moet de lijder veel drinken en weinig eten ;

eten; wanneer hij nog eenige begeerte tot voedsel heeft, kunnen alleen ligt verteerbare, voor den smaak aangename, weinig voedende spijzen toegestaan worden. In de latere tijdperken, voornamelijk in dat der genezing, geven men meer voedsel, waarvan de verteerbaarheid aan de krachten der maag geëvenredigd zij, welke geene groote krachtoefening van dit ingewand behoeft, veel voedende stof bevat, die reeds, voor zich, met de dierlijke natuur overeenkomt; naar mate de krachten der maag toenemen, geven men zwaardere spijzen, en keeren niet dan langzaam en trapswijze tot den gewonen leefregel terug.

- 6°. Eene der gewigtigste omstandigheden, in het vaststellen van den leefregel, is de gewoonte. De mensch gewent zich aan alles, en waaraan hij eenmaal gewoon is, schaadt hem zelden. De voorafgegane leefwijze moet onderzocht, en, zoo wel als de bijzondere smaak des lijders, geraadpleegd worden. Dikwijls moet men iets uit dien hoofde toelaten, dat over het algemeen met de geaardheid der koorts niet overeenstemt. Lijders, die aan vleesch, sterken drank, wijn en bier gewoon zijn, kan men ze zelden geheel onthouden. Men late den lijder in zijne gewone kamer en legerstede, verwijdere niets uit dezelve, waarin hij groot belang stelt, en aan welks bijzijn hij gewoon is. Het verplaatsen in andere kamers, onder hem vreemde voorwerpen, met vreemde oppassers, hebben

dikwijls eenen zeer gewigtigen en nadeeligen invloed op zijnen geest en zijne zielsgesteldheid; raaskallende ijlhoofdigheid, de waan van in een vreemd huis gevangen en vervolgd te zijn, hebben daarin veelmalen alleen hunnen grond. Met het uitmuntendste gevolg brengt men in deze gevallen den lijder tot zijne gewone betrekkingen terug. Oplettendheid op alles wat den lijder omgeeft, en zijne zinnwerktuigen aandoet, verdient de naauwkeurigste behartiging des Geneesheeren.

- 7°. De ziekenkamers moeten ruim, luchtig, zindelijk en droog zijn, eene behoorlijke stookplaats hebben, om ze des winters te verwarmen; opene vuren verdienen den voorrang. De lucht, waarin de zieke leeft, moet niet te koud, noch te warm, den 60^{en} of 65^{en} graad, volgens den thermometer van FAHRENHEIT, niet te boven gaan; noch te droog, noch te vochtig zijn. Des winters kieze men ziekenkamers, die tegen het zuiden, des zomers, die tegen het noorden gelegen zijn. Eene al te heete lucht verkoele men door vaten met koud water en ijs gevuld, in de ziekenkamer geplaatst, sprengende van tijd tot tijd water op den grond, vooral wanneer de lucht heet en droog is.

De lucht moet zuiver zijn, en eene genoegzame hoeveelheid zuurstof bevatten, en alles vermeden worden, wat daaraan hinderlijk is, eene onzuivere lucht aanvoeren of voortbrengen kan. Het ruime ziekenvertrek behoort in

een

een gedeelte van het huis te zijn, waar zich geene voorwerpen bevinden, die schadelijke, de lucht bedervende dampen uitwafemen. Alles, wat in de ziekenkamer de zuiverheid der lucht verhindert en bederft, worde zoo spoedig mogelijk verwijderd; de noodige komforen en het nachtlucht plaatse men onder eenen openen schoorsteen; men late niet meer menschen bij den zieken, dan er te zijner oppassing noodig zijn; men were de huisdieren uit dezelve. De ontlastingen moeten in welgeslotene potten of steekbekkens, zonder tijdsverzuim, uit het vertrek gebragt en gereinigd worden. Het linnen, beddegoed en kleedingstukken moeten rein gehouden, en het vuile ten spoedigste er uitgebragt worden. Door de ramen dagelijks eenige uren open te zetten; door luchtgaten en *ventilators*, zorg men voor verversching des dampkrings; maar men zorg tevens, dat de lijder, terwijl men zich daarmee bezig houdt, geene koude of togt vatte; tot dat einde blijve hij wel toegedekt in het bed, en door het plaatsen van schermen en gordijnen tegen den indringenden luchtstroom beveiligd. Waar deze hulpmiddelen niet toereikende te achten zijn, de lucht behoorlijk zuiver en versch te houden, en wel voornamelijk, waar vele zieken bij een zijn, schadelijke dampen, die zich uit de nabijheid in het ziekenvertrek verspreiden, waarvan de oorzaken niet kunnen weggenomen, en wanneer de koortsen een kwaadaardig en besmet-

smettelijk karakter hebben, moet men gebruik maken van de gewone, den dampkring verbeterende berookingen met azijn, en vooral de zoutzure berookingen.

Door gordijnen matige men het al te sterk invallende daglicht, door schermen het schijnsel van het nachtlicht.

- 8°. Het toedienen van doelmatige dranken, in eene genoegzame hoeveelheid, maakt mede een gewichtig deel van den leefregel en de geheele behandeling der koortsen. De meeste koortslijders hebben hevigen dorst, en het gebruik van veel drank noodig, zoo wel om het evenwigt in de hoeveelheid der vochten te onderhouden, die door de koortshitte, de uitwaseming en andere ontlastingen verloren gaan, als om de natuur van de noodige stoffen te verzorgen, welke zij ter onderhouding der noodige verrigtingen, afscheidingen, herstelling en verbetering der werktuigde stof, om de gezondheid te doen wederkeeren, behoeft; de lijders moeten derhalve drinken, wanneer en zoo veel als zij dorst hebben. Het is even verkeerd gehandeld, aan lijders, die dorst hebben, het drinken te verbieden, als aan hen, die geen' dorst hebben, het drinken met geweld in groote hoeveelheden in te gieten. Het gevoel van dorst geeft behoefte aan vocht voor het ligchaam te kennen, en kan derhalve ook de eenige maatstaf voor de hoeveelheid der dranken zijn. Bij lijders, die ijlen en zich in eenen staat

staat van bewusteloosheid bevinden, kan zeker het gevoel des lijders niet meer tot maatstaf strekken, daar hij buiten staat gesteld is, zijne ontwaarwordingen en behoeften aan anderen verstaanbaar en duidelijk te kennen te geven, en zich daarin ook zelf bedriegt; hier moet de Geneesheer uit de toevallen en ziekteverschijnselen beoordeelen, of veel drinken, namelijk meer dan de lijder zelf begeert, goed en noodzakelijk is. Wanneer de tong zeer droog, de hitte groot, de *urine* hoogrood, spaarzaam en moeilijk ontlast, de koorts nog in die tijdperken staat, waarin dorst een standvastig en gewoon verschijnsel is, moet men den lijder dikwijls drinken aanbieden, en alle pogingen aanwenden, om hetzelfde te bevorderen.

Men late weinig op ééns, maar dikwijls drinken, daar eene groote hoeveelheid de maag bezwaart, waarvan walging en braking het gevolg zijn; ook kunnen de dranken alsdan niet behoorlijk, tot de opneming door de opslurpende vaten, voorbereid worden. Waar de lijder, door braken, mondklem, kramp, keelontsteking, enz., belet wordt eene genoegzame hoeveelheid vocht door den mond te gebruiken, neme men natte omslagen, laauwwarme baden en lavementen te baat, en herhale dezelve ieder uur of om de twee uren; de huid slurpt steeds uit den dampkring vochten op, en men kan langs dien weg den dorst bevredigen, en het drinken voor lang onnoodig maken. De ingespotene lavementen worden

den door de opflurpende vaten van den dikken darm opgenomen, en men kan daarmede zoo veel vocht in het ligchaam brengen, dat daardoor aan de eerste behoefte voldaan en de dorst gematigd wordt. Echter zijn deze bijwegen alleen als hulpmiddelen te beschouwen, waarvan men zich in geval van noodzakelijkheid, maar ook niet langer, bedienen moet; de weg door den mond blijft altijd de voorkeur behouden, waar hij open en ruim genoeg is, om aan de behoefte des lijders te voldoen.

In den zomer kan men de dranken koud, des winters meer warm geven. De smaak des lijders, de gewoonte, de geaardheid der koorts en bijzondere plaatselijke aandoeningen leveren de regels, die bij het bepalen der temperatuur van de dranken in acht te nemen zijn. Voor de meeste is eene middelbare temperatuur, tusschen warm en ijskoud, de aangenaamste, en verdraagt zich met al de bijzondere geaardheden der koortsen het beste. Lijders, die gewoon zijn, altijd koud, of altijd warm te drinken, kunnen hunne gewoonte ook in koortsen blijven volgen, met die bepalingen, dat zij de koude dranken niet ijskoud, de warme niet heet, en in beide gevallen geene te groote hoeveelheid op ééns inzwelgen. De koude dranken zijn over het algemeen voor schadelijk te houden, bij kramp, pijn, groote gevoeligheid en prikkelbaarheid van de maag en darmbuis, bij ontstekingen van de keel, het strottenhoofd, den flokdarm,

darm, de borst en buksingewanden, en bij groote gevoeligheid en krampachtige gesteldheid van het zenuwgestel.

De hoedanigheid of kwaliteit der dranken is mede van groot aanbelang, en moet volgens de algemeene aanwijzingen in dier voege ingerigt zijn, dat zij aan den aard der koorts, der gewoonte en den smaak beantwoorde, de werking der geneesmiddelen ondersteune, en daarmee niet in tweestrijd zij. Bij sthenische koortsen zijn verkoelende, de ontlasting bevorderende dranken aangewezen, als zuiver water, water met plantenzuren, afkookfels van gerst, rijst, brood met zuren, enz.

Alle prikkelende geestrijke dranken zijn algemeen met weinige uitzond ringen schadelijk.

In asthenische koortsen bezige men prikkellende, versterkende en voedende, naar mate de gesteldheid der lijdens het noodig maakt. Water met wijn, of met wijngeest en suiker, bier, melk met brandewijn en suiker, vleeschnat, gefatureerde afkookfels van rijst, gerst, brood, dunne oplosfingen van salep en andere slijmachtinge zelfstandigheden, met wijn en kruiderijen, voornamelijk met kaneel, nootmuscaat, enz. De bijzondere aandoeningen der werktuigen voor het slikken, de spijsvertering en de ademhaling zijn daarbij in het oog te houden; daar eene verhoogde gevoeligheid en prikkelbaarheid dezer deelen het gebruik van alle prikkelende dranken verbiedt; alleen zachte, sfterende, voor den
smaak

smaak aangename, als melk, enkel of met water, amandelmelk, gerstewater, zijn dan aangewezen, en verdienen boven alle andere de voorkeur.

Zelden kunnen koortslijders, gedurende de geheele ziekte, een' en denzelfden drank onafgebroken gebruiken; ligt staat hun dezelve tegen, en zij verlangen naar een' anderen. Men verwisfele derhalve van tijd tot tijd den eenen drank met den anderen, volgens den smaak en de gesteldheid des lijders, ten einde er steeds eene genoegzame hoeveelheid vocht gebruikt worde. Het is uit dien hoofde voor den Geneesheer belangrijk, verschillende dranken, volgens de wijze hoe men ze bereidt, te kennen, ten einde nimmer in verlegenheid te geraken, en aan den smaak des lijders te hulp te kunnen komen.

9°. *Het eten.* Doorgaans ontbreekt in koortsen de eetlust geheel, waaruit de eerste regel voor de diët voortvloeit: zonder eetlust moeten koortslijders niet eten, en men moet hen daartoe niet dwingen. Hunne spijsverteringswerktuigen kunnen geene voedfels verteren; men geeft aanleiding tot gastrische ophooping, en voedt daarmede, gelijk de gemeene man zegt, meer de koorts, dan dat men dezelve tegengaat.

Heeft de lijder eetlust, mits dat dezelve geen gevolg van ijshoofdigheid, of andere ziekelijke omstandigheden, maar het gevolg der wederwerkende werkdadigheid van de spijsverterings-werktuigen is, dan kan men hem het een of ander ligte voed-

voedsel toestaan. Koortslijders moeten ook dan, wanneer zij eetlust hebben, weinig, niet veel op ééns, maar dikwijls, nimmer gedurende den aanval of de verheffing der koorts, maar nadat dezelve afgeloopen is, eten. Zij kunnen de spijsen gebruiken wanneer zij honger hebben; men heeft niet noodig zich daarin aan bepaalde uren te houden, alhoewel de meeste het genuttigde beter verdragen en verteren, wanneer zij op die uren eten, waarin zij, in hunne gezonde dagen, gewoon zijn het middagmaal te houden, dan op andere tijden van den dag. Alle voedsels moeten behoorlijk en langzaam gekaauwd worden; schielijk eten en niet genoegzaam kaauwen is dikwijls de eenige oorzaak, dat het gebruikte bezwaart, en zich moeilijk laat verteren. De spijsen behooren, over het algemeen genomen, vochtig, verkoelend, eenvoudig, niet te sterk voedend, ligt verteerbaar en niet te zeer met kruiderijen aangezet te zijn.

Wanneer de lijder naar de eene of andere spijs aanhoudend een sterk verlangen te kennen geeft, moet men niet te streng aan den eenmaal vastgestelden leefregel vasthouden, maar op eene verstandige wijze toegevend zijn; want de ervaring leert, dat zulks dikwijls gewigtige wenken der natuur zijn, door welker bevrediging de toestand des lijders verbeterd en de gezondheid hersteld wordt.

Wat er van de dranken in het algemeen gezegd is, is ook op de spijsen toepasselijk; de-

dan aan te wenden is, wanneer de lijder de koorts doorgestaan heeft, en alleen de verlorene krachten nog te herstellen zijn.

10°. *Beweging en rust.* Aan de meeste koortslidders is de eerste schadelijk en de laatste nuttig; alleen bij ligte koortsen, zoo lang de krachten goed zijn, kan men aan den lijder veroorloven, den koortsvrijen tusschentijd buiten het bed door te brengen; bij goed weder, eene zachte en heldere lucht, zich vrij in dezelve te bewegen. Den koortsaanval moet hij steeds in het bed afwachten; in zware koortsen, waar de krachten veel hebben te lijden, nimmer het bed verlaten; zelfs het zitten in het bed is alsdan nadeelig. Rust naar ligchaam en ziel zijn altijd nuttig en heilzaam, wat deze stoort, is nadeelig; alle sterke aandoeningen der zinwerktuigen en opwekking der hartstogten hebben verslimming in de toevallen ten gevolge. Men verwijdere alles, wat den lijder treurig en neêrslagtig maakt, beure hem op, bemoedige hem met het vooruitzicht eener spoedige herstelling; alles, wat tot opwekking van duistere en verontrustende denkbeelden aanleiding geven kan, houde men voor hem verborgen.

11°. *Slapen en waken.* Voor de meeste is slapen nuttig en bevordert de genezing, slapeloosheid put de krachten uit en verslimmert de koorts; men verwijdere derhalve alles, wat den slaap stoort: stilte, duisternis en goede ligging be-

vorderen denzelven; het tegendeel heeft eene tegenovergestelde uitwerking.

In het bevorderen of vermijden van den slaap heeft men zich naar de geaardheid der koorts, hare verschijnselen, en de uitwerking, die de slaap op de koorts heeft, te regelen. Waar het hersen- en zenuwgestel voornamelijk lijden, slapeloosheid, ijlhoofdigheid en krampen aanwezig zijn, zoek men den slaap te bevorderen; bij slaapzucht, keelontsteking, overmatige kwijling, zeer groote zwakte en felle koude, denzelven te vermijden, daar de verminderende werkdadigheid, gedurende den slaap, den toestand des lijders verergert, en aan den naderenden dood den weg baant tot de spoedigere vernietiging des levens.

- 12°. *Ligging, dekfel en kleeding.* Ten aanzien van deze moet gezorgd worden, dat de oppervlakte des ligchaams in eene gematigde en gelijke temperatuur blijve; te overvloedig dekfel maakt het te, benaauwdheid, onrust, bevordert de ijlhoofdigheid en gierstuitslag; door een te sterk zweet voort te brengen, worden de krachten uitgeput; te dunne of te weinige dekking en kleeding belet de kritische ontlastingen door zweet, onderhoudt de koorts, geeft tot ophooping van vochten en congesties naar de inwendige deelen, tot krampachtige gesteldheden en andere ziekelijke afwijkingen, aanleiding.

Herstellenden moeten niet dan goed gekleed het ziekenvertrek verlaten, zich, op de beste uren
van

van den dag, matig in de vrije lucht, waar geen togt is, des winters en in het voor- en na-jaar in den zonneschijn, des zomers in de schaduwe, bewegen, niet stil zitten of staan. De morgen en avondlucht moeten, totdat de herstelling volkomen is, geheel vermeden worden. In den winter verdienen wijde wollen kleederen, des zomers van katoen vervaardigd, den voorrang.



TWEEDE HOOFDSTUK.

DE KOORTSEN IN HET BIJZONDER.



EERSTE AFDEELING.

De aanhoudende koortsen.

Aanhoudende koortsen (*Febres continuae*) noemt men, over het algemeen genomen, diegenen, welke van haar begin tot aan haar einde, in gezondheid of dood, onafgebroken voortduren. Zelden doorloopen zij haren geheelen duur met gelijke sterkte, maar maken tijdperken, waarin de koortstoevallen beurtelings verheffen en verminderen; het eerste noemt men haar verheffen (*exacerbatio*), het laatste haar aflaten (*remissio*).

Daar de beste practische Geneesheeren algemeen van oordeel zijn, dat de volstrekt aanhoudende koorts nimmer voorkomt, en diegene, welke men daarvoor houden mogt, toch steeds tijdperken van verheffingen en remisfiën hebben, zoo neem ik ook beiden onder deze afdeeling te zamen, alleen bij de bijzondere afhandeling van iederen koortsvorm aanmerkende, in welke gevallen, en wanneer zij somwijlen volstrekt aanhouden.

Volgens het langere of kortere tijdsverloop, dat de aanhoudende koortsen tot hare beslissing noodig hebben, verdeelt men dezelve in heete koortsen (*Febres acutae*), en in slepende (*Febres lentae*).

De eerste zijn doorgaans oorspronkelijke koortsen, die de geheele bewerktuiging in al hare stelsels met nagenoeg gelijke sterkte aantasten; de laatste zijn zelden oorspronkelijk, maar meer toevallig, gewoonlijk het gevolg van andere voorafgegangene ziekten, en hebben hare oorzaak in een plaatselijk lijden van het eene of andere deel. De heete koortsen verdeelt men weder volgens haren langeren of korteren duur:

- a. In heete koortsen van den eersten graad (*Febres acutissimae*).
- b. In heete koortsen van den tweeden graad (*Febres peracutae*).
- c. In heete koortsen van den derden graad (*Febres acutae*).

Volgens den langeren of korteren duur der remissie en exacerbatie:

- a. In volstrekt aanhoudende (*Febres continuae continentes*), met geheel geene of slechts zeer onduidelijke remisziën.
- b. Aanhoudend aflatende (*Febres continuae remittentes*), met lange en duidelijke remisziën.

Volgens hare geaardheid, of de door ons aangenomene algemeene koortskaracters.

- 1°. Ontstekingskoorts of sthenische (*Pyrexia, synocha, febris inflammatoria, sthenica, synochus non putris, fièvre angioténique*, van PINEL).

2°. Asthenische koortfen met het karakter van *typhus*.

a. Rotkoortfen (*Typhus, febris putrida, fièvre adynamique*, van PINEL).

b. Zenuwkoortfen (*Febris nervosa, typhus nervosus, fièvre ataxique*).

3°. Symptomatische koortfen.

a. Gastrifche koorts (*Febris gastrica*).

a. Eenvoudige gastrifche koorts (*Febris saburralis*).

b. Galkoorts (*Febris biliosa, fièvre meningogastrique*, van PINEL).

c. Slijmkoorts (*Febris pituitosa, fièvre adénoméningée*, van PINEL).

d. Wormkoorts (*Febris verminosa*).

b. Zinkingkoorts (*Febris catarrhalis*).

c. Rheumatische koorts (*Febris rheumatica*).

d. Kraamkoorts (*Febris puerperalis*).

e. Uitterende koorts (*Febris hectica*).

Daar deze verdeeling der koortfen van de hier vooren gegevene afwijkt, is het noodig hier aan te merken, dat wij daar meer uit een theoretisch oogpunt uitgingen, en eene verdeeling der koortfen daarftelden, zoo als men ze tegenwoordig bij de meeste Schrijvers vindt. Hier, waar het doel alleen practisch is, heb ik mij die veranderingen veroorloofd, welke mij toefchenen voor de bijzondere geneeskundige behandeling het gefchiktste te zijn.

§. 1.

Aanhoudende ontstekingskoorts.
(Febris inflammatoria, sthenica).

Tegennatuurlijke vermeerderde werkdadigheid en Bepaling
 wederwerking der bewerktuiging, voornamelijk van
 het hart en vaatstelsel, met verhoogde prikkelbaar-
 heid.

Zij heerscht in alle jaargetijden, voornamelijk in Karakter
 den winter en het voorjaar, bij drooge, koude,
 heldere lucht, met noorde- en oostelijke winden.
 In hooge, bergachtige landstreken meer, dan in lage,
 vochtige landen. Des zomers komt zij somwijlen
 voor, wanneer het weêr zeer heet, de lucht helder
 en droog is; zelden neemt men haar in het najaar
 zuiver waar.

Jonge, gezonde, sterke, volbloedige, goed ge-
 voede lieden, met sterke en prikkelbare vezelen, tast
 zij bij voorkeur aan; het mannelijke geslacht is meer
 dan het vrouwelijke, de volwasfene ouderdom meer
 dan de kinderjaren en de grijsheid aan dezelve onder-
 hevig. Somwijlen ontmoet men haar ook bij zwakke
 en ziekelijke voorwerpen.

Zij tast doorgaans plotseling en onverwachts Loop en
toevallen.
 aan, zonder voorafgegane voorboden, met hevige,
 maar niet- langdurige koude, die spoedig door eene
 gelijkmatig brandende, aanhoudende hitte gevolgd
 wordt. Somwijlen is de koude zeer gering, de daar-
 op volgende hitte matig, en beide wisselen, gedur-
 ren-

rende eenige dagen , meermalen met elkander af (*); de pols is hard , vol , gelijkmatig , niet zeer fchielijk , met kracht aan den drukkenden vinger wederftand biedende. Bij plaatselijke ontftekingen en krampachtige gefteeldheden , gewoonlijk klein en hard , voller wordende , *door* en *na* de eerfte adering ; de geheele oppervlakte des ligchaams , voornamelijk het aangezigt , is eenigermate opgezet en rood , de bloedaderen zijn opgezwollen en vol bloed ; de oogen rood en glinsterend , de lippen , mond en neusgaten droog ; de tong in den beginne met een witachtig flijm dun bedekt en vochtig , in den loop der koorts wordt zij rood , bruin en droog. De verrigtingen der zinwerktuigen wijken van hare natuurlijke gefteeldheid af , het gezigt en gehoor zijn zeer fcherp , het gevoel wordt verhoogd , terwijl de reuk en fmaak nagenoeg geheel ontbreken. De onleschbare dorst wordt door warm drinken vermeerderd , door koude dranken verminderd. Voeg hierbij hevige hoofdpijn met ijlhoofdigheid , flapeloosheid of flaapzucht , fchielijke , benaauwde ademhaling , zeer heete adem , fterk kloppend hart en slagaderen. Bij kinderen fomtijds ftuiptrekkingen , misfelijkheid , neiging tot braken en brakingen , zonder dat de lijdens over eenen onaangenamen fmaak klagen. De *urine* wordt in kleine hoeveelheid ontlast , is brandend heet , vuurrood , in den beginne zonder , tegen het einde der koorts met een rood zinkfel ; derzelve ontlasting gaat met een prik-

(*) Des avonds en in den vroegen morgenftond maakt de koorts gewoonlijk hare verheffingen.

prikkelend gevoel in de pisbuis gepaard; de buiksontlasting is traag of geheel verstopt; de ontlaste drekstoffen zijn hard; het uit de ader gelatene bloed is dik, kleverig, met weinig bloedwater en veel stolbare stof; het stolt terwijl het ontlast wordt; het is hooger rood dan bij gezonden, ontbindt zich spoedig in zijne bestaandeelen, en wordt met eene dikke, vaste, taaie, wederstandbiedende, witte, of grijsachtige, in het midden ingedrukte, aan de randen verhevene ontstekingskorst (*crusta inflammatoria, corium pleuriticum*), bedekt. Nog in de vaten bevat, geeft het bloed reeds deze neiging tot ontbinding in zijne bestaandeelen te kennen, het veelvuldig ontstaan van polypen en vliezen (*pseudomembrana*), in de holigheden, en op de oppervlakte der ontstokene deelen, zijn daarvan de gevolgen. De uitwaseming is onderdrukt, de huid droog; bloedontlastingen, door den neus en andere deelen, verligten den zieken. Den zevenden, negenden of veertienden dag beslist zich deze koorts door kritische bloedvloeijingen; ruim, gelijkmatig zweet en pis met een rood of witachtig zakfel, zeer zelden door verplaattingen of andere ontlastingen.

Alles wat door prikkel de werkdadigheid en wederwerking, voornamelijk in het hart en vaatstelsel, opwekt en vermeerdert, kan de oorzaak van deze koorts worden, vooral wanneer de prikkelende inwerkingen vallen op voorwerpen, welke tot ontstekingsziekten voorbeschikt (gepraedisposeerd) zijn.

De voornaamste dier prikkelende oorzaken zijn:

1°. Voedzame en prikkelende spijs.

2°. Geest-

- 2°. Geestrijke, verhittende dranken, misbruik van wijn, brandewijn, jenever, zwaar bier, enz.
- 3°. Spoedig afwisselende hitte en koude, onverschillig welke er voorafgaat en volgt.
- 4°. Sterke en overmatige beweging in drooge, koude lucht, bij noorde- en oostelijke winden.
- 5°. Verkoudheden, belette en plotseling onderdrukte huiduitwaseming.
- 6°. Sterk opwekkende hartstogten en gemoedsaandoeningen.
- 7°. Aanhoudend waken.
- 8°. Alle uit- of inwendig plaatselijk werkende prikkels, wonden, verstoppingen, onderdrukte bloedontlastingen, scherpten, bijt- en brandmiddelen, ziektestoffen, zekere smetstoffen, van pokken, mazelen, roodvonk, enz.
- 9°. Een eigenaardig *miasma* in den dampkring, zonder hetwelk men zich de epidemisch heerschende ontstekingskoortsen niet wel kan verklaren.

Voorzeg-
sing.
(*Prognosis*).

Van al de aanhoudende koortsen is de voorzegging het gunstigst bij de ontstekingsachtige, want geene houden eenen zoo regelmatig loop als deze. In de eerste tijdperken, doelmatig behandeld zijnde, is het gevaar niet groot, en dikwijls is de natuur alleen vermogend genoeg, door bloeding uit den neus de gezondheid te herstellen. Waar zij eenen hooger graad bereikt, heeft men meer gevaarlijke gevolgen te vreezen:

a. Plaatselijke ontsteking, die vernieling aan het lijdende deel dreigt.

b. In-

- b. Indien er ten laatste, tegen den 14^{en} dag, geene gunstige scheiding plaats grijpt, heeft, wegens de hevige wederwerking der bewerktuiging, die de krachten uitput, of door eene al te verzwakkende behandeling, gewoonlijk de overgang in eene zenuw- of rotkoorts plaats.
- c. Dat, als de kritische ontlastingen onvolkomen zijn, ligtelijk etterachtige afscheidingen en verplaatfingen naar de holligheden en edelere ingewanden ontstaan, waartoe deze koorts alsdan eene bijzondere neiging heeft.

Teekenen, die een' gunstigen uitgang der koorts voorspellen, zijn: geëvenredigde gesteldheid en overeenstemming der toevallen onderling, gedurende den geheelen loop der koorts; wanneer na vier en twintig uren, op den derden, zevenden, negenden, elfden of veertienden dag, de aanwezige toevallen verminderen en geene andere daarbij komen, de kritische ontlastingen op een' dezer dagen te voorschijn komen, de tong en huid vochtig, de *urine* troebel en minder gekleurd is, de dorst en hette afnemen, de pols week is, neusbloedingen of andere bloedontlastingen ontstaan.

Kwade teekenen zijn: ontsteking en opzwellings der oorklieren, die spoedig weder verdwijnen, neusbloeding, die na de ontlasting van weinige droppels bloed ophoudt, drooge, brandende hitte, onrust, benaauwdheid, ongelijkmatig verdeelde warmte, gevoel van inwendige hette of koude, wanneer de uitwendige deelen heet of koud zijn.

Doodelijke teekenen zijn: plotseling bedaren van alle toevallen, kleine, week pols, waterachtige, heldere

Goede teekenen.
(*Signa bona*).

Kwade teekenen.
(*Signa mala*).

Doodelijke teekenen.
(*Signa lethalia*).

dere pis, koud, ongelijkmatig zweet, waterachtige, stinkende buiksonstlastingen, koude handen en voeten, opzwellling van den buik, benaauwde, reutelende ademhaling.

Geneezing.

De geneeswijze van deze koorts moet zoodanig ingerigt zijn, dat zij aan de onderscheidene aanwijzingen, uit de geaardheid der koorts afgeleid, voldoet, en steeds aan de hevigheid der ziekte geëvenredigd zij; deze aanwijzingen zijn :

- a. Men verminderde de vermeerderde wederwerking van het vaatstelsel en de overmatige beweging der vochten.
- b. Men verwijdere alles, waardoor de vermeerderde wederwerking onderhouden en opgewekt wordt.
- c. Men bevordere de ontlastingen, waarvan zich de natuur tot het daarstellen der krisis bedient.
- d. Men trachte op alle mogelijke wijzen den overgang in andere ziekten te verhoeden, en bijkomende toevallen af te weren.

Aan de eerste aanwijzing wordt voldaan : door vermindering der hoeveelheid van het bloed en andere vochten; door de verkoelende, verzwakkende, verzachtende en bedarende geneeswijze; door verdunnende dranken, en een' verkoelenden, weinig voedenden leefregel.

Het geheel dezer behandeling noemt men de antiphlogistifche, ontsteking werende, de antisthenifche, de asthenifche of de verzwakkende geneeswijze.

Het krachtigst en spoedigst, de vermeerderde wederwerking van het vaatstelsel verminderende middel, is de bloedontlasting; zij vermindert regtstreeks de
 hoe-

hoeveelheid van het bloed, die het vaatstelsel bewegen moet, en den prikkel, die hetzelfde tot vermeerderde wederwerking aanzet.

Waar eene aderlating aangewezen is, (en dit heeft in al de hoogere graden der ontstekingskoorts plaats) moet dezelve nimmer verzuimd worden, daar er geen ander middel is, dat wij in hare plaats stellen, en waardoor wij het eenmaal verzuimde vergoeden kunnen.

Niet in alle ontstekingskoortsen zijn de bloedontlastingen noodzakelijk; in de lichtere graden, vooral in die, welke zich binnen vier en twintig uren beslissen, bij de ouden onder de benaming van *Ephemera* bekend, komen zij niet te pas; hier verzwakken zij te veel, en bevorderen den overgang in asthenische, of koortsen met het karakter van *typhus*.

De aanwijzingen tot eene bloedontlasting moeten uit de hevigheid van al de toevallen, uit de krachten, waarmede het bloed door het hart en slagaderlijke vaatstelsel bewogen wordt, uit de hardheid en volheid van den pols, en geenszins alleen uit de ontstekingskorst (*crusta inflammatoria*) op het bloed genomen worden; want deze is zeer bedriegelijk: bij de hevigste ontstekingen ontbreekt zij dikwijls bij de eerste, en vertoont zich eerst met de tweede of derde lating; bij zwangere vrouwen vindt men haar nagenoeg altijd; ook bij rheumatische gebreken is zij een gewoon verschijnsel. In verband met de overige aanwezige toevallen geeft zij aan de aanwijzing ter verdere behandeling meer zekerheid.

Hoe vroeger in het eerste begin der ontstekingskoorts

koorts eene ader geopend wordt, zoo veel te grooter is hare nuttigheid voor den lijder; echter kan in ieder tijdperk de aderlating in het werk gesteld worden, wanneer dezelve aangewezen is. Het zoude grovelijk gedwaald zijn, indien men eenen vasten tijd bepalen wilde, naar welks verloop men geen bloed meer zoude mogen ontlasten. Alleen zij dit nog gezegd, dat het in de latere, meer gevorderde tijdperken minder veilig is, eene ader te openen; want niets bevordert den overgang in asthenische koortsen krachtiger, dan eene ontijdige bloedontlasting. Hoe veel bloed men te ontlasten hebbe, wordt bepaald door den ouderdom, het geslacht, de hevigheid der koorts, de bijzonder lijdende deelen, het verminderen der toevallen en weeker worden der pols gedurende de aderlating. Kinderen en grijsaards verdragen de bloedontlastingen minder, dan de volwassenen.

De eerste aderlating moet ruim van tien tot zestien onsen, en door eene groote opening geschieden, voornamelijk als er plaatselijke ontstekingen van inwendige deelen aanwezig zijn. De aderlating wordt herhaald, zoo dikwijls de, gedurende dezelve bedaarde toevallen, na verloop van eenige uren, zich weder verheffen, de eerst zachte pols harder en voller wordt.

Waar het moeilijk valt eene ader te openen, bij jonge kinderen, die de aderlating niet wel verdragen, bij plaatselijke ontstekingen, waar men meer onmiddellijk de ontstokene vaten ontledigen wil, en daar, waar men, na voorafgegane algemeene aderlatingen,

alleen nog maar kleine en plaatselijke bloedontlastingen noodig oordeelt, bediene men zich van bloedzuigers en bloedige koppen, zoo dicht mogelijk bij het lijdende deel aangelegd. Men berekent doorgaans voor een' bloedzuiger of bloedigen kop ééne, of, zeer groot zijnde, twee onsen bloed. De bloedontlastingen zoo lang te herhalen, als er slechts de geringste toevallen der ontsteking overig zijn; of na eene lating alle verdere bloedontlastingen, uit vrees voor de krachten, voor onnoodig te houden; of ook, om bij de eerste lating het bloed, tot flauw worden toe, te laten loopen, zijn geneeskundige vooroordeelen, waarvoor men zich even zeer wachten moet, want ieder voor zich telt vele slagtoffers.

De meest in het oog loopende werking der overige antiphlogistifche geneesmiddelen is, dat zij de snelheid van den pols matigen en de hitte verminderen, waarom zij ook den naam van verkoelende dragen. Zij zijn aangewezen tegen alle ontstekingskoortsen, zoo wel tegen de hoogere, als geringere graden dezer ziekte; zij worden alleen of gelijktijdig met de aderlatingen gebezigd, die zij dikwijls vervangen en onnoodig maken, alleen genoegzaam zijnde, om de ziekte te overwinnen.

De eerste plaats behoort aan het salpeter (*Nitras Potasae*, *Nitrum depuratum*); men geeft hetzelfde in eenen slijmachtigen drank, gerste- of rijstwater, of in zuiver water, opgelost met *Oxymel*, van twee drachmen tot eene halve onse bij volwasfenen; bij

kinderen en jonge lieden van een scrupel tot twee drachmen.

| | |
|---|--|
| <i>R_p. Nit. Potassae</i> ʒiij. | <i>R_p. Nit. depur.</i> ʒij. |
| <i>solve in</i> | <i>solve in</i> |
| <i>Decoct. Hord.</i> libr. j. | <i>Aq. coct.</i> unc. x. |
| <i>adde</i> | <i>adde</i> |
| <i>Syr. alth. aa</i> unc. j. | <i>Oxym. simpl.</i> unc. ij. |
| <i>M. D. S.</i> | <i>M. D. S.</i> |

Om het uur een half kopje. Om het uur een half kopje.

Kinderen en volwasfenen met eene zwakke, zeer aandoenlijke maag, verdragen het salpeter flecht, of in het geheel niet; waar deszelfs gebruik door benaauwdheid, een onaangenaam gevoel in de maagstreek en pijn gevolgd wordt, moet men het ter zijde stellen, en andere verkoelende, voor de maag minder onaangename middelen toedienen. MARKUS HERT raadt, tot dat einde, bijzonder de met citroenzuur verzadigde kreeftsoogen aan:

| |
|--|
| <i>R_p. Lap. Cancr.</i> ʒij. |
| <i>Succ. Cit. q. s. ad saturationem.</i> |
| <i>adde</i> |
| <i>Syr. simplic.</i> unc. j. |
| <i>Aq. destill.</i> unc. ij. |
| <i>M. D. S.</i> |

Om het uur een' lepel vol.

En de beroemde J. B. FRANK geeft, waar het salpeter niet verdragen wordt, van tijd tot tijd twintig greinen planten-loogzout, en laat den lijder vlijtig

tig plantenzuren, in verschillende gedaanten van dranken, gebruiken.

RICHTER raadt voornamelijk het gebruik van het sal-amoniak (*Murias Amoniae, sal Ammoniacum*) aan; de onaangename smaak, zoo moeilijk te verbeteren, zal echter deszelfs algemeen gebruik steeds belemmeren.

Ook de andere middenzouten, de *Sulphas Sodae* (*sal mirabile Glauberi*), *Sulphas Potassae* (*sal polychrestus*), *Sulphas Magnesiae* (*sal amarum*), *Tartritis Potassae* (*cremor tartari*), de *Manna*, *Tamarinde*, *Cassia*, *Oxymel* en plantenzuren, kunnen met voordeel gebezigd worden, vooral wanneer de buiksonstlasting verstopt of traag is, en wanneer er teekenen van gastrische ophooping en aanwezig zijn; alsdan is het zeer nuttig, daarmede dagelijks eenige ontlastingen te bewerken.

R. Sulphas Sodae. unc. ß—j.

Mann. depurat.

Pulp. Tamarind. ā unc. i—ij.

Aq. coct. unc. xij.

M. D. S.

Om het uur een half kopje.

R. Mann. depurat.

Pulp. Tamarind. ā unc. iß.

Tart. acid. Pot. unc. ß.

M. D. S.

Om het uur een' of twee theelepels vol.

Sterk laxerende middelen zijn schadelijk; ook de hier genoemde zacht werkende doen meer kwaad

H 2

dan

dan goed, wanneer zij een' sterken buikloop te weeg brengen, doordien daardoor het kritische zweet belet, onderdrukt, de koorts in haren loop, en de natuur in hare heilzame pogingen gestoord worden. Nimmer late men zich, in navolging van eenige Geneesheeren, tot de vooronderstelling verleiden, dat laxermiddelen de plaats van aderlatingen in ontstekingskoortsen vervangen kunnen.

Lavementen uit de opgegevene zacht laxerende middelen bereid, wanneer men alleen de bevordering der buiksontlasting tot doel heeft; uit water en azijn, salpeter, *oxymel*, enz., wanneer men meer verkoelen; afkookfels van den *althea*-wortel, *malva* en andere slijmachtige middelen, wanneer men meer verzachten en bedaren wil, zijn in deze koorts van eene zeer uitgebreide nuttigheid.

Braakmiddelen zijn in de ontstekingkoorts steeds te vermijden, daar zij, als veel te hevig werkende prikkels, de geheele bewerktuiging aandoen, de wederwerking in het vaatstelsel, en bijgevolg de ontstekingachtige gesteldheid, vermeerderen. Indien het geval mogt plaats hebben, dat er ophooping van onverteerbare of andere schadelijke stoffen uit de maag moesten ontlast worden, en een braakmiddel onvermijdelijk noodig zijn mogt, moet de aderlating aan het braakmiddel voorafgaan.

Om de hette en daarmede gepaard gaande benaauwdheid en ijlhoofdigheid te verminderen, is de onderhouding van eene koele lucht van het grootste belang; niets werkt zoo spoedig en krachtig, vooral als de lijder van tijd tot tijd kan opstaan en het
bed

bed verlaten. Eene te warme lucht in de ziekenkamer vermeerderd de hette, en geeft tot gierstuitflag aanleiding; eene te koude lucht belet de kritische afscheiding door zweet, en vermeerderd de inwendige ontstekingen.

Tot drank zijn limonade, water en azijn, zuiver koud water, of met het sap van rijpe vruchten, als aardbeziën, aalbeziën, frambozen, kersen, enz.; gerste- en rijstwater met *oxymel*, de doelmatigste.

Met deze middelen, steeds geëvenredigd aan de hevigheid der ziekte, blijve men zoo lang volhouden, totdat alle verschijnselen der vermeerderde wederwerking ophouden en geheel verdwenen zijn. Meerendeels heeft zulks in de eerste negen dagen der koorts plaats; later vordert hare aanwending meer omzigtigheid, als wanneer de overgang in asthenische koortsen zoo ligtelijk plaats grijpt. Over het algemeen genomen, is het geene zoo gemakkelijke taak, het gebruik der verzwakkende geneesmiddelen zoo lang en in die juiste maat te bepalen, dat de wederwerking tot dien graad gebragt wordt, welke aan de gezondheid beantwoordt. Op deze wijze nu aan de eerste en tweede aanwijzingen voldaan zijnde, waardoor tevens de derde voorbereid en gedeeltelijk bevredigd wordt, zoeken men nu verder aan dezelve te voldoen.

Wanneer men voorziet, dat zich de koorts door zweet zal beflisen, de tong zuiverder, de huid vochtig, de pis ruim ontlast wordt, en ook de andere toevallen verminderen, bevordere men de huiduitwafeming door warme baden, warme stovingen,

zacht wrijven met warme doeken, warme dranken en zweetdrijvende geneesmiddelen, waartoe voornamelijk een aftreksel van vlierbloemen, vlier, confers, *Spiritus Mindereri*, *Vinum sibiatum*; waar de pols zwakker wordt, kamfer; waar eene krampachtige gesteldheid der huidvaten aanwezig is, het poeder van Dower (*Pulvis Doveri*) te pas komt. Maar men geve deze middelen, vooral de laatste, niet te vroeg, daar zij ligt, door hunne prikkelende inwerking, de wederwerking te sterk opwekken, en het nog smeulende vuur weder in volle vlam doen uitbarsten. Ook kunnen zij, vooral in sterke giften toegediend, door overprikkeling de krachten uitputten, en den overgang in asthenische koortsen bewerken.

Verliggende bloedvloeijingen moet men in den loop der koorts niet onderdrukken, maar door warme halve baden, dampbaden, zachte wrijvingen, bevorderen; vooral verdient dit bij het ontstaan van neusbloedingen behartigd te worden. Wanneer de bloedontlastingen overmatig worden, de krachten verminderen en de lijders over zwakheid klagen, dan moeten zij door zacht zamentrekkende middelen in bedwang gehouden worden. Oplossingen van salep, of arabische gom, met drie tot vijf greinen aluin, of *succus Catechu*, voor iedere gift, die men om de twee of drie uren herhaalt, totdat de bloedontlasting genoegzaam verminderd of geheel bedaard is; het verdunde vitrioolzuur, tot eenige druppels om het uur, met de genoemde slijmachtige dranken toegediend, is mede in de meeste gevallen voldoende.

Door de antiphlogistische geneeswijze, in de juiste,

te, aan de hevigheid der koorts geëvenredigde sterkte, aan te wenden, kan men alleen den overgang in andere ziekten met zekerheid vermijden; maar zelden staat het in de magt van den Geneesheer, deze maat zoo bepaald te treffen, daar ons de hulpmiddelen ontbreken, waarmede wij telkens den graad der koorts en dien der verzwakkende krachten van de geneesmiddelen kunnen meten en berekenen; veel blijft er derhalve aan het gezonde oordeel des Geneesheeren overgelaten, dat, vereenigd met eene naauwkeurige waarneming van den loop en de toevallen der koorts, alleen in staat stelt aan te wijzen, waar men met de verzwakkende geneeswijze behoort op te houden.

Dikwijls heeft de overgang in eene asthenische koorts plotseling plaats; meerendeels verloop er eenige dagen; er is een tusschentijd, waarin deze overgang langzaam en allengskens tot stand komt.

In het eerste geval is deze overgang ligt te kennen en te onderscheiden, wegens het als in een oogenblik ophouden en bedaren van al die verschijnselen en toevallen, welke de ontstekingskoorts kenmerken, en het verschijnen van die, welke aan het *typhus* of asthenische karakter eigen zijn. Zoo ras men er zich van overtuigd heeft, verwisfelt men de antiphlogistische met de opwekkende geneeswijze, en behandelt den lijder volgens de geaardheid der nieuw ontstane koorts, als eene rot-, zenuw- of gastrische.

In het tweede geval, waar de overgang langzaam is, vermag de Geneesheer veel ten goede of ten

kwade des lijders; daar hij dikwijls gelegenheid vindt, om het dreigende gevaar in tijds af te wenden, door de verzwakkende geneeswijze in eenen minderen graad aan te wenden, als te voren geschied was; door plaatselijk, de gezonkene wederwerking op te wekken, van andere deelen af te leiden, en het verbrokene evenwigt in de onderscheidene verrigtingen der stelsels te herstellen; en ten laatste door zoodanige middelen toe te dienen, die, blijkens de ervaring, in het laatste tijdperk der ontstekingskoorts, met het meeste voordeel gebezigd worden, mits dat men ze op het juiste tijdstip toediene; hoe dezelve werken, weten wij zeker niet, waarschijnlijk door onmiddellijke inwerking op de menging der vaste, en wel voornamelijk op de vloeibare deelen. Door opwekking als positive prikkels, of verzwakking als negative, werken zij zeker niet; het aannemelijkste gevoelen schijnt mij toe te zijn: dat zij de vermeerderde streembaarheid des bloeds verminderen, en het reeds gestremde weder oplossen, waardoor het product der koorts, dat als een vreemde prikkel de vermeerderde wederwerking in het vaatstelsel onderhoudt, opgeruimd, en de hinderpalen, die de genezing vertragen, weggenomen worden.

Men neemt tot de hier bedoelde hulpmiddelen zijne toevlugt, wanneer men, wegens de gezonkene krachten en den langen duur der koorts, het voortzetten der antiphlogistische behandeling, even zeer, als, wegens overiggeblevene versnelde beweging des bloeds, hardheid van den pols en andere ontstekingsstoevallen, de prikkelende geneeswijze vreest.

Ook

Ook daar komen zij te pas , waar de krachten door ruime aderlatingen zeer verminderd zijn , de pols schiekelijk , de huid droog blijft , en een sterke aan- drang van bloed (*congestio*) naar de inwendige deelen plaats heeft , slaapzucht of slapeloosheid en ijl- hoofdigheid , als daaruit voortvloeiende gevolgen , aanwezig zijn en voortduren.

Onder de middelen tot deze foort behoorende , verdienen voornamelijk eene nadere aanwijzing , vlie- genpleisters , bij plaatselijke aandoeningen op of in de nabijheid van de lijdende deelen , of aan de dijen en kuiten ; men houdt deze gedurende eenige da- gen open of herhaalt dezelve , wanneer de eerst bedaarde toevallen , nadat de werking der vliegen afgelopen is , zich weder verheffen. Zuurdeeg en mostaardpappen aan de voeten en kuiten , dagelijks eenige malen ververscht , totdat zij plaatselijk de wederwerking in de huidva- ten opgewekt hebben , die zich door roodheid , zwelling en vermeerderde uitwaseming te kennen geeft. De vochten worden daardoor naar de onder- ste ledematen heen , en van de edelere ingewanden afgeleid ; ook heeft hunne werking als tegenprik- kels , die de vermeerderde werkdadigheid in min- der edele deelen opwekken , dezelve in andere meer belangrijke bedaren , eenen weldadigen in- vloed. Warme hals- en voetbaden bevorderen de huiduitwaseming en stillen de zwaarste toevallen , door de opgewekte wederwerking in het huidvaat- stelsel , en door afleiding. Koude omslagen op het hoofd , bij zeer hevige hoofdpijn , ijlhoofdigheid , slaapzucht en slapeloosheid , die van *congesties* naar

het hoofd afhangen, worden met veel voordeel gebezigd. Menig lijder heeft voorzeker de herstelling zijner gezondheid aan het doelmatig gebruik van het eene of andere dezer plaatselijke middelen te danken, wat ook eenige Geneesheeren tegen hun gebruik in het midden mogen gebragt hebben.

Onder de inwendige middelen, welke in dat tijdperk der ontstekingskoorts te pas komen, waar noch de antiphlogistische, noch de prikkelende geneeswijze aangewezen zijn, komen bovenal het verzoete kwik (*Murias Hydrargyri oxydulati*, *Mercurius dulcis*), de *Digitalis purpurea*, de *Hyosciamus* en het *Opium*, in aanmerking, enkel of in vereeniging met elkander gegeven.

Het zoete kwik geeft men daar, waar het bloed zeer strembaar, en een' overvloed van vezelstof en strembare wei heeft, in grootere of kleinere giften, naardat de omstandigheden zijn, waarin de lijder verkeert en zij zulks vereischen, van één tot vier greinen met suiker om de twee of drie uren:

R_x. *Muriat. Hydrargyri oxydulat.* gr. i—iv.

Sachar. alb. gr. xv.

M. F. pulv. dent. tales dos. N. x

Zoo ras de aanwezig geweest zijnde toevallen geweken zijn, of de beginselen van kwijling te voorschijn komen, moet er mede opgehouden worden.

De *Digitalis purpurea* is alsdan aangewezen, wanneer de pols, nadat de andere ontstekingsgevallen geweken zijn, zeer snel blijft, veroorzaakt door verhoogde prikkelbaarheid in het hart en slagaderlijk vaat-

vaatstelsel, en wanneer er te weinig pis afgescheiden wordt. Men geeft dezelve van een half tot twee greinen dagelijks eenige malen; hare werking is doorgaans spoedig en zeer in het oog loopende, zoodat reeds de pols, na de eerste giften, in snelheid afneemt, en langer voortgebruikt wordende, denzelven tot beneden het getal der slagen, aan de gezondheid geëvenredigd, doet dalen; maar zoo lang behoort zij niet voortgebruikt te worden; men houde er mede op, zoo ras het getal der polsslagen voor geëvenredigd met de gesteldheid des lijders te houden zij. Het volgende voorschrift ter aanwijzing:

R. Pulv. fol. Dig. Purp. rec. gr. ß—gr. ij.

Sachar. alb. gr. xv.

M.F. pulv. dent. tal. dos. gr. vi.

S.

Dagelijks drie tot vier poeders.

De *Hyosciamus* en *Opium* doen bij slapeloosheid, veroorzaakt door eene te ver gedrevene antiphlogistische behandeling, bij al te groote prikkelbaarheid en gevoeligheid, bij krampachtige gesteldheid der huidvaten, enz., zeer veel nut. Hoezeer ik daarbij nimmer bedoele dezelve aan te raden, zoo lang er eene wezenlijke ontstekingsachtige gesteldheid aanwezig is, kan ik niet voorbij hunne groote nuttigheid, waar zij aangewezen zijn, te roemen. Men kan het *extract. Hyosciami* of *Opium* om de twee of drie uren in kleine giften, of een- of tweemaal 's daags in eene grootere hoeveelheid, toedienen:

R. Ext.

R_p. *Ext. Hyosciam.* gr. iv. *vel opii dep.* gr. ij.
Sachar. alb. ʒiſ.

M. F. pulv. div. in viij part aeq.

D. S.

Om de twee of drie uren een poeder.

R_p. *Op. depur.* gr. j. *vel ext. Hyosc.* gr. ij.
Sachar. alb. gr. ij.

M. F. pulv. D. S. op ééns.

Waar men bevordering van den slaap voornamelijk bedoelt, geve men het laatste poeder, des avonds op den tijd, waarop de lijder in zijne gezonde dagen gewoon is, zich ter rust te begeven; zonder bepaald aan het *Opium* of de *Hyosciamus* de voorkeur te geven, verdient toch daar, waar men groot belang in eene zekere uitkomst stelt, de voorrang aan het *opium*.

Waar aan twee of meer aanwijzingen te voldoen is, vereenige men de opgegevene middelen met elkander; de aangeduide hoeveelheden kunnen dezelve blijven, of worden naar den toestand des lijders gewijzigd. Vele Geneesheeren raden aan, om steeds het gebruik van het kwik met dat van het *Opium* te vereenigen, en willen daarvan eene nog betere uitwerking gezien hebben, dan wanneer zij hetzelfde alleen toegedicnd hadden.

De eenvoudige ontstekingskoorts komt in ons land en onze luchtstreek zelden geheel zuiver en in hare grootste hevigheid, maar meerendeels met andere gesteldheden gecompliceerd, voor.

De gastrische, de zinkingachtige en plaatselijke ont-

ontstekingen (*complicatio cum inflammatione topica*) zijn de meest gewone. In de kunstbehandeling moet daarop steeds behoorlijk acht gegeven worden, en de antigastrische, zweetdrijvende (*diaphoresis*), in de plaatselijke behandeling der bijzonder lijdende deelen, met de antiphlogistische methode verbonden worden.

Behandeling der herstellenden. Het tijdperk der genezing (*reconvalescentia*) is doorgaans kort en gaat schielijk in volkomene gezondheid over. Als de krachten weinig of niets geleden hebben, dan late men, ter voorkoming van instorting (*recidivus*), nog eenige dagen een' verkoelenden leefregel in acht nemen, met vermindering van alle verschillende dranken en sterk voedende spijsen, als, wijn, vleeschspijzen, overmatige warmte, sterke lichaamsbeweging en versterkende geneesmiddelen; slechts langzaam en trapsgewijze keert de lijder, zonder nadeel, tot zijnen gewoonen leefregel en bezigheden terug. Waar de lijders, na het doorstaan der koorts, zeer verzwakt zijn, is een voedende leefregel, uit vleeschspijzen, goed bier, versterkende en bittere geneesmiddelen aangewezen; deze laatste vooral dan, wanneer de eetlust ontbreekt en de spijsverteringswerktuigen zeer verzwakt zijn. Steeds houde men echter in het oog, dat er bij de meeste herstelden van ontstekingskoortsen nog eenigen tijd eene neiging tot deze ziekte overig blijft, die door een' te prikkelenden leefregel ligt weder daarin overgaat.

§. 2.

*Asthenische koortsen.*A. *Rotkoorts.**(Febris putrida, Typhus putrida).*

Bepaling. Aanhoudende koorts, met groote zwakte der vaste deelen en verhoogde prikkelbaarheid, eigenaardige veranderingen in de menging der vochten, voornamelijk van het bloed, met neiging tot ontbinding en rotting der vloeibare en vaste deelen.

Karakter. De rotkoortsen heerschen in alle jaargetijden en in alle landstreken; noch ouderdom noch geslacht beveiligen tegen hare woede; zij heerscht meer in de heete, dan koude landstreken en jaargetijden, in heete zomers, warme en vochtige winters zonder vorst; zeldzamer in drooge, hoog liggende landen, meer in lage, vochtige en warme. In moerasfige landstreken is zij endemisch; in andere epidemisch en sporadisch. Zwakke, ziekelijke lieden, met scorbutische gesteldheden der vaten en vloeibare deelen, de bewoners van geslotene verblijven, tast zij bij voorkeur aan, waar zij sporadisch voorkomt. De gezondste, sterkste, en in den vollen bloei hunner jaren staande personen, zijn hare gewone slagtoffers, waar zij epidemisch woedt. Voor grijsaards, kinderen en vrouwen, vooral voor zwangere en kraamvrouwen, is zij alsdan het minst gevaarlijk.

Epi-

Epidemisch en contagieus heerschend tast zij gewoonlijk plotseling en zeer hevig aan; zonder eenige voorboden bereikt de ziekte, reeds in de eerste wording, een' zeer hoogen trap; niet epidemisch contagieus zijnde, heeft zij hare langer of korter durende voorloopers van 8 tot 14 dagen.

Deze zijn: gevoel van zwakte en loomheid, voorname-^{Voorloopers} lijk in de gewrichten; schielijke, dan eens volle, dan weder kleine en harde pols; afwisselende koude rillingen en hette; zware hoofdpijn, met dofheid en duizelingen, waggelende gang, droefgeestigheid, bedorvene smaak en stinkende oprispingen, kleverige, smerige, vuile tong, dorst, verlorene eetlust, walging, misfelijkheid, gevoel van toenemende zwakte, volheid en drukking in de maagstreek, troebele pis, trage, zeer stinkende buiksonstastingen.

De koorts zelve begint met koude rillingen, welke uit de borst en maagstreek schijnen voort te komen, en spoedig door groote hette met drooge huid^{Verscheijnen en toevallen der} gevolgd worden, daarna door zware hoofdpijn, met drukking in het voorhoofd boven de oogen; slape-^{koorts.} loosheid, toenemende zwakte, groote neêrslagtigheid en moedeloosheid, onverschilligheid voor het leven; walging en affchuw tegen alle spijsen, aanhoudenden, steeds heviger wordende dorst, verlangen naar zure dranken, wijn en vruchten; men vindt eenen harden, gespannen', zeer schielijken en vollen pols, die aan den drukkenden vinger weinig tegenstand biedt; de huid is zeer droog, smerig, vuil, vooral in het aangezicht, de hette brandend en bijtend voor het gevoel, wanneer men de zieken aangrijpt, die in
de

de hand nog voortduurt, nadat zij reeds eenige minuten van den lijder verwijderd is; de tong droog, de dorst onleschbaar. In den verderen loop der koorts wordt de pols klein en zwak, onregelmatig, tusfchenpoozend, ontelbaar fchielijk, voornamelijk na voorafgegane aderlatingen en bloedvloeijingen, kort voor den dood langzaam, vol en week,

Verder neemt men waar fteeds toenemende zwakte en magteloosheid, ligging op den rug met opgetrokken kniën en van elkander verwijderde dijen, afzakken naar het voeteneinde der legerfede, onwillekeurige beweging met de handen, pluizen en muggevangen, bevingen en opspringen der pezen; doffe of zeer hevige pijn in het hoofd, de lendenen en overige ligchaamsdeelen; later gevoelloosheid; de lippen, tanden, tong en geheele mondholte met eene drooge, zwarte korst overdekt, in de volkstaal zwarte sprouw genaamd, fomwijlen ingekorven en gefcheurd.

De ftem en fpraak zijn zwak, naauwelijks hoorbaar, flotterend, afgebroken, onverftaanbaar; de gevoelloosheid en onverschilligheid nemen toe en gaan in verdooving en wakende flaapzucht over; bij nacht en ook des daags ontftaat er ftille of raaskallende ijelhoofdigheid, die dikwijls met elkander afwifelen; voortdurend prevelt de zieke in zich zelve, springt met de koortsverheffingen wild op in het bed; een rood opgezet aangezigt, wild fttaande, flonkerende oogen en woest voorkomen, vergezelt zulks.

De adem, de uitwafeming, de ontlasting, de geheele dampkring, die den lijder omgeeft, verspreidt een' zeer ftinkenden, rotachtigen reuk; de eerfte, meer natuurlijke pis wordt donkerrood, bruin, zwart,
met

met een tintelend vliesje bedekt, en laat een dik zwart zetsel vallen.

De buik zwelt op (*meteorismus*); op het aanraken met de hand geeft de lijder teekenen van pijn; de pisonrlasting is onderdrukt; er ontstaat een smeltende buikloop (*diarrhaea colliquativa*); de drekstoffen zijn bruin, zwart, bloedig, en hare ontlasting onwillekeurig; naarmate deze vermeederen, neemt de zwelling van den buik toe. De huid wordt met gele, bruine, zwarte vlekken en strepen overdekt, gierstuitslag, bloedzweren en opzwellingen der oorklieren, die veelal door versterking gevolgd worden, sprouw, overgang tot versterking dier plaatsen, welke zich de lijder doorgeleggen heeft.

Bloedvloeiingen uit den neus, de longen, de pisbuis, de schede, den aars, de huid en andere buitengewone wegen. Het bloed is opgelost, blijft vloeibaar of stolt zeer langzaam en laat; waar zich een bloedkoek vormt, is hij met eene geelachtige korst bedekt, die zeer week is, weinig tegenstand biedt, en, tegen het licht gehouden, met verschillende kleuren speelt. Vliegenpleisters trekken geen waterachtig, maar een bloederig vocht; de plaatsen, waarop zij gelegen hebben, en zoo ook alle andere ontstekingen, gaan ligtelijk tot versterking over; koud, kleverig, stinkend zweet, somwijlen bloedig, koude handen en voeten, reutelende ademhaling, opgezwollene hals en borst, ontsteld aanzigt (*facies Hippocratica*), stuiptrekkingen, krampachtig knarsen op de tanden, geflotene mond, moeilijk slikken, met een rommelend geluid in den

flok darm, en andere zenuwtoevallen, gedurende welke de lijder den geest geeft.

Na den dood blijft het lijk nog lang warm en buigzaam, de doodvlekken zijn zeer talrijk en zwart, de lijken gaan binnen vier en twintig uren reeds tot verrotting over. Bij de opening vindt men in de holligheden veelvuldige bewijzen van de reeds voor den dood bestaan hebbende neiging tot ontbinding en rotting; het bloed is dun en stinkend, de buksingewanden veelal met zwarte vlekken, gelijk aan die, welke de huid bedekte.

Oorza-
ken.

De oorzaken der rotkoortsen zijn even veelvuldig als verschillend. Algemeen kan alles, wat de levenskrachten uitput, den samenhang der vaste deelen vermindert, en eene neiging tot ontbinding in de vloeibare te weeg brengt, eene rotkoorts doen ontstaan.

De enkel voorkomende, of sporadische rotkoorts ontwikkelt zich gewoonlijk uit andere koortsen; ontstekingskoortsen, waarin men te veel bloed ontlast, eene al te verzwakkende geneeswijze aangewend, of te lang volgehouden heeft; asthenische koortsen, die ondoelmatig behandeld zijn geworden; plaatselijke, tot versterking overgegane ontstekingen, groote verëteringen, belette ontlastingen, waardoor zeer scherpe stoffen ontledigd werden; teruggeblevene nageboorte, onderdrukte kraamzuivering, ophooping en uitstorting van vochten, die tot bederf overgaan; gastrische ophooping door slecht en bedorven voedsel, of ontaarde afgescheidene vochten, zijn, blijkens de ervaring

van

van alle tijden, hare gewoonste en meest voorkomende oorzaken.

De algemeen heerschende, epidemische rotkoorts, zonder besmetting, ontleent hare oorzaken uit den dampkring, het klimaat, de woonplaatsen, het voedsel, uit dreigende onheilen, schrik, angst en vrees, die, als algemeene volksrampen, de hartstogten en gemoedsbewegingen, bij velen te gelijk, opwekken, zich met hunne schadelijke inwerking niet tot enkele personen bepalen, maar de geheele bevolking van een dorp, stad, of gewest, treffen.

Hiertoe behooren, wat den dampkring betreft, zeer heete, vochtige lucht, nog meer bedorven door moerasuitwasemingen, rotting van dierlijke zelfstandigheden of planten, het openen van lang gesloten verwelden, kelders, graven, bronnen, de lucht uit gevangenhuisen, hospitalen, en uit alle zoodanige plaatsen, waarin vele levende wezens, voornamelijk menschen, in eene zeer kleine ruimte opgehoopt, eenigen tijd hun verblijf houden en leven moeten; de uitwasemingen van andere dieren en insecten zijn wel minder nadeelig, echter geenszins onschadelijk.

2°. Een heet, vochtig klimaat, laag gelegene moerasige landen, voorafgegane overstromingen, verblijf in slecht gebouwde, vochtige huizen en hutten, waarin de lucht niet behoorlijk kan ververscht worden, en vele ademhalende schepselen bijeen zijn.

3°. Hongersnood, weinig en slecht voedsel, bedorven vleesch, vleesch van dieren, door ziekte, vooral door de veepest, gedood; gebrek aan

zout, slecht brood van bedorven graan, of met vergiftige zaden gemengd graan gebakken, half bedorvene groenten, gebrek aan alle verse voedfels, aanhoudend gebruik van gezouten en ingelegde spijzen, bedorven water, bij gebrek van wijn, brandewijn, jenever, bier, azijn en alle andere dranken.

4°. Oorlogen, aardbevingen, verwoestende en schrikbarende natuurverschijnselen, die eene voortdurende neêrslagtige gemoedsgesteldheid, angst en vrees onderhouden.

5°. Overmatige, lang volgehoudene bewegingen, die met groote krachtverspilling gepaard gaan, zware geforceerde marschen en terugtogten van arméén, in een slecht faizoen, ongunstige weêrsgesteldheid, en gebrek aan den noodigen leefstogt, slechte kleeding en ligging, nachtverblijf onder den blooten hemel, enz.

Zelden zal het gebeuren, dat de eene of andere dezer oorzaken, voor zich alleen, op anders gezonde en onder gunstige omstandigheden levende personen, eene epidemische rotkoorts doet ontstaan; meerendeels komen er meerdere gelijktijdig te zamen, en eerst de vereeniging harer schadelijke invloeden hebben de epidemie ten gevolge.

De besmettelijke epidemische rotkoorts (*Febris putrida contagiosa*) is steeds een gevolg van eene eigenaardige stof, die op het ligchaam, waarmede zij in aanraking gebragt is, in diervoege inwerkt, dat eene koorts, met al de teekenen en toevallen eener rotkoorts plaats grijpt, zonder dat eenige an-

dere, daarheen strekkende, oorzaken medegewerkt hebben, en waarbij ieder ziekwordend voorwerp dezelfde smetstof op hem afscheidt, geschikt, om bij anderen dezelfde koorts voort te brengen.

Deze, even als andere smetstoffen, valt buiten het bereik eener scheikundige ontleding; wij kennen dezelve alleen in haar bestaan, en weten slechts, dat haar ontstaan en hare uitbreiding door zekere omstandigheden begunstigd wordt, en hare uitwerkingen verwoestende zijn. Deze smetstof kan uit andere plaatsen en landen aangevoerd, of oorspronkelijk ontstaan zijn; de smetstoffen der pest, der gele koorts, der legerpest, enz., zijn uit andere landen naar Europa overgevoerd, en hebben zich noch bij ons, noch bij onze naburen, oorspronkelijk ontwikkeld. Echter neemt ook de eenvoudige rotkoorts bij ons, dikwijls, eene besmettende geaardheid aan; slechte behandeling, ongunstige omstandigheden, welke door geneeskundige hulpmiddelen alleen niet kunnen opgeruimd worden, als het bijeen zijn van vele menschen in naauw beperkte ruimten, in gevangenhuisen, oorlogs- en transportschepen, in belegerde plaatsen en in zeer opgepropte hospitalen, waar de lucht niet behoorlijk ververscht en vernieuwd worden kan. Deze schadelijkheden hebben niet zelden sporadische en niet besmettende epidemische rotkoortsen in besmettende, maar ook andere, volgens hare oorspronkelijke geaardheid, noch gevaarlijke, noch besmettende koortsen in zeer kwaadaardige en besmettende rotkoortsen doen overgaan; zelfs de gevaarlijkste en besmettelijkste

epidemiën hebben zich meerendeels op deze wijze ontwikkeld.

Loop der
rotkoorts.

Volgens de meerdere of mindere kwaadaardige geaardheid der koorts, die volgens de gesteldheid des lijders en der epidemiën zeer verschillend zijn kan, is haar duur verschillend van 24 uren, tot drie, vier en meer weken; de kwaadaardigste beslissen zich spoediger dan de minder kwaadaardige. De overgang in gezondheid volgt doorgaans eerst na den vijftienden, den een en twintigsten dag en nog later; de dood bij zeer kwaadaardige rotkoortsen (*ephe-mera maligna*) binnen de eerste acht en veertig uren. Bij de minder kwaadaardigen den 5, 7, 9, 11, 13 en 15 dag, somwijlen echter nog later. De geaardheid der epidemie, de gesteldheid des lijders, deszelfs verpleging en geneeskundige behandeling, oefenen op het eene en het andere eenen gewigtigen invloed.

De toevallen zijn zeer verschillend en menigvuldig, hunne volgreeds zonder regelmatigheid en bepaalden duur; dan eens bereikt de koorts in de eerste dagen haren hoogsten trap, en de toevallen blijven verscheidene dagen onveranderd dezelfde, totdat zij zich eindelijk met eene bijna plotselinge vermindering der toevallen, in gezondheid, of plotselinge vermeerdering in den dood eindigen.

Dan eens is het ware karakter der koorts in de gedaante van eene ontsteking- of andere koorts vermomd, totdat zij zich, na verloop van eenige dagen, in hare eigenlijke gedaante openbaart. De gevaarlijkste schijnen dikwijls in haar begin ligt en
niets

niets beduidend, de minst gevaarlijke beginnen met de zwaarste toevallen. De kwaadaardigste zoo wel als de minder kwaadaardige hebben zelden eenen volstrekt aanhoudenden, maar gewoonlijk eenen aflatenden *typus*; zonder duidelijke *remissie* en *exacerbatie*, die bovendien geene de minste regelmatigheid in hare volgreeds in acht nemen; dan hebben zij des morgens, dan des avonds, en op alle uren van den dag en nacht plaats. De spreekwijze, in de volkstaal te huis behoorende: de avond bezwaart allen zieken, is hier niet toepasselijk, en heeft vele bepalingen en uitzonderingen. Dikwijls vindt men zijnen lijder des morgens in veel ongunstiger omstandigheden, dan des avonds.

De koude, waarmede de koorts, waar zij zich in hare ware gedaante voordoet, begint, is doorgaans hevig en duurt van vier tot twaalf uren; de daarop volgende hette is brandend, en wisselt, in de eerste acht en veertig uren, meermalen met koude rillingen af. De pols wordt snel en hard, de zwakte bereikt eenen zeer hoogen graad, de geringste vermoeijng heeft flauwten ten gevolge, de spierbewegingen worden nu onzeker en gaan met bevingen gepaard, de tong wordt droog, hard en zwart, de dorst is zeer hevig, de lijders zijn moedeloos en beangst, verdrietig, hun voorkomen dof en dom, zij beginnen te ijlen, verspreiden eenen rotachtigen reuk, zenuwtoevallen komen daarbij. Iets later smeltende ontlastingen (*excretiones colliquativae*), en kentekenen van ontbinding der vaste en vloeibare deelen. De lijder sterft onder teekenen, die inwendige ontstekingen aanwijzen, de oogen zijn rood

en staan strak en verwilderd, het aangezicht opgezet, de pols vol, de lijder wordt slaapzuchtig, sterft plotseling en appoplectisch, of langzaam met steeds afnemende krachten en reutelende ademhaling.

De overgang in gezondheid geschiedt langzaam, en het tijdperk der genezing is langdurig; weken en maanden verloopen er, alvorens de lijder zich in het volkomene genot zijner gezondheid kan verheugen. De toevallen verminderen zeer langzaam, zelden vinden er kritische ontlastingen plaats, waarmede de toevallen en ziekteverschijnselen geheel verdwijnen; zij beslissen, waar zij aanwezig zijn, niet volkomen, maar hebben dikwijls vermindering van dezelve ten gevolge. Hiertoe behooren een gelijkmatig algemeen zweet, dat niet overmatig is, eenige spoedig achtereenvolgende buikontlastingen, bij een' zachten, niet opgezwollen' buik, die door geen en buikloop gevolgd worden, ruime pisontlasting, met veel geel, bruinachtig of rood zetsel, en kleine puntige zoutkristallen, die zich op den bodem van het vat, waarin de pis staan blijft, afzetten, of ook wel drijvende blijven. Ontsteking en zwelling der oorklier op de eene of andere zijde, die spoedig in verëtering overgaat, zweren, en etterend uitslag op andere deelen; doofheid, versterking in den omtrek van het heiligbeen en de billen, in het meestgevorderde tijdperk der koorts, die genoegzaam plotseling eene bepaalde, niet verder voortgaande uitgebreidheid bereikt (*decubitus gangraenosus*), heb ik dikwijls bij eene gunstige beslissing zien voorafgaan. Volgens eenige Geneesheeren, wordt een gunstige uitgang door de uit-

uitbotting van vlekken op de huid (*peterhiae*) voorspeld.

Bloedontlastingen zijn in de rotkoorts steeds meer voor kwaad voorspellende toevallen, dan wel voor kritische ontlastingen te houden. Zij kunnen een gevolg zijn van de groote zwakte der vaste deelen en van de opgelostheid der vochten (*colliquatief*), en toevallig zijn, die men matigen of onderdrukken, maar nimmer bevorderen moet. Echter zijn het de bloedontlastingen niet alleen, die de oplettendheid des Geneesheeren in den loop der rotkoorts vereischen, maar ook alle andere ruime ontlastingen, hoe en door welke wegen zij geschieden mogen, maken de grootste voorzorgen van de zijde des Geneesheeren noodzakelijk, want allen zijn zeer geneegen om overmatig te worden, en de krachten uit te putten.

Dikwijls blijven er naziekten terug, of de rotkoorts beflist zich onvolkomen, en gaat in andere ziekten over; de gewoonste onder deze zijn: zuchtige zwellingen van enkele deelen, waterzucht, hevige pijnen in de leden, verlammingen, doofheid, blindheid, huiduitslag, bloedzweren, die langdurig etteren en niet zelden tot versterking overgaan, verval van krachten, toring, verzwakte ingewanden, met daarvan aanhankelijke flechte spijsvertering. Ook daar, waar zich deze koorts regelmatig en ten goede beflist, vindt men wel eens lijdens, die, gedurende eenigen tijd, door onbevredigenden honger of vraatzucht gekweld worden, meerendeels een gevolg van vreemde in de eerste wegen teruggeblevene prik-

I 5

kels,

kels, die men ontlasten moet. Aanhoudende slape-
loosheid kwelt de meeste der herstelden, hun aange-
zicht blijft langen tijd ingevallen en bleek, het ge-
heele ligchaam mager, de haren vallen uit; een ge-
ruime tijd verloopt er, alvorens de gezondheid tot
vorige kracht en sterkte wederkeert. Eene eenmaal
doorworstelde rotkoorts, hoofdzakelijk de besmetten-
de, beveiligt, zoo niet voor altijd, toch voor lan-
gen tijd, tegen deze ziekte.

Voorzeg-
ging.
(Progn-
osis). Naast de zenuwkoortsen zijn de rotkoortsen de
gevaarlijkste, moeilijkste en kwaadaardigste. De
voorzegging is derhalve altijd ongunstig, onzeker
en bedriegelijk; in de eerste dagen der ziekte laat
zich de waarschijnlijke uitgang in het geheel niet
beoordeelen; men kan slechts eene zware, het le-
ven met gevaar dreigende ziekte voorspellen. Voor
den negenden dag kan men zelden met eenige ze-
kerheid eenen gunstigen uitslag voorzeggén. Na dat
tijdperk wordt met iederen dag, dien de lijder over-
leeft, de hoop op herstel grooter en meer gegrond.
De verschillende geaardheden der epidemiën en de
individueele gesteldheden der lijders oefenen daarbij
eenen gewigtigen invloed, waarnaar men zich in de
voorzegging regelt. In de jaarboeken der genees-
kunde vinden wij de geschiedenissen van epidemiën
geboekt, waarin de dood reeds in de eerste 48 uren,
andere, waarin hij zelden na den 3, 5, 7, 9 dag
volgde; alle lijders, die deze dagen overleefden,
werden hersteld. Epidemische en besmettende rot-
koortsen volgen doorgaans een' meer zekeren en
regelmatigen loop in al hare verschijnselen, toeval-
len

len en veranderingen, als de sporadische, en men kan de geschiedenis der ziekte uit de waarnemingen van andere lijders afleiden, en op de voorzegging toepassen. Voordat de ziekte geheel is doorgestaan, belove men nimmer, op eene al te stellige wijze, leven en gezondheid, daar vele lijders, onder anders gunstige omstandigheden, eerst van den 21sten tot den 30sten dag slagtoffers der ziekte worden.

Het is goed, als de koorts langzaam haren loop vervordert, niet aanmerkelijk na den zevenden en negenden dag verslimmert, de toevallen dezelfde blijven en geene nieuwe daarbij komen, de krachten in goeden staat blijven, de pols week, eenigzins vol en niet zeer schielijk is, natuurlijke gelaatstrekken, minder brandend heete, eenigzins vochtige huid, en vochtige tong, ruime pisontlasting, natuurlijke slaap, gewone klank der stem, gelijkmatig warm, niet overmatig zweet. Als de koorts tot een' hooger en graad geklommen is, kan men zich met een' gunstigen uitgang vleijen: wanneer de aanwezige zenuwtoevallen, niet plotseling, maar allengskens afnemen, de hik en het opspringen der pezen zeldzamer zijn, de lijder rustiger, tot slaap genegen en doof wordt, het bewustzijn terugkeert, de aanwezige vlekken (*peterhiae*) hare zwarte of bruine kleur in eene helder roode verwisselen, de colliquativische en toevallige ontlastingen bedaren, de metastasische ontstekingen spoedig tot goedaardige verëteringen overgaan, de pols regelmatig, langzaam en week wordt.

Goede teekenen.
(*Signa bona*).

Zeër

Kwade
teekenen.
(*Signa
mala*).

Zeer lang aanhoudende koude bij den aanval der koorts, spoedig toenemen der toevallen, zoodat de koorts reeds in de eerste dagen eenen zeer hoogen trap bereikt; schielelijke vermindering der krachten, flauwten, zeer snelle, kleine, harde, onregelmatige, tusfchenpoozende pols, zenuwtoevallen, kramp-trekkingen, knarfen op de tanden, onwillekeurig lagchen, hik, opspringen der pezen, bevingen, pluizen met de handen en muggevangen, ijlhoofdigheid, angst en benaauwdheid, belette pisontlasting, opzwellen van den buik, liggen op den rug, met uit elkander gespreide dijen, afzakken naar het voeteneinde, bruine en zwarte vlekken in de huid, ontstekingen, die spoedig tot verfterving overgaan. In het eerste tijdperk der koorts verfterving van de plaatsfen, waarop vliegenpleisters gelegen hebben, smeltende ontlastingen, ftinkend ongelijkmatig zweet, bloedvloeiingen, brakingen, onwillekeurige buiks- en pisontlastingen, heefche, holle, onverftaanbare ftem.

Doodelij-
ke tee-
kenen.
(*Signa
cethalia*)

Doodelijke teekenen zijn: bevende, ontelbaar schielelijke pols; zeer ontfteld, bleek, ingevallen aangezigt, spitse neus, holle, halfgeftotene oogen, verwijderde, voor het licht weinig aandoenlijke pupil, opene mond, neêrhangende onderkaak, of mondklem, onvermogen om te flikken, hoorbaar geluid bij het flikken, geel worden der huid, ftuiptrekkingen, watervrees, volftrekte bewusteloosheid en gevoelloosheid, koud zweet op het aangezigt, koude handen en voeten, zeer ftinkende, zwarte buiksontlasting, met trommelzuchtig ge-

gezwollenen buik, verftervingen van belangrijke deelen, of, die eene groote uitgebreidheid bereiken, bloedvloeijingen, waarbij het ontlaste bloed zeer dun is en niet ftolt; wormen, die uit den mond en aars kruipen, het ongedierte het ligchaam verlaat, of op hetzelve fterft, aanhoudende flaapzucht, hijgende, moeilijke en reutelende ademhaling.

Waar gelijktijdig meerdere van dèze toevallen aanwezig zijn, is de dood zeker in de nabijheid; een enkel op zich zelf fttaande toeval kan aanwezig zijn, en de lijder herfteld worden, wanneer de overige omftandigheden minder gevaarlijk en gunftig zijn.

Veelvuldig zijn de complicatiën der rotkoortfen, zelden komen zij geheel zuiver, en in onderfcheidene epidemiën onder ééne en dezelfde gedaante voor. Naarmate zij met eene gaftriſche, zenuwachtige of ontftekingachtige gefteldheid gepaard gaan, neemt zij ook verſchillende gedaanten aan, waarbij echter ſteeds het rotachtige karakter duidelijk ontwikkeld is. De velerleije benamingen, aan de onderfcheidene epidemiën van rotkoortfen gegeven, ontleenen van daar haren oorfprong; geen wezenlijk verſchil in het eigenaardige karakter der koorts heeft daarbij plaats, maar alleen wijzigingen en afwijkingen in den aard en loop der toevallen en verſchijnselen, die haren grond hebben in het plaatselijke lijden van eenig deel, meerdere of mindere aandoening van het eene ſtelfel, boven het andere, in de plaatselijke gefteldheden van het cord, waar
zij

Bijzondere foorten der rotkoorts.

zij heerſchen , in de meest in het oog loopende toevallen , en in de voortbrengende oorzaken , die echter naauwelijks toereikende zijn , om de onderscheidene complicatiën en trappen , waarop zij klimmen kan , duidelijk aan te wijzen.

De voornaamste der onderscheidene benamingen , die de rotkoorts verkregen heeft en somwijlen nog draagt , zijn :

De Hongaarsche koorts (*febris Hungariae petechialis*) , omdat zij eerst in *Hongarijen* heerschte , alvorens zij zich in de 16^{de} eeuw over bijna geheel *Europa* verbreidde.

De hospitaals-koorts (*febris nosocomialis*) , die menigvuldig in de hospitalen , met vele zieken en gekwetsten opgevuld , geheerscht heeft , en ook nu nog tot de gewone verschijnselen in oorlogstijden behoort.

De leger- , scheeps- en kerkerkoortsen (*febris castrensis , navalis , carceraria*) , dus genaamd naar de plaatsen , waarin zij voorkomen , en welke voornamelijk in vroegere jaren zeer algemeen geheerscht hebben , toen men minder met de zuiverings-middelen eener ingesloten lucht bekend was , en ook minder zorg droeg voor de noodige verversching des dampkrings , gezonden en zieken niet van elkander afscheidde , en de laatste ook minder doelmatig verpleegde en behandelde dan tegenwoordig.

De kwaadaardige koorts (*febris maligna*) wegens de zware toevallen en groote doodelijkheid der ziekte.

De pestkoorts (*febris pestilentialis*) wegens de al-
ge-

gemeene doodelijkheid, kwaadaardige builen met verfterving, bloedvloeiingen en andere zware toevallen, die in de Oosterfche pest gewoon zijn.

De gele West-Indifche koorts (*febris flava Americana*) en de Oosterfche pest (*pestis, pestilentia*) worden, mijns bedunkens, te regt voor niet anders dan de hoogfte graden der rotkoorts gehouden, gecompliceerd met het zenuwachtige karakter; hare toevallen en verfchijnfelen ftemmen in zoo vele opzigten met die der rot- en zenuwkoortfen overeen, dat men ze niet wel als op zich zelve beftaande koortsvormen befchouwen kan; het eigenaardige en kenschetfende in haren oorfprong, loop, verfchijnfelen, uitbreiding en weder ophouden, laat zich genoegzaam uit de onderfcheidene omftandigheden, die aanwezig zijn, daar, waar zij heerfchen, verklaren. Wij zullen dezelve derhalve ook niet afzonderlijk afhandelen.

De geneeskundige behandeling vordert, dat men ^{Geneeswijze.} aan de onderfcheidene aanwijzingen, die zich uit het karakter der koorts, haren loop, toevallen, gefteeldheid der vaste en vloeibare deelen, en uit de tijdperken, waarin zich de koorts bevindt, laten afleiden, op de eenvoudigfte, doelmatigfte, en met de ervaring van andere Geneesheeren overeenftemmende wijze, voldoe; met ter zijde ftelling van alle theoretifche onbewijsbare vooronderftellingen, en gewaande kennis der naaste oorzaak.

1°. Men trachte, in het begin der koorts, hare verdere ontwikkeling te verhoeden, door alle uitwendige en inwendige fchadelijkheden, die de
koorts

koorts voorgebragt hebben en onderhouden, weg te nemen.

- 2°. Men onderhoude en ondersteune eene behoorlijke werkdadigheid in de levenskrachten.
- 3°. Men wende alle pogingen aan, om de ontmening en neiging tot rotting in de vaste en vloeibare deelen te verminderen, tegen te werken, en in haren voortgang te stuiten.
- 4°. Men bevordere en ondersteune de kritische ontlastingen, in de meer zeldzame gevallen, waarin zij plaats vinden.
- 5°. Doelmatige behandeling der bijzondere gevaar dreigende toevallen, volgens hunne geaardheid, de algemeene gesteldheid des lijders, en de voornamelijk lijdende deelen.
- 6°. Behandeling der genezenden.

Om aan de eerste aanwijzing te voldoen, moeten alle nog voortwerkende schadelijkheden, zoo spoedig mogelijk, verwijderd worden. Men brenge tot dat einde den zieken in een ruim, luchtig vertrek, waarin de dampkring gezuiverd en ververscht kan worden door eene vrije speling der buitenlucht, en door scheikundige berookingen met zout- of salpeterzure dampen.

Men ontzegge den lijder het gebruik van spijsen indien hij nog eetlust heeft, en veroorlove hem alleen het genot van zuurachtige, rijpe, gestoofde vruchten en ligte groenten; rade het vlijtig gebruik van dranken, waartoe de uitgeperste sappen van zure vruchten met water en suiker, limonade; gerste-, rijst-

rijst- of broodwater, met water verdunde minerale zuren, met zoo veel suiker als er tot een' aangenaamen smaak noodig is, de meest geschiktste zijn. Wijn komt hier in het eerste tijdperk der koorts, waarin zich het vaatstelsel in een' zeer geprikkelden toestand bevindt, minder te pasfe; aan lijders, die daaraan gewoon zijn, kan men kleine hoeveelheden toestaan. Waar de krachten van den eerften beginne zeer verminderen, is de wijn noodzakelijk, en moet in toereikende hoeveelheid gegeven worden. De Rhijsche wijnen van goede hoedanigheid zijn de meest geschiktste, en verdienen de voorkeur boven alle andere.

Ophooping in de maag, zij mogen uit overblijfselen van flechte, bedorvene en onverteerde voedfels, of in vermeerderde gal- en slijm-affcheidingen bestaan, moeten ontledigd worden.

Braakmiddelen zijn derhalve, in het begin der koorts gegeven, van het uiterfte belang, doordien zij de stoffelijke oorzaak, welke de koorts onderhoudt, zonder groot verlies van krachten ontledigen, en daarenboven door hunne sterk schokkende inwerking als een algemeene prikkel werken, welke, door de opgewekte wederwerking, die der ziekmakende prikkels vermindert en uitdooft. De ervaring heeft, door alle tijden heen, genoegzaam en overtuigend geleerd, hoe onmisbaar de braakmiddelen in dezen ziektevorm zijn. Ook dan, wanneer er in het geheel geene stoffelijke oorzaken aanwezig zijn, en door de inwerking eener smetstof de rotkoorts voortgebracht is, kan dikwijls een braakmiddel, ter pasfe

gegeven, de koorts in hare eerste wording vernietigen, en alle andere geneeskundige hulp overtollig maken. Waar men met het braakmiddel eene spoedige en hevige werking bedoelt, is de braakwijnsteen alleen, of met den braakwortel vereenigd, het best geschikt. Het is beter de braakmiddelen in gebrokene giften, dan groote op ééns te geven.

R̃. Tart. Potassae Stibiat. gr. iv.

Aq. depur. unc. iiiß.

Syr. alth. unc. ß.

M. D. S.

Eerst twee, en vervolgens ieder kwartier een' lepel vol, tot drie of vier brakingen.

R̃. Tart Potass. Stib. gr. ij.

Pulv. rad. Ipec. gr. xx.

Sachar. alb. dr. i.

M. F. pulv. div. in vi. partes aeq.

D. S.

Ieder kwartier een poeder met water.

Volgens den ouderdom, het geslacht, de meerdere of mindere aandoenlijkheid en zwakheid der geesten, worden de opgegevene hoeveelheden vermeerderd of verminderd. Wanneer na het eerste braakmiddel de toevallen verminderen, de tong en huid vochtig, de smaak natuurlijk, de drukking en spanning, de oprispingen, enz. verminderen, maar zich, na verloop van eenigen tijd, weder verheffen, en de krachten des lijders het toelaten, kan men den tweeden, derden of vierden dag het braakmiddel nog een

een of twee malen herhalen. Later, dan den vierden dag, doen zij meer kwaad dan goed; alleen dringende omftandigheden kunnen dit alsdan gewaagd beftaan regtvaardigen. Waar geen buikloop of neiging daartoe aanwezig is, verdienen de braakmiddelen uit het Spiesglas den voorrang, boven den braakwortel, daar zij fchielijker en fterker ontlastingen te weeg brengen, en gelijktijdig, door op de huid te werken, de uitwafeming bevorderen. Waar reeds buikloop aanwezig is, of te vreezen ftaat, verdient de laaftte de voorkeur, daar hij denzelyen doet ophouden en de beftaande neiging vermindert.

Om het braken te bevorderen, late men eerst, wanneer het braakmiddel begint te werken, flappe thee, een aftreksel van Kamillen, Mentha of Melissen, in geene te groote hoeveelheid, nadrinken; te veel drinken bezwaart de maag, vermindert de werking van het braakmiddel, en heeft benaauwdheid en buikloop ten gevolge.

Laxeermiddelen komen in de rotkoortfen zelden te pas, wegens hunne meer verzwakkende werking, en de neiging tot uitpuftenden buikloop, die zij voortbrengen. Echter moet ons de vrees voor zwakte niet affchrikken, om ze te gebruiken, waar ophooping van bedorvene ftoffen in de darmbuis, bij verftopte buiksontlasting, opgespannen, pijnlijken buik met geraas van winden, hun gebruik en hunne nuttigheid aanwijzen. Zijn de krachten goed, dan geve men Manna, Tamarinde, Casfia, Wijnsteen, enz.

R_ç. *Fruct. Tamar.*

Mann. Calab. ʒa unc. i—ij.

Coq. per aliq. momenta c. f. q. aq. comm.

Colat. unc. x. *adde.*

Cremor. Tart. unc. ʒ—j.

D. S.

Om het uur een half kopje.

Hebben de krachten reeds veel geleden, zoodat men met reden hare verzwakkende werking te vreezen heeft, dan zijn lavementen uit water met azijn, afkookfels van Tamarinde en Casfia, bij herhaling gebezigd, en zoo lang volgehouden, totdat er ontlasting gevolgd is, op hunne plaats.

Door op deze wijze aan de eerste indicatie te voldoen, slaagt men somwijlen gelukkig genoeg, om de koorts in haren voortgang te stuiten en in haar eerste tijdperk te houden, zoodat zij zich binnen 8 of 12 dagen door eene kritische ontlasting beflist. De verlorene krachten worden door versterkende bittere geneesmiddelen, eene voedende diëet en versterkende dranken hersteld.

2^e *Aanwijzing.* Men onderhoude en ondersteune eene behoorlijke werkdadigheid der levenskrachten. Op de instandhouding der levenskrachten moet er in de behandeling der rotkoortsen voornamelijk gelet worden, daar haar hoofdkarakter zwakte en ontbinding is. In geene ziekte heeft de verzwakkende ontlastende geneeswijze, buiten noodzakelijkheid toegediend, meer kwaad gedaan en meer slagtoffers aan het menschdom gekost, dan in deze. Men ontlaste
niet

niet meer, dan er te ontlasten noodig is; vermijde onnoodige laxermiddelen, en late zich nimmer tot aderlatingen verleiden.

Waar de rotkoorts in hare eerste wording niet kan vernietigd worden, en in het tweede tijdperk getreden is, heeft zij doorgaans, de door besmetting voortgebragte altijd, een zeker tijdsverloop ter harer beslissing noodig, dat ook door de doelmatigste behandeling weinig of niet kan verkort worden. Door de krachten in stand te houden, stelt men de natuur in staat, om de ziekte te weêrstaan en de gezondheid te herstellen.

Reeds bij het voldoen aan de eerste indicatie, moet men derhalve de krachten in het oog houden, en zonder zich aan een tijdperk te binden, deze ondersteunen, waar het noodig is; onmiddellijk na de werking van het braakmiddel, of andere ontlastende middelen, en ook zonder dat deze voorafgegaan zijn, kunnen wijn, Kina, versterkende en opwekkende geneesmiddelen toegediend worden.

Men onderscheide, om zich daarna in de behandeling te regelen, of de zwakte met groote werkeloosheid en ongevoeligheid gepaard ga (*debilitas torpida*), of dat de lijder zeer prikkelbaar en aan doenlijk zij (*debilitas irritabilis*).

Men bezige bij voorkeur die middelen, welke door de ervaring bekend staan, dat zij de versterkende, prikkelende, koortsverdrijvende en ontbindingwerende eigenschappen met elkander vereenigen, en meermalen tegen deze koorts met voordeel gebruikt zijn, ten einde tevens, door aan de eene aanwijzing

te voldoen, ook aan de andere voldaan, en geene middelen toegediend worden, die op de eene zijde meer kwaad, dan op de andere goed doen.

Tot de meest vermogende geneesmiddelen behoorren de *Kina*, de *Serpentaria*, de *Valeriana*, de *Arnica*, de *Angelica*, wijn, wijngeest, verzoete zuren, *Moschus*, *Camphor* en *Castoreum*.

Tegen de gevoellooze zwakte is voornamelijk de *Kina* in groote giften, goede wijn, *Serpentaria*, *Valeriana*, *Moschus*, *Camphor*, warme baden, wasschingen met warmen azijn en prikkelende geestrijke vochten, inwrijvingen met vlugge, de huid sterk prikkelende smeersels, mostaardpappen, Spaansche vliegenpleisters, enz. aangewezen. Tegen de prikkelbare zwakte komen *Kina* in kleine giften, *Moschus*, *Castoreum*, *Digitalis purpurea*, de zure elixers van HALLER en MYNSIGHT, zelfs *Opium* en *Hyosciamus*, in kleine giften voorzigtig toegediend, koude wasschingen en stortbaden, te pasfe.

Onder al de middelen, die immer met voordeel tegen de rotkoorts gebezigd zijn, heeft de *Kina* de eerste plaats ingenomen, en zich steeds als het nuttigste en onontbeerlijkste staande gehouden. In alle tijdperken, en met zeer weinige uitzonderingen, is zij, in alle omstandigheden, in deze koorts aan te wenden.

Bij ophooping in de eerste wegen, die verzuimd zijn te ontlasten, bij zeer vollen en harden pols, bij plaatselijke ontstekingen, groote gevoeligheid van de maag, en gedurende de koortsverheffingen, vooral als deze eenige regelmatigheid in acht

nemen, en eindelijk in het allereerste begin der koorts, moet zij met omzigtigheid, en eerst als de bedorvene stoffen ontlast zijn, gegeven worden. Als het noodig is, de ontlastingen te bevorderen, maar de zwakte groot is, kan men ze, met ontlaste middelen vereenigd, toedienen.

R_o. Pulv. Cort. Per. g. unc. i—ij.

Coq. c. suf. q. aq. comm.

Colat. unc. xij.

adde

Pulp. Tamar. unc. i—iſſ.

M. D. S.

Om het uur een half kopje.

R_o. Pulv. Cort. Per. g. unc. iſſ.

Rad. rhei. 3 iſſ—ij. —

Coq. c. f. q. aq. comm.

Ut. F. decoct. col. unc. xij.

adde

Syr. rubid. unc. j.

M. D. S.

Om het uur een half kopje.

In de latere tijdperken der koorts, waarin de neiging tot smeltende ontlastingen groot is, komen zij niet meer te pas, en nimmer moeten zij langer, dan de omstandigheden volstrekt vorderen, volgehouden worden; daar zij anders ligtelijk een' de krachten spoedig uitputtenden buikloop veroorzaken. De *Kina*, alleen gegeven, verwekt somwijlen ook een' gevaarlijken buikloop, dien men zich ge-

dwongen vindt, door opwekkende en stoppende geneesmiddelen met de kina vereenigd, tegen te gaan.

Waar men de *Kina* alleen geeft, om te versterken en de koorts tegen te gaan, zonder oogmerk, om tevens ook aan andere aanwijzingen te voldoen, laat men ze, zonder bijvoegfels, in poeder, afkookfel, af- en uittrekfel gebruiken; in poeder toegediend, werkt de *Kina* het krachtdadigst; eene onse doet meer, dan twee in afkookfel. Waar de spijsverteringswerktuigen nog krachten genoeg hebben, om dezelve te verteren en te assimileren, geve men ze steeds in poeder; maar ook in eene genoegzame hoeveelheid; in het eerste begin der koorts, en in het tijdperk der genezing, wordt zij doorgaans, op de navolgende wijze toegediend, zonder hinder verdragen.

R ϕ . Pulv. Cort. P. opt. unc. j.

Aq. dest. Chammom. unc. xij.

Syr. cort. Aur. unc. j.

M. D. S.

Om de twee uren een half kopje, wel om te schudden.

Waar de koorts reeds tot eenen hooger trap geklommen is, en de spijsverteringswerktuigen zeer verzwakt en werkeloos zijn, wordt zij zelden, op deze wijze gegeven, verdragen, en men is genoodzaakt, om er kruiderijen en wijn, die de maag aangenaam prikkelen en opwekken, bij te voegen; maar ook dan moet de gebruikt wordende hoeveelheid

heid kleiner zijn; afkookfels verdienen hier de voorkeur.

R_ç. *Puly. Cort. per. opt. g. unc. i—ij.*
Coq. c. f. quant. aq. comm. ut f. decoct.
Colat. unc. xij.
adde
Aq. Cinnam. unc. ij.
Syr. cort. Aur. unc. j.
Liq. anod. m. H. 3 j.
M. D. S.

Om het uur een half kopje.

Wordt de *Kina* in het geheel niet verdragen, zoodat zij door walging, benaauwdheid, drukking in de maag en braken gevolgd wordt, zoo geven men de aftreksels of het extract, in verband met opwekkende en prikkelende hulpmiddelen; de *aqua Cinnamomi*, *Menthae piperitis*, goede oude wijn van twee tot vier onsen, behooren tot de meest verkieslijkste.

Bij gevoellooze zwakte verbindt men met het gebruik der *Kina*, dat van de *Serpentaria*, *Valeriana* of *Arnica* van drie tot zes drachmen, in het straks gegevene voorschrift afgetrokken. In de hoogere graden afwisselend met *Camphor*, *Castoreum* of *Moschus*, totdat de lijder meer opgewekt is, en de wederwerking met meer vlugheid en sterkte plaats heeft.

R_p. *Camphor.* ʒ i—ij.
Sachar. alb. ʒ iij.
M. F. pulv. div. in x part. aeq.
D. S.

Om de twee uren een poeder.

R_p. *Moschi opt.* ʒ ʒ—j.
Eleosachar. Menth. pip. ʒ ij.
M. F. pulv. div. in x part. aeq.
D. S.

Om de twee uren een poeder.

Zoo ras zich de pols verheft en het bewustzijn wederkeert, vermindert men met de vlugge opwekkende geneesmiddelen, of stelt ze geheel ter zijde, ten einde niet te veel gedaan en de lijder overprikkeld worde. Eene, als het ware daardoor aan de natuur afgedwongene kortstondige beterschap stort den lijder onherroepelijk in het verderf.

Bij prikkelbare zwakte, geve men het afkookfel der *Kina* alleen, zonder bijvoeging, noch gelijktijdig gebruik van sterk prikkelende geneesmiddelen, maar voege het zure elixer van HALLER, of den *spiritus Vitrioli* van 1 tot 3 drachmen daarbij. Deze zuren kunnen ook met water verdund tot drank, en bij afwisseling, toegediend worden.

Waar de pols zeer geprikkeld en schielijk is, de weinige nog overige krachten door eene al te groote levendigheid in de toevallen van het zenuwgestel uitgeput worden, is de *Digitalis purpurea*, ver-
 eenigd

eenigd met het zuur van HALLER, een uitmuntend geneesmiddel:

R_ç. Tinct. Digit. purp.

Elixer. acid. Hall. ā unc. β.

D. S.

Om de twee uren 10 tot 20 droppels met koud water.

Minder, dan het genoemde middel, heeft mij het *Opium* en de *Hyosciamus* voldaan; hunne nuttigheid schijnt zich alleen tot die gevallen te bepalen, waarin de lijdens zeer onrustig, de ijlhoofdigheid hevig en luidruchtig, aanhoudende braken en veelvuldige buiksonstastingen de krachten ondermijnen en uitputten. Met omzigtigheid toegediend, kunnen zij, in deze en soortgelijke omstandigheden, zeer veel tot de herstelling bijdragen.

R_ç. Ext. Opii aquos. gr. ij—iv.

Vel. Ext. Hyosc. gr. iv—viiij.

solve in

Aq. Melissae. unc. iv.

adde

Syr. Papav. alb. unc. j.

M. D. S.

Om de twee of drie uren een' lepel vol.

De toevallen, welke het gebruik van deze of andere *Narcotica* aanwezen, geweken zijnde, stelt men ze zonder tijdsverzuim ter zijde, daar een langer volgehouden gebruik niet zonder nadeelige gevolgen blijft.

In plaats van de *Kina* kunnen er ook andere geneesmiddelen, die de krachten ondersteunen, gegeven worden, vooral de zoodanige, welke een bitter, zamentrekkend en prikkelend beginsel hebben. De meest vermogende geneesmiddelen; de plaats der *Kina* vervangende, zijn: de *cortex Cascarillae*, *Saëcis albae*, *Querci*, en de *radix Tormentillae*. Bij gebrek van goede kina, en waar de zwakte niet zeer groot is, kunnen zij veilig in hare plaats gesteld worden. Nimmer echter verwachte men die uitmuntende uitwerkselen, welke alleen het deel der kina schijnen te zijn.

Naast de *Kina* bezitten wij in den wijn het krachtigste hulpmiddel, dat aan alle vereischten van deze *indicatie* voldoet; de zuurachtige en tevens geestrijke wijnen verdienen boven andere wijnsoorten de voorkeur. Waar zij verkrijgbaar zijn, bepale men zich tot goeden Madera, ouden Rhijnschen, Moezel-, en de beste soorten van Fransche wijnen.

De beste wijze om den wijn te geven, is denzelfden lepelsgewijze van uur tot uur, schielijker of zeldzamer, naarmate de lijder meer gevoelloos of opgewekt, of aan wijn gewoon is, en denzelfden verdragen kan; of men geeft dien met twee derde deelen water verdund, met suiker, tot gewonen drank; de uitgeperste sappen van citroenen en andere zure vruchten kunnen daarmede gemengd worden. Wanneer men van den wijn eenig nut wil hebben, moet dezelve in toereikende hoeveelheid en in geene te lange tusschentijden gegeven worden. Dikwijls heb
ik

ik gezien, hoe, vooral bij landlieden, uit vreeze voor eene al te sterke werking naar het hoofd, een' zeer ligten, rooden wijn bij vingerhoeden vol, tot de kwantiteit van eene halve of heele pint water gedaan werd, en waarvan de lijder nog maar zeer zeldzaam een weinig gebruiken mogt. Geneesheeren, die zoo handelen, verdienen hun geheel leven water en geen' wijn te drinken.

Bij gebrek van wijn, kan in dit gemis door goeden brandewijn met water en suiker, bij sterke drinkers door jenever en water, goed bier, dat veel koolzuur ontwikkelt en door andere gegiste geestrijke dranken voorzien worden. Het zoogenoemd bottelbier verdient wel de oplettendheid des Geneesheeren, daar het in de meeste gevallen van rotkoortsen eenen zeer doelmatigen drank oplevert. Met het beste gevolg heb ik mij daarvan bediend; vooral bij armen en behoeftigen, waar zoo dikwijls alle andere verkwikkende dranken ontbreken, verdient het eene algemeene aanbeveling. Bij sterk opgezwollenen buik en buikloop is het nadeelig.

Andere versterkende dranken, als: afkooksels van rijst, gerst, brood, sago, enz. met wijn, wijngeest, minerale en plantenzuren, kaneelwater, enz. tot gewonen drank gegeven, zijn zeer dienstige hulpmiddelen, om de krachten door voeding te ondersteunen.

Eijeren met water, melk, wijn of wijngeest, en kaneelwater tot eenen drank toe bereid, kunnen na den afloop der koorts, om de verlorene krachten te herstellen, doordien zij vele en ligt assimileerbare

voedingstof bevatten, zeer nuttig zijn; in het heetste der koorts, wanneer er, wegens de zwakte der spijsverteringswerktuigen, geene voedfels verdragen worden, komen zij, mijns bedunkens, even min als vleeschnat te pas.

Zeer verschillend is het oordeel der Geneesheeren over het gebruik der Spaansche vliegenpleisters, mostaardpappen en andere de huid prikkelende en blaartrekkende aanlegfels. Eenige willen daarvan, ter opwekking der kwijnende levenskrachten, de uitmuntendste werking gehad hebben; terwijl andere hun gebruik als schadelijk verwerpen, doordien zij dezelve, wegens het verlies van vochten, dat zij te weeg brengen, meer tot de verzwakkende dan opwekkende geneesmiddelen willen gebragt hebben. Zij gronden hunne hypothese voornamelijk daarop, dat het dikwijls gebeurt, dat de plaatsen, waar zij gelegen hebben, na eene zeer kortstondige ontsteking, tot versterking overgaan.

Volgens mijne ondervinding komen de genoemde prikkelende aanlegfels, mits dat zij geene blaren trekken en zweren veroorzaken, bij bewusteloosheid, ijlhoofdigheid, *congesties* naar het hoofd en andere aandoeningen, die een bijzonder lijden der hersenen aanwijzen, zeer te pas. Zij wekken de wederwerking op, en bedaren, als tegenwerkende prikkels, de vermeerderde opwekking van het hersengestel; door de opgewekte werkdadigheid in het huidstelsel wordt die in hersenen verzwakt en somwijlen geheel uitgedoofd.

De mostaard-pappen vervaardigt men uit zuurdeeg

deeg met gekneusd mostaardzaad, of gewonen mostaard; om ze nog prikkelender te maken, kan men er geraspten mierikswortel en azijn bijdoen.

Tot roodmakende pleisters bedient men zich van de gewone Spaansche vliegenpleisters, die men niet langer dan vier tot zes uren op eene plaats liggen laat, of zóó lang, dat zij door haren prikkel de huid roodgemaakt en den toevloed van vochten vermeerderd hebben, en dan telkens op eene andere aanlegt. Veiliger is het, dat men zich tot dat einde van pleisters bediene, zamengesteld uit de helft of een derde Spaansche vliegenzalf, en verder uit *Labdanon* of *Melilote*pleister, die dan zoo lang liggen blijven, totdat zij de bedoelde uitwerking voortbrengen; dan neemt men ze geheel weg, of legt ze op eene andere plaats. De roodgetrokkene plekken worden met compresen, in azijn, kamferbrandewijn, of het water van GOULARD bevochtigd, bedekt, om den overgang in versterking te verhoeden.

Gewoonlijk legt men de mostaardpappen aan de kuit en voetzolen; maar zij kunnen even goed, gelijk de blaartrekkende en roodmakende pleisters, ook op andere deelen gelegd worden. Men doet wél, ze bij afwisseling op den opperarm, voorarm, dijen en kuit te leggen. Op deze wijze gebruikt, zijn de huidprikkelers in vele gevallen onontbeerlijk, als blaartrekkende doorgaans schadelijk. Voornamelijk komen zij te pas in het eerste tijdperk der ziekte bij plaatselijke ontstekingen van inwendige deelen; waar de neiging tot ontbinding reeds groote

vorderingen gemaakt heeft, bloedvloeijingen en smeltende ontlastingen aanwezig zijn, zijn zij meeren-deels nadeelig. Wie er zich onder deze omstandigheden van bedient, verraaft zijne onkunde, en verdient de strengste berisping.

3^e *Aanwijzing.* „Men wende alle pogingen „aan, om de ontbinding en neiging tot rotting „der vaste en vloeibare deelen te verhoeden, tegen „te werken, en in haren voortgang te stuiten.”

De geneesmiddelen, welke hier verdienen genoemd te worden, zijn: de minerale zuren, de aluin, het *Kali Muriaticum oxygenatum*, de *Arnica*, en al die middelen, welke reeds ter voldoening aan de tweede *indicatie* aanprezen zijn. Door het tijdig aanwenden der middelen, bij de tweede indicatie opgeteld, worden die, welke wij hier noemen, dikwerf onnoodig, dewijl op deze wijze ook aan deze derde indicatie wordt voldaan. Waar de eerstgenoemde middelen niet toereikende waren, om den opgelosten staat der vochten, uit smeltende ontlastingen (*colliquationes*) en andere toevallen te kennen, voor te komen of in deszelfs voortgang te stuiten; of in zekere epidemische gesteldheden, welke men meestal door ervaring kent; vooral dan, wanneer de verhoogde stemming van het vaatstelsel, harde pols en plaatselijke ontstekingen het gebruik der *Kina* verbieden, of slechts in kleine hoeveelheden toelaten, zijn de minerale zuren de voornaamste, krachtigste en zekerste geneesmiddelen. In eene toereikende hoeveelheid gebruikt, rigten zij zeer veel uit tegen de koorts, en doen dikwijls

meer

alle andere. Men geeft ze met water of waterachtige dranken verdund tot gewonen drank, of voëgt ze bij de andere aangewezen geneesmiddelen, in mixturen, afkookfels, enz.

Sedert lang geeft men aan het Vitrioolzuur boven de andere mineralen zuren de voorkeur; veeljarige ervaringen kennen hetzelfde dezen rang als welverdiend toe. Men geeft gewoonlijk het verdunde vitrioolzuur, de zoogenoemde *spiritus Vitrioli*, van twee drachmen tot twee oncen in 24 uren, met water en suiker in zoodanige hoeveelheid gemengd, dat het voor den lijder een' aangenamen drank oplevert. Zijn de lijders tegen de zuren zeer gevoelig, zoodat de slik- en spijsverteringswerktuigen hierdoor aangedaan worden, zoo mengt men slijmachtige middelen daarbij, of geve ze in slijmachtige dranken:

R₂. Pulv. rad. saleb. 3 j.

Solve in aq. ferventer. Lbr. j.

adde

Spirit. vitriol. 3 ij—unc. ℥.

D. S.

Naar welgevallen te drinken.

R₂. Pulv. gumm. arab. unc. ℥.

solve

Aq. coct. unc. xvi.

adde

Spirit. Vitriol. 3 ij—unc. j.

Syr. Alth. q. s. ad. gratum saporem.

S.

Naar welgevallen te drinken.

In de plaats van het eenvoudige vitrioolzuur, kan het zuur van HALLER of MYNSIGHT gesteld worden, voornamelijk daar, waar de zwakte zeer groot en gevoelloos is, waar men tevens ook prikkelen en opwekken wil.

Naast het vitrioolzuur en deszelfs bereidingen verdient het zee-zoutzuur de eerste plaats, volgens eenige Geneesheeren zelfs den voorrang. Het wordt op dezelfde wijze en hoeveelheid als het vitrioolzuur gegeven.

Ook de andere minerale zuren kunnen gegeven worden, doch waar men met de genoemde niets uitvoert, zal het nog veel minder met de overige geschieden.

Vele Geneesheeren vallen, bij de behandeling der rotkoorts, in de steeds toenemende fout, om dagelijks, ja elk oogenblik, van geneesmiddelen te veranderen, en eindelijk aan het laatst gebruikte de volgende genezing alleen toe te schrijven. Wie eene rotkoorts doelmatig behandelen en van de zuren de verlangde uitwerking wil hebben, dient zich voor dit rond dwalen te wachten; de zuren voldoen aan de dringendste aanwijzing, mits dat zij aanhoudend en in genoegzame hoeveelheid gegeven worden.

De aluin verdient mede als een krachtig *antisepticum* onze aanprijzing; waar de minerale zuren aangewezen zijn, is het ook de aluin; deszelfs zeer zamentrekkende en de ontlastingen tegenwerkende kracht maakt denzelven bij alle uitputtende ontlastingen tot een onzer voornaamste hulpmiddelen. Waar de zuren wegens buikloop niet aan te wenden zijn, vervangt

vangt dezelve op de meest voldoende wijze hunne plaats.

Bij verstopte buiksonstlastingen, en nog aanwezige ophoopingingen in de eerste wegen, wordt het niet wel verdragen en behoort het nimmer gegeven te worden. Men kan den aluin in poeder, of opgelost in water, alleen of met andere gepaste middelen vereenigd, toedienen:

R₂. Alum. crudi. ʒ i—ij.

Puly. cort. Cinnam.

Sachar. alb. ā ʒ ij.

M. F. puly. div. in x part. aeq.

D. S.

Afwisfelend met kina of andere geneesmiddelen, om de twee uren een poeder.

R₂. Ext. cort. Peruv. opt. unc. ʒ.

Alum crud. ʒ j.

Aq. Cinnam. unc. viij.

Syr. cort. Aur. unc. j.

M. D. S.

Om het uur of de twee uren een' lepel vol.

De wortel en bloemen der *Arnica* zijn een der krachtigste geneesmiddelen tegen rotkoortsen, bij gevoellooze zwakte, slaapzucht, passieve of asthenische ontstekingen, neiging tot versterking, en waar zij reeds aanwezig is, en vooral bij fineltenden, rotachtigen buikloop, aangewezen. De wortel verdient boven de bloemen den voorrang; men kan beide met elkander vermengd toedienen, en men geve ze in poeder

of aftrekfel met andere middelen gelijktijdig , vooral met de kina , of alleen. Met een bij uitftek goed gevolg , in vele gevallen mijne verwachtingen verre overtreffende , heb ik mij van het aftrekfel der *Arnica* met het zee-zoutzuur bediend :

R_p. Rad. Arnic. 3 vi—unc. j.

Infunde in aq. ferv. lib. j. ℞.

Vafe claufò , refrigeratae collat.
adde

Acid. Muriatic. . ij.

Syr. simpl. unc. j. ℞.

D. S.

Om het uur twee lepels vol.

Menig eenen rotkoortslijder zag ik , gedurende het volgehoudene gebruik van dit middel , onder de ongunftigfte omftandigheden herftellen , zonder dat kina , wijn en andere middelen gebruikt werden , of te verkrijgen waren.

Met het *Kali Muriaticum oxygenatum* zijn nog te weinige proefnemingen in de fchriften der Geneesheeren opgeteekend , en hoe langer hoe trager wordende in het beproeven van nieuwe geneesmiddelen , kan ik , uit eigene ervaring , zijne nuttigheid of krachteloosheid in deze koorts niet beoordeelen. In wanhopige gevallen , waar reeds andere en de krachtigfte middelen zonder uitwerking gebruikt zijn , ftaat het den Geneesheer allezins vrij , tot redding van zijnen lijder , ook dit middel te beproeven. Het wordt van twee tot vijf greinen , om het uur , of om de twee uren , gegeven.

De

De gedistilleerde of goede wijnazijn bestaat mede eene plaats onder de meest vermogende, de ontbinding werende hulpmiddelen; waar de minerale zuren en de aluin aangewezen zijn, is dezelve veilig te gebruiken; maar minder werkzaam zijnde dan de eerste, bezige men dien alleen daar, waar de aanwijzingen voor zuren minder dringende zijn, bij zeer gevoelige lijdens, die andere zuren niet verdragen en bij kinderen. Half water en half azijn met suiker verzoet, als gewone drank gegeven, is de meest geschiktste en voor vele lijdens zeer aangename vorm, waarin dezelve in eene genoegzame hoeveelheid kan gegeven worden. Tot lavementen is de azijn mede zeer geschikt, en heeft in dat opzigt zijne deugdelijkheid in onderscheidene epidemiën genoegzaam gestaafd. Tegen rotachtige, zeer stinkende buiksontlastingen, die door bedorvene stoffen in de darmbuis voortgebracht en onderhouden worden, waar de zwakte geene ontlastmiddelen toelaat, en reeds eene neiging tot *colliquationes* bestaat, bezitten wij geen middel, dat zoo spoedig en krachtig de ontlasting der bedorvene stoffen bevordert, de rotting tegengaat en door deszelfs prikkelend vermogen de werkdadigheid in de darmbuis opbeurt, dan den azijn.

Drie of vier malen des daags kunnen er, bij dringende omstandigheden, om de twee uren zes onsen kouden azijn als lavement ingespoten worden; wanneer de lijder zeer gevoelig voor den indruk der koude is, kunnen zij warm; waar de darmbuis

zeer prikkelbaar en de lijder over een pijnlijk gevoel klaagt, met water verdund, gebezigd worden.

4^e. *Aanwijzing*. Men bevordere en ondersteune de voorkomende kritische ontlastingen. Hoezeer de kritische ontlastingen in de rotkoortsen zeldzaam voorkomen, zijn zij toch niet geheel te ontkennen; zweet, buikloop en braken brengen somwijlen eene gunstige beslissing te weeg. De moeilijkheid, die er in gelegen is, in deze koortsen de kritische ontlastingen van de *colliquative* te onderscheiden, is buiten twijfel mede eene der redenen, waarom dezelve zoo zelden waargenomen en zoo dikwijls betwist zijn. Ligtelijk gaat eene in den beginne wezenlijk kritische ontlasting in eene *colliquative* over, vooral wanneer de vochten zeer dun en opgelost, en de ontlastingen ontijdig en te zeer bevorderd worden.

Matige, door de natuur bewerkte ontlastingen, waarmede de toevallen verminderen, moet men niet onderdrukken, liever niets doen, de gencesmiddelen eenige uren ter zijde stellen, en den gang der natuur naauwkeurig gadeslaan.

Waar, in de meer gevorderde tijdperken der koorts, de brandend heete en drooge huid eenige vochtigheid te kennen geeft, de pols minder schielijk, zich eenigzins verheffende, de tong zich minder hard en uitgedroogd voordoet, kan men, met tamelijke zekerheid, tot een voordeelig kritisch zweet besluiten. Alsdan houde men den lijder eenigermate warmer dan te voren, en bevordere door vlierthee en *spiritus Mindereri* de werking der huidvaten; intus-
schen

fchen moeten de opwekkende en antifeptifche geneesmiddelen voortgebruikt worden, ten ware de gefteeldheid der krachten en overige toevallen het veroorloofden, dezelve voor eenigen tijd ter zijde te fteflen.

Als bij de voortteeken en van eenen kritifchen buikloop de buiksontlasting verftopt of zeer traag is, bevordere men dezelve door lavementen, waartoe de bovengenoemde uit azijn de meest gefchikte opleveren. Het inwendig gebruik der ontlastende geneesmiddelen, ook wanneer zij met de kina verbonden worden, blijft in de hoogere graden der rotkoorts fteeds twijfelachtig, gevaarlijk en onzeker, en is nimmer, ook bij de grootfte omzigtigheid, aan te raden. De verplaatfingen (*metastases*) komen menigvuldiger dan de kritifche ontlastingen voor; de oor-, okfel- en liesklieren zijn voornamelijk de plaatfen, waartoe zij zich bepalen; in het aangezicht en aan den hals komen zij fomwijlen, aan andere uitwendige deelen hoogst zeldzaam voor. Wanneer derhalve, in den loop der rotkoorts, de eene of andere dezer klieren opzwellt en zich ontfteekt, wende men geene teruggdrijvende en verdelende plaatfelijke middelen uitwendig op dezelve aan, maar bevordere men de veröttering door prikkelende pappen en pleisters. Van eene fpoedige etterwording hangt het leven en de genezing af; waar zij verdwijnt, volgt de dood zeer fpoedig. Zoo ras eenige teeken en de aanwezigheid van etter te kennen geven, hoe gering zij ook mogen zijn, moet dezelve terftond door een bijtmiddel, of het

lancet ontlast, en de verëtering door middelen, die de heilkunst aan de hand geeft, bevorderd, en tot aan de herstelling des lijders onderhouden worden. Het verlies van vochten, daarbij noodwendig plaats hebbende, maakt het gebruik der opwekkende en versterkende geneesmiddelen in grootere hoeveelheden, en bij wedergekeerden eetlust eene voedende diëet noodig.

5°. *Aanwijzing*. Deze bestaat in de doelmatige behandeling der bijzondere, gevaar dreigende toevallen, volgens hunne geaardheid, de algemeene gesteldheid des lijders en de daarbij voornamelijk lijdende deelen.

1°. *Ijflhoofdigheid en andere zenuwtoevallen* zijn in de rotkoorts zeer gewone verschijnselen, en behooren meer, door aan de algemeene aanwijzingen te voldoen, dan door eene symptomatiscbe behandeling (*cura symptomatica, palliativa*), bestreden te worden. In die gevallen echter, waar zij zeer hevig zijn, met de andere toevallen in geene evenredigheid staan, en meer voor bijkomende toevallen, dan noodwendige gevolgen van de koorts en hare hevigheid te beschouwen zijn, verdienen zij de oplettendheid des Geneesheeren, en vorderen eene daaraan geëvenredigde behandeling. Hunne naaste oorzaak schijnt in het hersen- en zenuwgestel zelve gegrond te zijn; de behandeling is zuiver empirisch, voor zoo verre wij dezelve uit geene bekende oorzaken kunnen afleiden. Roodmakende en prikkelende aanlegfels aan de kuit en voeten, warme halsbaden, koude omflagen

op

op het hoofd, het begieten met koud water, de *Camphor*, de *Castoreum*, *Moschus* en *Opium* in grootere giften, dan wij dezelve bij de vroegere aanwijzingen opgegeven hebben, zijn de middelen, waarvan men het meeste te verwachten heeft. Er zijn Geneesheeren, die deze toevallen voor de gevolgen eener herfenontsteking houden, en derhalve, tot derzelver bestrijding, de antiphlogistifche geneeswijze en zelfs aderlatingen aanraden. Bij een jong, robust, sterk man, liet ik mij eenmaal door de zeer hevige ijlhoofdigheid in het eerste begin der rotkoorts tot eene aderlating van zes onsen verleiden; de ijlhoofdigheid bedaarde wel oogenblikkelijk, de lijder werd rustiger, maar ten uiterste verzwakt; de krachtigste, versterkende en opwekkende geneesmiddelen, in groote giften, waren dringend aangewezen. Met moeite en zeer langzaam werd hij hersteld. Waar eene ontstekingsachtige gesteldheid aanwezig, en bloedontlastingen dringend aangewezen zijn, verdienen de bloedzuigers, tot vier of zes stuks achter de ooren, aan de slapen van het hoofd, of in den nek gelegd, de voorkeur boven de aderlatingen; zij ontlasten het bloed langzamer en verzwakken daardoor minder. Steeds houde men echter in het oog, dat bloedontlastingen in de rotkoorts zeldzaam aangewezen, en doorgaans hoogst gevaarlijk zijn.

Ophooping en overblijffels van bedorvene rotachtige stoffen in de eerste wegen kunnen,

door derzelver fterke prikkelende werking op deze met vele zenuwen bedeelde werktuigen, deze toevallen, door eene antagonistifche of confenfueele werking op het herfengeftel, veroorzaken; het is echter verre om te vooronderftellen, dat dit altoos het geval zijn zoude. Waar men met eenige zekerheid zoodanige ftoffen vooronderftellen kan aanwezig te zijn, worden zij langs den kortften en veiligften weg, door braak en- laxeermiddelen of laven- menten, ontlast. Wat reeds hiervoren over het gebruik der ontlastmiddelen gezegd is, behoort daarbij in acht genomen te worden. Vooral wachte men zich, uit enkele gevallen algemeene refultaten te trekken en overal kwade ftoffen te zien; fteeds bedenkende, dat in de hoogere graden der koorts derzelver beftaan meer herfenfchimmig, dan wezenlijk is, en ontijdige ontlastingen het leven in gevaar brengen.

- 2°. *Plaatselijke ontstekingen.* Dat deze in de herfenen, de ingewanden van den buik en de borstholte bij rotkoortfen kunnen plaats hebben, bewijzen de openingen der lijken van aan deze koorts overledene lijdens; voor zoo verre, namelijk, als niet betwift kan worden, dat er bij verftervingen fteeds eene ontsteking voorafgaat. Maar of deze ontstekingen wezenlijk fthenifch zijn kunnen, en als zoodanig antiphlogiftifch te behandelen zijn, of dat zij fteeds tot de roosachtige afthenifche behooren, en de prikkelende verfterkende behandeling vorderen, blijft

blijft voor als nog eenè twistvraag, die men dan eens toestemmend, dan eens ontkennend beantwoord vindt.

In de rotkoorts, door besmetting ontstaan, kan bij jonge, sterke, volbloedige personen, in de eerste tijdperken, volgens de geschiedenis der onderscheidene pestziekten, der gele koorts en eenige epidemiën der legerpest, vooral van die, welke voor weinige jaren zoo algemeen en verwoestend geheerscht heeft, zekerlijk zulk eene ontstekingsachtige gesteldheid plaats hebben, die aderlatingen, bloedzuigers en bloedige koppen noodig maakt. De nuttigheid dezer middelen blijft intusschen genoegzaam alleen tot de eerste tijdperken der koorts bepaald. In de meer gevorderde zijn zij, gelijk in alle andere soorten van deze ziekte, nadeelig.

De hoeveelheid bloeds, die op ééns ontlast wordt, moet niet groot zijn; men doet beter dezelve te herhalen, wanneer de toevallen, welke zij eerst verligt hebben, zich weder verheffen, dan te veel op ééns af te tappen. De aderlating behoort in het bijzijn des Geneesheeren te geschieden, terwijl deze den pols onderzoekend gadeslaat. Wordt de pols spoedig klein en zwak, onder den voelenden vinger wegzinkend, dan moet de opening terstond gesloten en alle verdere bloedontlastingen vermeden worden. Gevoelt zich de lijder na de lating verligt, wordt de belemmerde ademhaling vrijer, en ver-

verheft zich de pols, dan kan er eene grootere hoeveelheid afgetapt worden.

De toevallen, welke in deze koorts de herfenontsteking aanwijzen, zijn: woedende hoofdpijn, raaskallende ijlhoofdigheid, wilde, vurig ontstokene oogen. Nevens de aangewezen bloedontlastingen komen koude omslagen op het hoofd, warme voet- en halsbaden, mostaardpappen en roodmakende pleisters aan de kuit en voeten te pas. Wanneer deze toevallen eerst in de hoogere graden der koorts plaats grijpen, de krachten reeds veel geleden hebben, de opgeloste en ontbondene gesteldheid der vochten zich door colliquativische ontlastingen openbaart; zijn inwrijvingen met geest van *Sal-Amoniac*, Spaansche vliegen-*tinctur*, en andere prikkelende middelen op het kaalgeschorren hoofd, omslagen met warmen wijn, aftreksels van *Arnica* en *aromatike* kruiden, eene roodmakende pleister of eene mostaardpap over het geheele hoofd gelegd, meer dan de straks genoemde koude omslagen, aangewezen; terwijl men inwendig *Moschus*, *Castoreum*, *Opium* of *Hyosciamus* in een aftreksel van *Arnica*-bloemen laat gebruiken, zonder dat de andere aangewezen middelen geheel ter zijde gesteld worden.

Benaauwdheid, moeilijke ademhaling, plaatselijke pijn, bloedige fluimen, zijn de aanwijzenle toevallen van ontstekingachtige gesteldheden

den der borstingewanden. De behandeling moet op dezelfde beginselen steunen, en zoodanig ingerigt zijn, dat er voornamelijk op de lijdende deelen gewerkt wordt. Dezelfde plaatselijke middelen, die in de hersenontsteking op het hoofd aangewend worden, gebruikt men ook hier. Waar eene moeilijke, geruischmakende ademhaling, bezwaarlijk opbrengen der fluimen, angst en onrustigheid, groote zwakte der longen aanwijzen, zijn de *Camphor* met *Sulphur Auratum*, *Kermes*, aftreksels der *Senekawortel* en *Arnica* bloemen, Spiesglaswijn en geest van Hartschoorn onze krachtigste, meest vermogende middelen, die somwijlen nog, in schijnbaar hope-looze gevallen, den lijder redden kunnen.

R ϕ . *Camphor.* 3 ℥—j.

Sulphur. aur. gr. v—x.

Sachar Alb. 3 iij.

M. F. pulv. N. x. D. S.

Om de twee uren een poeder.

R ϕ . *Rad. Senekae.*

Flor. Arnicae ā 3 iij—vi.

Infunde Aq. Ferv. unc. xvi.

*In Vase Clauso, post Refrigerationem cola
et adde.*

Vin. Ant. Hux.

Liq. Corn. Cerv. ā 3 i—iij.

Syr. Diac. unc. j.

D. S.

Om het uur een half kopje.

He-

Hevig brandende en stekende pijnen in den buik, verstopte buiksonstasting, persingen zonder dat zich drekstoffen ontlasten, pijnlijke pislozing, roode, brandende *urine* geven ontstekingen in de buikholte te kennen. Ook hier is de behandeling dezelfde; naarmate de ontsteking sthenisch of asthenisch is, moet de behandeling gewijzigd worden. De inwendige middelen verbinde men met Arabische Gom of andere slijmachtige zelfstandigheden, om de plaatselijke inwerking der prikkelende geneesmiddelen te matigen. Verzachtende lavementen maken een gewigtig deel der behandeling, en zijn van groot nut, daar zij met de lijdende deelen in meer of minder onmiddellijke aanraking komen.

Het gebruik van *Calomel* of *Mercur. Dulcis* met *Opium*, dat door eenige, vooral Engelsche Geneesheeren zoo ruimschoots aanbevolen wordt, waag ik niet aan te raden, daar het mij toefchijnt, dat de kwikbereidingen, in eene ziekte, waarin alles eene opgeloste gesteldheid der vochten aanwijst, niet dan nadeelig zijn kunnen. Met geene ziekte heeft de rotkoorts meer overeenkomst, dan met de scheurbuik, aan de ouden zóó wel bekend, dat zij haar den naam van *Scorbutus Acutus* gegeven hebben: en wie twijfelt aan de nadeelige gevolgen, die het kwik in deze ziekte heeft?

- 3°. *Bloedyloeiingen*. Een gewoon verschijnsel bij rotkoortsen, dat de groote slapheid en werkeloos-

loosheid der vaten, de dunheid en opgelostheid des bloeds, aanwijst. Zij moeten doorgaans zoo spoedig mogelijk gestopt worden, daar het hoogst zeldzame gevallen zijn, waarin in deze koorts eene kritische bloedontlasting plaats heeft. Uitwendig legge men koude omslagen, uit water, wijn of wijngeest met aluin, afkookfels van de *Kina*, eikenbast, den *Tormentilla*-wortel of andere zamentrekkende zelfstandigheden, op het bloedende deel, en brenge ze door inspuiting, daarmede bevochtigd plukfel en compresfen, met de bloedende oppervlakte in onmiddellijke aanraking; inwendig geve men de minerale zuren in sterke giften, de *Tormentilla*, de *Catechu* en den aluin.

- 4°. *Smeltend toevallig zweet* (*Sudor Colliquativus*) moet onderdrukt, vooral niet bevorderd worden; men houde de lijders niet te warm, iets koeler dan te voren, en geve een sterk aftreksel van de Salie met Aluin, *Catechu*, het zuur van HALLER en de straks genoemde zamentrekkende geneesmiddelen, die de meest nuttige zijn; de vlugge, prikkelende stelle men alsdan ter zijde, de *Kina* en andere aanhoudende prikkelende middelen late men in ruime giften door gebruiken. Doorgaans is dit zweet een gevolg der overmatig gegevene vlugge, prikkelende middelen en te laat gebruikte *Kina*, weshalve deze laatste ook dikwijls alleen het doet ophouden, wanneer er met de eerste uitgescheiden wordt.

5°. *Uit-*

5^o. *Uitputtende, smeltende buikloop (Diarrhoea Colliquativa)*, in de latere tijdperken der koorts mede een zeer gewoon toeval, dat de krachten spoedig uitput en niet veel goeds voorspelt. Men trachte denzelven door *Opiata* en zamentrekkende middelen tot staan te brengen. Aftrekfels van de *Lopeziana* en *Columbowortel* zijn daartoe bijzonder geschikt:

℞. *Rad. Lopezian. S. Rad. Columbo* unc. ℥.
In Vase Clauso, Coque per aliq. momenta,
in. S. Quant. Aq. Comm. Colat. unc. viij.
adde
Aq. Cinnam. unc. ij.
Laud. liq. Vid. gutt. xxv.
D. S.

Om het uur een' of twee lepels vol.

Lavementen uit Salep, Arabische Gom, met Kamilbloemen en Opium, om de twee of drie uren ingespoten, zijn mede zeer nuttig. Over den onderbuik make men aromatische omflagen, inwrijvingen met *Linimentum Volatile*, ung. *Altheae* met *Camphor* en *Laud. liq. Sydenh.* waarvan ik meermalen de beste uitwerkfelen gezien heb.

Meteorismus. Het opzwellen van den buik geeft in alle koortsen, doch voornamelijk in de rotkoorts, het grootste gevaar te kennen. Velen houden denzelven voor een volstrekt doodelijk toeval. Als zulks met volstreckte buiksontlasting gepaard gaat, zijn lavementen met azijn, kool-

koolzuur, *Asfa foetida*, aftrekkels van *Arnica* en *Valeriana* op hunne plaats, of andere prikkelende middelen, die alle koud ingespoten worden. Koude omflagen over den buik, invrijvingen van geestrijke vochten, eene roodmakende pleister, die den geheelen buik bedekt, maar vooral het droppelsgewijze begieten met *aether*, ieder, of om de twee uren herhaald, heb ik, door veelvuldige waarnemingen, als de meest vermogendste tegen dit zoo bedenkelijk toeval leeren kennen.

7°. *Hevige pijnen*. Waar geene bekende oorzaken aanwezig zijn, die haar voortbrengen, zijn zij als een zenuwtoeval, dat in eene wijziging der sijne bewerktuiging dezer deelen, die eene verhoogde gevoeligheid ten gevolge heeft, gegrond is. Zelden zijn zij met groot gevaar verbonden, als de andere toevallen niets kwaads voorspellen. De ongerustheid en krachttuitputting, die zij aan den lijder veroorzaken, vereischen, dat zij weggenomen en zoo veel mogelijk tot bedaren gebragt worden. *Opium*, *Hyosciamus*, *Camphor*, *Castoreum* en *Asfa foetida*, zoo wel inwendig als in lavementen toegediend, voldoen aan deze aanwijzing.

8°. Wanneer de rotkoortsen tot eenen hoogen graad stijgen, is de moeilijke waterlozing een gewoon toeval. Eene krampachtige gesteldheid van den hals, der blaas en verlamming der afdrijvende spier schijnen hare oorzaken te zijn; mischien is ook de scherpte van de pis de oor-

zaak van deze kramp. Bij vele lijdens wordt dit toeval over het hoofd gezien, en niet genoeg acht gegeven, of de lijder wel behoorlijk pis ontlast. Het inwendig gebruik van krampstillende middelen, verbonden met de zoodanige, die de pisafscheiding bevorderen, krampstillende laven-
 menten, warme omslagen, inwrijvingen van *Linimentum volatile* met *laudanum* en Spaansche vliegen-tinctuur, zijn de gewone middelen, waarvan ik mij tegen dit lastige toeval niet zonder vrucht bediene, tot inwendig gebruik:

R_ç. Pulv. gum Arab. unc. ß.

Op. Depur. gr. ij.

Aq. Foenic. unc. vj.

Spirit. Nit. dulcis. 3 ij.

M. D. S.

Om het uur een' lepel vol.

Waar de gewenschte uitwerking, eene toereikende pisonstasting, niet volgt, de lijder sedert 24 uren geene pis ontlast heeft, en de blaas zeer opgezet is, moet de *Catheder* zonder tijdsverzuim geapliceerd worden, waarmede dagelijks twee malen tot zoo lang wordt volgehouden, dat zich de pis ongehinderd ontlast. Een ruim gebruik van verzachtende slijmachti-
 ge dranken, met ter zijde stelling van wijn en geestrijke vochten, zijn hiertoe mede bevorder-
 lijk.

9°. Het doorliggen (*Decubitus*) komt in geene koorts menigvuldiger voor, dan in deze; men
 be-

beschouwt het gewoonlijk voor toevallig, en tracht het op alle mogelijke wijzen te verhoeden, maar zelden met een gevolg, dat aan de bedoelingen beantwoordt; onder alle voorzorgen en gebruik van middelen om het af te weren, grijpt het plaats, en gaat in tijd van weinige uren tot versterking (*Decubitus Gangraenosus*) over, somwijlen met oogenblikkelijke vermindering der toevallen, waarna het tijdperk der genezing spoedig volgt.

In die gevallen derhalve, waar eene behoorlijke reinheid in acht genomen wordt, de lijder eene goede legerstede met eene schapenvacht heeft, die iedere ongelijke drukking verhoedt, waschingen met brandewijn, het wondwater van *Theden*, *Aq. Goulardi* of *Camphorgeest*, van den rug en den omtrek van het heiligbeen, vlijtig aangewend zijn, waar dus, zonder uitwendige oorzaken, het doorliggen en zijn overgang in *gangraena* plaats grijpt, is hetzelfde, volgens de waarnemingen van vele Geneesheeren, waarmede de mijne volkomen overeenstemmen, voor kritisch te houden. Onder tegengestelde omstandigheden behoort het tot die toevallen, welke eenen ongunstigen uitgang voorspellen.

De behandeling is in beide gevallen dezelfde; door bederf werende pappen en omslagen tracht men den verderen voortgang der versterking te beletten, en de verëtering ter bespoediging der afscheiding van het doode te bevorderen. Eene

al te sterke verëtering moet, wegens de daarmede zich parende uitputting der krachten, in bedwang gehouden, en het doode afgescheiden zijnde, de genezing door opdroogende middelen bespoedigd worden.

Eene pap uit *Kina*, Wijnruit, *Arnica* met wijn, afkookfels van deze, of van den *Tormentillawortel*, witte wilgen- en eikenbast, het bestrijken met zee-zoutzuur, zijn ter voldoening aan de eerste aanwijzing bijzonder wel geschikt. *Balzamus Arcei*, *Styrax*, gemaakte inkervingen in het doode, waarop men *Kina*, *Arnica*, *Myrrhae* en *Camphor* strooit, of met wieken oplegt, voldoen aan de tweede. Aftreksels en afkookfels van de zamentrekkende middelen met aluin, rooden wijn, kalkwater, enz., houden de verëtering in bedwang, waar zij overmatig is, en bevorderen de genezing, die dan verder met loodmiddelen en droog plukfel voldongen wordt. Vette middelen en zalven zijn nadeelig, dikwijls de oorzaken van eene overmatige en langdurige verëtering, die eene slepende koorts onderhoudt, de krachten uitput, en den lijder niet zelden, nog na doorgestane koorts, in het graf sleept.

Verstervingen, die aan andere deelen voorkomen, zijn op dezelfde wijze te behandelen.

- 10°. *Doofheid en geelgekleurde huid*, die gewoonlijk tot in het tijdperk der genezing voortduren, vereischen zelden eene bijzondere behandeling, maar verdwijnen allengskens, naar mate de
- krach-

krachten zich herstellen. Tegen de doofheid kunnen intusfchen, vooral als zij zwaar is, vliegenpleisters achter de ooren, inspuitingen met zoete melk of amandelolie, en het dragen van watjes in de ooren, met een' droppel *Cajepatolie* bevochtigd, gebruikt worden; zelden blijven zij geheel zonder nut; kwade gevolgen heeft men er niet van te vreezen.

11°. *Het opzwellen der voeten* is een gevolg der overig geblevene zwakte; wasfchingen met jenever of andere geestrijke vochten, en een uitdrijvend verband kunnen daartegen aangewend worden; zelden echter zijn deze of andere hulpmiddelen volstrekt noodzakelijk, daar met de wederkeerende krachten ook deze zwellingen verdwijnen.

12°. *Sprouw (Aphthae)*. In het tijdperk der beginnende beterschap, in de rotkoorts, gelijk in vele andere, een zeer gewoon, niet gevaarlijk, maar voor den lijder zeer onaangenaam toeval, daar het slikken door belemmerd wordt, en de lijder buiten staat geraakt, om de noodige dranken en geneesmiddelen te gebruiken. Aan de *Borax* hebben wij een bijna onfeilbaar en tevens onschadelijk geneesmiddel der sprouw; gewoonlijk geeft men dezelve met rozehonig, op de onse een drachme, en laat daarmede, om het uur, met een penseel de geheele inwendige met sprouw bezette oppervlakte der mondholte bestrijken; waar zij zich tot in de keel en den flokdarm uitstrekt, dat wel meerendeels het ge-

val is, laat men van tijd tot tijd een eijerlepel-
tje van dit middel langzaam doorzwelgen. De
beterfchap volgt daarop gewoonlijk fpoedig, en
binnen weinige dagen is de fprouw geheel ver-
dwenen.

6e. *Aanwijzing. Behandeling der herftellenden.*

Het tijdperk der genezing is doorgaans langdurig,
de krachten keeren allengskens terug, Kina en an-
dere verfterkende geneesmiddelen zijn nog eenen ge-
ruimen tijd noodig. De flapeloosheid en pijnen in
de gewrichten, die den lijdens gewoonlijk lang bij-
blijven, wijken op het gebruik van eenige giften
Opium van eene heele of halve grein, des avonds
gegeven. De leefregel is de voedend verfterkende,
aan de fpijsverterende krachten geëvenredigd, be-
ftaande in krachtig vleeschnat en foepen met ci-
troen, vleesch van jonge dieren, duiven, hoenders,
kalfsvleesch, wortelgroenten, rijst met zure appels
of aalbesfenap. In het geheel is het goed, tot de
fpijze eenig zuur bij te voegen, mits dat het de
maag verdragen kan. Tot dranken zijn water met
wijn, limonade en goed uitgegist bier het mees-
te gefchikt. Koffij, thee en chocolade zijn min-
der doelmatig; intusfchen veroorlooft de gewoonte
des lijdens hieromtrent eenige toegevendheid.

Aanmerkingen. Het witte Vitriool en de *Phos-
phorus*, door eenige Geneesheeren zoo ruimschoots
aangeraden, zijn in de rotkoorts ten minfte zeer
twijfelachtige, zoo niet gevaarlijke hulpmiddelen;
vooral niet gefchikt voor jong beginnende kunst-
oefenaren, om daarmede proefnemingen te wagen.

Aan

Aan den meer in de praktijk ervarenen moge het vrijstaan, in gevallen, die hem daartoe geschikt toefschijnen, dezelve omzigtig toe te dienen, zoo lang er geene meer stellige en beslissende ervaringen bestaan, die over hare nuttigheid voldoende uitspraak gedaan hebben, en de gevallen duidelijk aanwijzen, waartegen zij te pas komen.

Het begieten met koud water, dat, sedert de laatste tien jaren, tot de modeartikels tegen de rotkoorts behoort, zoude ik genegen zijn, onder dezelfde rubriek met de straks genoemde geneesmiddelen te plaatsen, ware het niet, dat de meest verdienstelijke en als ervarene kunstoefenaars bekende Geneesheeren, in *Engeland* en *Duitschland*, volgens hunne verzekeringen door waarnemingen gestaafd, met het grootste nut gebezigd hadden. Zelfs heb ik mij, afgeschrikt door den ongunstigen uitslag, dien ik weet, dat zij, door anderen aangewend, gehad hebben, nimmer van bediend, ten minste niet op die wijze, als CURRIE voorschrijft. Wasfchingen met koud water en azijn, bij eene zeer drooge en heete huid, bij raaskallende ijlhoofdigheid en kleinen, snellen pols, heb ik dikwijls met voordeel gebezigd; zij verminderen de hette en verligten den toestand des lijders; maar dat men daarmede zoo veel tot de genezing zoude bijdragen, als anderen willen, blijft bij mij nog steeds eene zeer twijfelachtige zaak.

De begietingen zijn, volgens die Geneesheeren, welke er gebruik van gemaakt hebben, daar aange-
wezen, waar zich de lijder nog in het eerste tijd-

perk der koorts bevindt en de krachten nog goed zijn, bij zeer drooge en heete huid, kleinen, harden, gespannen, schielijken pols en raaskallende ijlhoofdigheid. Tegen aanwijzingen zijn: vergevorderde staat der koorts, groote zwakte, hoest en andere katarrhale aandoeningen der borst, vochtige huid, neiging tot zweet.

De uitwerking dezer begietingen bestaat hierin, dat zij de hette verminderen, de huid vochtig maken, den pols verheffen, de ijlhoofdigheid bedaren, en het gevoel opwekken.

Om ze aan te wenden, neemt men den lijder alvorens uit het bed, plaatst hem, naakt uitgekleed zijnde, om hem niet te vermoeijen, in eene zittende houding op een daartoe ingerigt bankje in eene groote ledige kuip, en stort nu spoedig achtereenvolgende twee of drie emmers ijskoud water over hem uit; dan neemt men hem weder uit de kuip, droogt en wrijft hem met warme doeken af, dat spoedig geschieden moet, en brengt hem in een matig verwarmd bed. Alles moet omzigtig, spoedig en zonder den lijder te vermoeijen in zijn werk gaan.

B. *Zenuwkoorts.*

(*Febris Nervosa, Typhus Nervosa.*)

Bepaling. Eene aanhoudende koorts met verminderde werkdadigheid, verhoogde prikkelbaarheid, groote tegenstrijdigheid in de toevallen, bijzonder lijden van het hersen- en zenuwgestel, door oorzaken voortgebracht,

bragt, die niet gemakkelijk waar te nemen zijn, noemt men eene zenuwkoorts.

Deze koorts heerscht in alle landstreken, in Karakter: alle jaargetijden, onder alle volksklassen, en ontziet noch ouderdom, noch geslacht. Sporadisch vindt men haar overal, waar de volksmenigte eenigzins aanmerkelijk is. Epidemisch, in tijden van oorlog en algemeene volksrampen, die de hartstogten gaande houden, de driften opwekken, hoop en vrees met elkander doen afwisselen, en eene voortdurende beangste gemoedsgesteldheid onderhouden; ligtelijk neemt zij alsdan eene besmettelijke gedaante aan, en heerscht *contagieus*; zij is aanhoudend, aflatend, of onduidelijk tusfchenpoozende. Hare verschijnselen en toevallen zijn zoo menigvuldig, als tegenstrijdig onder zich en met de voortbrengende oorzaken, dat het allermoeijelijkst, zoo niet ondoenlijk is, een beeld van haar te schetsen, hetwelk op al hare gedaanten, waarin zij zich vertoont, als op ieder afzonderlijk geval, kan toegepast worden.

De zenuwkoorts is steeds gevaarlijk, dan eens meer, dan minder, zonder dat er tusfchen de ziekteverschijnselen en het gevaar, dat zij insluit, eene zekere evenredigheid bestaat. Onder de ongunstige toevallen en verschijnselen wordt de eene herfteld, terwijl de andere onder de meest gunstige den geest geeft. Het zenuwgestel is bijzonder aangedaan, lijdt aan te groote gevoeligheid of onaandoenlijkheid; deszelfs verrigtingen zijn zonder regelmatigheid, en staan in eene eigenaardige tegenstrijdig-

heid tot elkander. Zij tast fchielijk en plotfeling, of zeer langzaam aan; de koorts ontwikkelt zich in een kort tijdsverloop, de toevallen zijn hevig, volgen fchielijk op elkander, wifelen dikwijls en menigwerf af. Het zenuwgeftel is zeer aandoenlijk, als een gevolg daarvan de wederwerking op geringe prikkels hevig; eene zekere haastigheid heerscht er in alle verrigtingen.

Of zij ontwikkelt zich langzaam, langdurige voorboden gaan vooraf, er heeft iets fleepends in haren geheelen loop plaats; het zenuwgeftel is onaandoenlijk; op fterke prikkels volgt geene of slechts zeer geringe wederwerking; werkeloosheid, traagheid en ftompheid is het heerschende karakter in alle verrigtingen; zij is langdurig, en beflist zich zeer langzaam.

Dit op ervaring gegrond onderscheid leidt tot eene, op de natuur dezer koorts gegronde verdeling, namelijk:

- 1°. De heete zenuwkoorts met opgewektheid (*Febris Nervosa Acuta, Versatilis, Typhus Nervosa cum Erethismo*).
- 2°. De fleepende zenuwkoorts met gevoelloosheid (*Febris Nervosa lenta, Stupida, Typhus Nervosa cum Torpore*).

Voorloopers.

Dagen en weken, voordat de pols eene koortsachtige gefteeldheid aanwijst, klaagt de lijder over een gevoel van algemeen kwalijk bevinden, dat hij dikwijls niet anders weet te kennen te geven, dan door te zeggen: *ik gevoel mij niet wel, maar weet niet wat mij fcheelt*. Onder voortdurend klagen, ge-

gevoelt hij zich zwak, moedeloos, ongeschikt voor bezigheden, treurig, ter nedergeflagen, beangst. De krachten nemen af, de geringste beweging vermoeit. Het valt hem moeilijk zamenhangend te denken, het ontbreekt aan denkbeelden, om eene zaak, en aan woorden, om zijne denkbeelden verstaanbaar uit te drukken, en aan anderen mede te deelen. Hij vergeet wat hij een oogenblik te voren gedaan heeft, of het volgende doen wil; de denkbeelden zijn verward en tegenstrijdig; men is gedachteloos, en weet dikwijls niet waar men zich bevindt. De lijder gevoelt doffe hoofdpijn, zijne zinsverrigtingen zijn onzeker en bedriegelijk, hij bespeurt verschijnselen voor de oogen, vreemde gezigten, suizen in de ooren, vreemde geluiden, alsof er in de verte klokken geluid werden, slaapzucht, of slapeloosheid, die met elkander afwisselen; de pols is klein en langzaam, de huid meer koud dan warm, de eetlust dan eens sterk en goed, dan weder in het geheel geen. De vroeger of later daarbij komende koorts heeft het toenemen dezer toevallen en volkomene ontwikkeling van het zenuwachtige karakter ten gevolge.

Bij de heete zenuwkoorts worden de voorboden geheel vermist, of duren slechts zeer kort, eenige uren, ten hoogste eenige dagen. Zij tast meer plotseling aan, de toevallen zijn reeds in het begin der koorts talrijk en hevig; vermoeidheid, zwaarte en pijn in de ledematen en lendenen; de lijder is lusteloos, droefgeestig, zeer opgewekt en spraakzaam, aandoenlijk; de hartstogten kunnen ligt gaande gemaakt worden; hij weent of lacht bij de geringste daartoe aanleiding gevende

Heete
zenuw-
koorts.
(*Febris
Nervosa
Versati-
lis*).

oor-

oorzaak, en ook wel zonder dat er eene aanwezig is; afwisselende koude en hette, de koude duurt kort, de hette is aanhoudende, de huid doorgaans droog, somwijlen vochtig, met ongelijkmatig zweet; later volgen ijlhoofdigheid, opspringen der pezen, kramp en stuiptrekkingen, hik, onrust, slapeloosheid, die met raaskallende ijlhoofdigheid afwisselt; tandenknarsen, mondklem, watervrees, sardonische lach, zenuwtoevallen van alle mogelijke soorten en geaardheid; de pols is gewoonlijk klein, hard, zeer snel, krampachtig, weinig tegenstand biedend aan den drukkenden vinger, zeer veranderlijk, in den beginne somtijds week en vol, later klein, zwak, bevend, tusfchenpoozend.

Verder neemt men waar, dat de spieren haren dienst weigeren, groote zwakte, ligging op den rug, onzekere en bevende bewegingen, flauwten bij iedere poging om zich op te rigten; verlamming der sluitspieren, onwillekeurige ontlastingen der drekstoffen en pis; moeilijk slikken, terugvloeiing der dranken uit den mond; bleek, ingevallen, ontfeld aangezigt, dofse of glinsterende oogen op een voorwerp gerigt; groote gevoeligheid der zinwerktuigen, al te fcherp gezigt en gehoor; fcherpe, helder klinkende, of heesche stem, plotseling en hevig schreeuwen, met krampachtige bewegingen; witte, drooge tong zonder dorst, of vochtige, met onleschbaren dorst, verlangen naar wijn en andere verkwikkende dranken, tegenzin in alle andere dranken en spijsen, walging, misfelijkheid, braken met ontlasting van weinig slijm en gal, drukking en spanning in de maagstreek en

en den onderbuik, buikloop, verstopte of ook wel natuurlijke buiksonstlasting; dunne, waterachtige, of dikke, troebele, gekleurde pis, moeilijke ontlasting van dezelve, vlekken (*petechiae*), gierst- en ander huiduitslag, komen in de latere tijdperken der koorts ten voorschijn.

De toevallen duren onafgebroken, zonder duidelijke tusschenpoozingen (*remissiones*), voort, nemen in aantal en belangrijkheid toe, vooral diegene, welke een gevolg van het lijden des hersen- en zenuwgestels zijn. Koud, kleverig zweet, benaauwde, moeilijke en reutelende ademhaling komen daarbij; na een' langeren of korteren duur maakt de dood een einde aan de ziekte en het leven des lijders, somwijlen sterven zij ook plotseling, zonder eenige voorafgegane doodelijke teekenen. Dikwijls heeft dit treurig einde reeds in de eerste dagen der koorts plaats, de meeste sterven tusschen den zesden en negenden dag; onder diegenen, welke den vijftienden dag overleven, zijn de sterfgevallen zelden. Doorgaans neemt de koorts na den vijftienden dag een' gunstigen keer, de genezing volgt spoedig of langzamer. Zij beslist zich gewoonlijk door zweet- en pisontlasting, zelden vinden er andere kritische ontlastingen plaats. De krachten keeren langzaam terug, vooral bij diegenen, welke voor de koorts hun ligchaam door eene buitensporige leefwijze uitgeput hebben.

In de lijken der overledenen vindt men somwijlen niets, dat de oorzaak der koorts kennelijk maakt. In de lijken van hen, die door besmetting ziek werden,

den, vindt men meerendeels eene koudvurige verëtering der herfenen en van hare bekleedfelen. Uit deze menigvuldige bewezene daadzaak hebben Geneesheeren het voorbarig befluit getrokken, dat de naaste oorzaak der heete zenuwkoorts eene ware ontsteking van dit ingewand zijn zoude, en waren ftout genoeg, om deze koorts antiphlogistisch en met aderlatingen te behandelen, doch in de gevolgen, voor zoo verre ik van anderen gehoord en gezien heb, hoogst ongelukkig voor het leven hunner lijders.

Sterende
zenuw-
koortfen.
(*Febris
Nervosa
Stupida.*)

Bij de fleepende zenuwkoorts vindt men langdurige voorloopers, die weken en maanden aan de volkomene ontwikkeling der koorts voorafgaan. Hypochondrifche, Hyfterifche, aan zenuwzwakte lijdende perfonen, zij, die door zelfbefmetting, wellust, zinnelijke vermaken, aanhoudend veel ftuderen, diepzinnig nadenken over bovenzinnelijke onderwerpen zich verzwakt en hun zenuwgeftel in wanorde gebragt hebben, en zij, die met onbe-teugelde verbeelding phantaferen, bij voorbeeld dichters, zijn hare gewone flagtoffers.

Bij natte en koude weërsgefteldheid, flecht voedsel, flechte kleeding, onzuivere, vochtige woning, heerscht zij fomwijlen epidemifch. In laag gelegene moerasfige landftreken endemifch.

Zwakte, werkeloosheid, gevoellooze traagheid in alle verrigtingen, onverschilligheid tegen zinnelijke indrukfels en zielsaandoeningen, zijn haar heerschend karakter.

De koorts begint gewoonlijk met afwiffelende hette en koude, de lijder houdt zich nog eenige dagen
fle-

slappende en met moeite op de been, is zeer neêrslagtig en voorfpelt zich een' gewisfen dood. De eetlust ontbreekt, de tong en de mond zijn droog en slijmachtig, misfelijkheid, neiging tot braken en brakingen met ontlastingen van veel slijm en gal. De pols is klein, zwak, traag, zeer veranderlijk, fomwijlen natuurlijk, zelfs fchijnbaar vol en hard, in den verderen loop der koorts wordt hij tusfchenpoozende en bevend.

De huid is voor het gevoel natuurlijk warm, uitgezonderd in het aangezigt, handpalmen en voet-zolen, waar zij gewoonlijk in den beginne afwisselend, naderhand aanhoudend brandend heet is; de lijder klaagt intusfchen over een gevoel van brandende hette, of zware koude; of hette in het eene en koude in het andere deel. De zwakte neemt fteeds toe, de handen beven, de willekeurige bewegingen worden onzeker, of houden geheel op aan den wil onderworpen te zijn; eenige fpieren bewegen zich onophoudelijk, andere zijn bewegingloos, ftijf en gespannen, men ontwaart opspringen der pezen.

Het aangezigt is bleek, ingevallen, de oogen staan hol, verftoord, ftrak en flauw en zijn half gefloten. De lijders worden fteeds onverschilliger, befennen de grootheid der ziekte en het gevaar van hunnen toefland niet meer, zijn flAAPZUCHTIG, worden door droomen ontrust, fchrikken in den flAAP, ijlen, ftijl, onverftaanbaar voor zich heen preuvelende, alle mogelijke zenuwtoevallen komen daarbij, verlammingen van enkele ledematen, diepe flAAPZUCHT,

zucht, waaruit de lijders niet kunnen opgewekt worden, de ademhaling wordt moeilijk en snorkend, koude handen en voeten, in het aangezicht en op de borst breekt een sterk klam zweet uit, de mond is krampachtig gesloten, eindelijk volgt de dood onder stuiptrekkingen, of appoplectisch.

In den loop der koorts ondergaan de ontlastingen veelvuldige veranderingen, in den beginne zweet de lijder dikwijls en veel, terwijl de toevallen steeds vermeederen en verslimmeren; later wordt de huid droog en dor, afwisselend brandend heet en koud. Kort voor den dood breekt een ongelijkmatig en overvloedig zweet uit, op enkele deelen.

De tong, die in den beginne zuiver of met een witachtig slijm bedekt is, wordt naderhand droog, somwijlen rood als een stuk raauw vleesch; hare bewegingen zijn onzeker en bevende; met moeite is er de lijder toe te brengen dezelve uit te steken, en uitgestoken zijnde vergeet hij dezelve terug te trekken; de neusgaten, lippen en tanden zijn droog en met schubben bedekt.

Bij den aanvang der koorts is de dorst gewoonlijk hevig, met begeerte naar wijn, bier en koud water. Later bij droogen mond geen dorst; met moeite zijn de lijders te bewegen om te drinken, en hebben een' onverwinbaren afkeer tegen alle dranken.

De verrigtingen der zinswerktuigen wijken van hare natuurlijke gesteldheid veelvuldig af, zijn onderdrukt, of verschillende gewijzigd.

De ademhaling is zelden natuurlijk, geschiedt
zuch-

zuchtend en steunend, is moeilijk, benaauwt zeer schiedlijk, is ongelijkmatig, buiten evenredigheid met den pols.

De buiksonstasting is niet zelden traag en verstoort, bij zeer drooge huid, buikloop; de ontlastingen zijn onwillekeurig, de drekstoffen zeer stinkend, de buik zwelt op.

De pis is zich zeer ongelijk, dan eens dun en waterachtig, dan rood, bruin, dik met een schubachtig zetsel, somwijlen met een wolkje, dat in het midden hangen blijft. Hare ontlasting is dikwijls moeilijk, pijnlijk, bij vele in de hoogere trappen der koorts geheel opgestopt; de blaas zwelt op en stijgt in de hoogte, of zij vloeit onwetende af.

Des avonds verslimmeren de toevallen, dan eens met meer, dan weder met minder regelmatigheid; somtijds hebben deze verheffingen om den anderen dag plaats.

Bij eenige botten vlekken en petechiën uit, die tegen het einde der koorts wankleurig en zwart worden; versterkingen van enkele deelen en ledematen, ruime bloedontlastingen van een dun opgelost bloed, door gewone en buitengewone wegen, komen daarbij, en wijzen de reeds aanwezige complicatie met het rotachtige karakter aan.

Zelden beëindigt zich deze koorts voor den een en twintigsten dag, meerendeels eerst na vier of meer weken, wanneer de lijders hersteld worden. Zelden beëindigt zij zich door regelmatige kritische ontlastingen op ééns, gewoonlijk allengskens door zweet en pis, met langzame vermindering der toevallen. De huid en tong worden vochtig, de eerste is gelijk-

matig warm, de laatste wordt aan de punt en op de randen zuiver. De zinsverrigtingen keeren tot hare natuurlijke gesteldheid terug; de doofheid alleen houdt nog eenigen tijd aan. De pols wordt week, gelijkmatig, verheft zich en neemt in sterkte toe. De ademhaling en het bewustzijn worden natuurlijk, de slaap rustig, en de lijder gevoelt zich bij het ontwaken verkwikt; zijne droëvige gemoedsgesteldheid verandert in eene door hoop bezielde tevredenheid en opgebeurdheid. De afschuw tegen spijs en drank verwisfelt in gragen eetlust, en de krachten herstellen zich.

Oorza-
ken.

Alle op het menschelijk ligchaam verzwakkende, en voornamelijk de zenuwen aandoende inwerkingen, kunnen, als haar schadelijke invloed eenigen tijd aanhoudt, eene zenuwkoorts voortbrengen. Hieronder behooren:

- 1°. Slechte, bedorvene, ongezonde voedfels en dranken, vooral slecht brood, mangel aan versch vleesch en andere versche spijsen, gebrek aan wijn en brandewijn, vooral bij personen aan betere omstandigheden gewend; in oorlogstijden, hongersnood, duurte, in belegerde plaatsen, enz., heerschen zij gewoonlijk.
- 2°. Groote lichamelijke vermoeijensissen, lang volgehoudene sterke bewegingen, groote voetreizen, zware marschen, aanhoudend waken, bij gebrek en slecht voedsel.
- 3°. Vochtige, lage, ongezonde woningen, die tegen de weersveranderingen geene toereikende bescherming verschaffen, en niet verwarmd kunnen

nen worden, met gebrek aan de noodige kleding, ligging en dekfel.

- 4°. Overmatige ontlastingen, die de voeding belemmeren en de krachten uitputten, als: misbruik van ontlastende geneesmiddelen, buikloop, bloeden en slijmvloeijingen, sterk etterende zweren, maar bovenal, dikwijls herhaalde zaadontlastingen, door bijslaap en zelfbesmetting. Wegens de sterk opgewekte verbeelding is de zelfbesmetting nadeeliger dan de bijslaap.
- 5°. Voorafgegane ziekten, overig geblevene zwakte en consensuëele aandoeningen des zenuwgestels.
- 6°. Ziels- en gemoedsaandoeningen, neêrslaande hartstogten, voortdurende angst, vrees, kommer en zorgen, verijdelde hoop, ongelukkige liefde, beleedigingen, ontgane eerbewijzingen, teleurstellingen van alle mogelijke soorten, aanhoudend diepzinnig nadenken en peinzen.
- 7°. Lage, vochtige, moerasige landstreken en woonplaatsen, heete, vochtige zomers, met zuideren westelijke winden, diepe dalen, of met bosschen omgevene plaatsen, vooral tegen het noorden en het oosten, waardoor de lucht niet kan bewogen noch ververscht worden, de schadelijke uitwasemingen hangen blijven en de geheele dampkring van zoodanig eenen oord bederft. Een in den dampkring aanwezig *miasma*, dat de zenuwkoortsen epidemisch voortbrengt, en waar het heerscht, aan alle koortsen en ziekten het zenuwachtige karakter mededeelt.

8°. Eene eigenaardige smetstof (*Contagium sui generis*), die door besmetting de zenuwkoorts voortplant; voorafgegane epidemiën door algemeen werkende schadelijkheden voortgebracht, vele in beperkte ruimten bij een zijnde opgehoopte menschen, vooral van zieken, in hospitalen, gevangenissen, schepen en militaire verblijfplaatsen, versche manschappen uit afgelegene landschappen, ingedeeld onder hen, welke aan deze verblijven gewoon zijn, aankomende rekruten, enz.

Naaste
oorzaak.
(*Causa
proxima*)

Eene niet wel te bepalen verandering in de werktuiging der zenuwen, waardoor hare verrigtingen veranderd en bijzonder gewijzigd worden, is de naaste oorzaak der zenuwkoorts; maar, of deze plaats hebbende verandering gelegen zij in eene veranderde stemming der prikkelbaarheid en aandoenlijkheid der gevoelige vezels, of in eene materiële verandering der samenstellende deelen, is hier de plaats niet te onderzoeken.

De vooronderstelling eener vermeerderde of verminderde afscheiding der zenuw-vloeistof, die als prikkel op de geheele bewerktuiging moet inwerken, om hare verrigtingen in stand te houden; eene gelijktijdig veranderde gesteldheid in het vermogen der zenuwen, om deze vloeistof te geleiden en naar evenredigheid te verdeelen, schijnt mij, voor als nog, het meest geschikt te zijn, om de naaste oorzaak dezer koortsen te verklaren.

Complicatiën der
zenuw-
koortsen.

Dikwijls gaat dezelve met eene ontstekingsachtige, rotachtige, of gastrische gesteldheid gepaard. Eene
zui-

zuivere ontstekingskoorts kan zekerlijk nimmer, gelijktijdig, naast en met eene zenuwkoorts bestaan, daar zich de toestanden van beide ziektevormen te zeer tegengesteld zijn; minder zeldzaam zijn de gevallen, waarin plaatselijke ontstekingen, met vermeerderde werkdadigheid in het vaatstelsel van het eene of andere deel, met de zenuwkoortsen verbonden en gelijktijdig aanwezig zijn. Meerendeels echter zijn deze ontstekingen, in deze gevallen, van eene kwaadaardige gesteldheid, roosachtig en geene zuivere ontstekingen.

Bij jonge, volbloedige, anders gezonde personen, die de zenuwkoorts door besmetting gekregen hebben, kan er, in haar begin, eene wezenlijke ontstekingsachtige *complicatie* plaats vinden; de plaatselijke ontstekingsgevallen zijn dan hevig, gaan met volbloedigheid, harden en vollen pols gepaard; gewoonlijk bepaalt zich deze ontstekingsstoestand alleen tot het eerste tijdperk der koorts, en vereischt eene *antiphlogistische* behandeling; na verloop van weinig tijds verdwijnt zij geheel, en iedere verzwakkende geneeswijze wordt schadelijk.

Voor vijftien jaren hield men het voor de grootste dwaasheid, bij zenuwkoortsen eene ontstekingsachtige gesteldheid aan te nemen; sedert eenige jaren is men tot de tegengestelde fout vervallen: vele Geneesheeren willen niets zien dan hersenontsteking, waar zich zenuwtoevallen met ijshoofdigheid paren. Tot eene waarschuwing late ik hier volgen, wat de beroemde J. P. FRANK, voor ruim vijf en twintig jaren, schreef, en dat misschien nog nooit

meer, dan tegenwoordig, toepasfelijk geweest is.
 „ Men late zich nimmer door hevige ijlhoofdigheid,
 „ die men ginds en weder waarneemt, en zware
 „ hoofdpijn verleiden, om deze koorts voor eene
 „ verborgene herfenontfteking te houden: men kan
 „ zich hier zeer ligt bedriegen, gelijk ook met de
 „ *Paraphrenitis Typhodes*, *Epiala*, *Asfodes* der Ou-
 „ den, die genoegzaam altijd tot de zenuw- en
 „ kwaadaardige koortfen behooren, en fomwijlen
 „ met ontftekingen der buiksingewanden gepaard
 „ gaan.”

De gastrifche *complicatie* is de meest gewone in deze koorts, daar de voorafgegame zwakte der fpijsverteringswerktnigen en de toevallige oorzaken der koorts zelve daartoe zoo veelvuldige gelegenheid geven. Voor de gencefkundige behandeling is zulks gewigtig, en vordert, dat men er zich in den beginne naar regele; maar men wachte zich, om overal gastrifche toevallen te zien, en dat, wat een gevolg der zenuwaandoeningen van de buiksingewanden is, aan ophoopingcn van bedorvene ftoffen toe te fchrijven. De ervaring heeft geleerd, hoe veelmalen te dezen aanzien gedwaald, en hoe groot kwaad daardoor gefchied is.

Rot- en zenuwkoortfen zijn veelal met elkander vereenigd. Vele toevallen zijn aan beide gemeen; zelden zijn beide ziektevormen door fcherpe grenzen van elkander gefcheiden; misfchien zijn zij flechts ééne; maar de inwerking der voortbrengende oorzaken en fchadelijkheden heeft in het eene geval meer op het vaatftelfel en minder op het zenuwgeftel, in
 een

een ander meer op het laatste en minder op het eerste gewerkt. De geneeskundige behandeling stemt in beide zeer veel overeen, is genoegzaam dezelfde, in dier voege gewijzigd, dat steeds aan die middelen de voorkeur gegeven wordt, welke tot dat stelsel hunne werking voornamelijk bepalen, dat, volgens de aanwezige toevallen en ziekteverschijnselen, het meeste geleden heeft.

In tijden, waarin de zenuwkoortsen epidemisch heerschen, nemen de meeste ziekten dit karakter aan; hare *complicatiën* zijn alsdan zeer menigvuldig, en maken eene algemeene wijziging in de geneeswijze noodig.

De zenuwachtige geaardheid, die in de laatste jaren der jongst verloopene eeuw, en in het begin van deze, de heerschende geweest en veelal nog is, heeft de geneeskundige bespiegelingen niet weinig veranderd, aan menige *Hypothese* en *Theorie* haar aanzijn gegeven, en is eene der gewigtigste oorzaken, waardoor het mogelijk werd, dat in zulk een kort tijdsverloop zoo vele geneeskundige stelsels en *theoriën* in omloop kwamen, en hunne aanhangers vonden. Eenzijdigheid is voor de geneeskunst ten hoogste nadeelig; maar wat moet er van dezelve worden, wanneer telkens, als het heerschende karakter der ziekten verandert, ook de geneeskundige *theoriën* veranderd worden, en zich alles in vormen moet laten dwingen, die uit eenzijdigheid ontsproten, en met geweld aan de natuur opgedrongen worden?

Voorzeg-
ging.
(*Prognosis*). Wegens de tegenstrijdigheid en onzekerheid der toevallen, het onmiddellijk lijden dier deelen, welke met het leven in eene zoo naauwe betrekking staan, zoodat geringe afwijkingen in hunne verrigtingen reeds doodelijk kunnen worden, zijn de voorzegging in de zenuwkoorts hoogst moeilijk, onzeker, twijfelachtig en ongunstig.

Voor al moet men zich in de voorzegging regelen naar de geaardheid der *epidemie*, naar mate zij goed- of kwaadaardig is; naar den tijd, die de koorts reeds geduurd, en den trap, dien zij bereikt heeft. In de heete zenuwkoorts volgt de dood vóór den tienden, bij slepende tusfchen den twintigften en dertigften dag. Hoe meer zij deze tijdsgewrichten reeds genaderd is, zonder eenen hoogen graad bereikt te hebben, zoo veel te eerder kan men zich eene gunstige besliffing beloven; bereikt de koorts, daarentegen, reeds in de eerste dagen eenen hoogen graad, dan zijn de lijders gewoonlijk verloren.

De door befmetting ontftane zenuwkoortfen zijn fteeds gevaarlijker, dan die, welke uit andere oorzaken voortkomen; de heete zijn het meer dan de slepende. Voor zwakke, ziekelijke, uitgeputte perfonen, voor kinderen, zwangere, kraamvrouwen, zeer vreesachtige en hartstogtelijke, gevaarlijker dan voor andere, die tot aan het begin der koorts gezond en fterk waren; de eenvoudige is minder gevaarlijk, dan de *gecompliceerde*, en onder deze de ontftekingachtige *complicatie* de gevaarlijkfte.

Intusfchen volgt de dood dikwijls, onder de gunstige

stigte vooruitzigten, plotseling, of de lijdens worden, onder de schrikbarende toevallen, hersteld.

De kwaadaardige naziekten, die dikwijls op deze koortsen volgen, maken de voorzegging nog moeilijker en twijfelachtiger, daar deze den lijder niet zelden nog naar het graf slepen, als de koorts reeds geweken, en de herstelling naauwelijks meer twijfelachtig toefschijnt. Deze naziekten ontwikkelen zich menigvuldiger uit de slepende, dan uit de heete zenuwkoorts, doch men vermist ze ook na deze niet geheel; de voornaamste en meest gewone zijn: uitterende koortsen, langdurige verzwakking, water- en geelzucht, verstoppingen der buiksingewanden, *Melancholie*, *Hypochondrie*, *Hysterie*, stuip-trekkingen, verlammingen, vallende ziekte, gedachteloosheid, domheid, krankzinnigheid, doofheid, blindheid en andere stoornissen in de verrigtingen der zinwerktuigen.

Hoezeer alles, wat er in het waarden der toevallen, bij de voorzegging in de rotkoorts gezegd, ook hier toepasselijk is, en eene terugwijzing op die plaats genoegzaam konde geacht worden, vind ik het niet ongepast, hier de voornaamste toevallen en ziekteverschijnselen, waarop eene gunstige of ongunstige voorzegging in deze koortsen voornamelijk kan en moet gegrond zijn, zonder het reeds gezegde geheel uit het oog te verliezen, te herhalen.

Een gunstige uitslag laat zich voorspellen, wanneer de koorts, van den eersten beginne af, goed en doelmatig behandeld is, de toevallen in eene ze-

kere evenredigheid tot elkander staan, geene edele deelen, tot instandhouding des levens, volstrekt noodig, door plaatselijke ontstekingen, of andere ziekelijke aandoeningen, geleden hebben en nog lijden; wanneer de koorts met regelmatigheid, op bepaalde tijden van den dag, hare verheffingen maakt, langzaam en trapswijze toeneemt, geene zware zenuwtocvallen aanwezig zijn, de lijder steeds, met uitzondering van de koortsverheffingen, zich zijns zelfs bewust blijft, de krachten zich staande houden, de verrigtingen der afscheidende en ontlastende werktuigen weinig of niet van den gezondheidsmatigen toestand afwijken. Verkwikkende slaap, algemeen warm zweet, duidelijke *remissie* tusssen de koortsaanvallen, vochtig wordende tong, ruime ontlasting van pis met zetsel, natuurlijke ligging des lijders, gewone gesteldheid der oogen en geelaatstrekken, kritische buikontlastingen, bloedvloeiingen, etterbuilen, verplaatsingen, en versterking der doorgelegene plaatsen, zijn in deze koorts zoo zeldzaam en twijfelachtig, dat men daarop alleen geene gunstige voorzegging gronden kan.

Kwade teekenen.
(*Signa mala*).

Kwade teekenen zijn: ondoelmatige, te zeer verzwakkende geneeswijze in den beginne der koorts; plaatselijke ontstekingen van edele deelen en ingewanden; groote onregelmatigheid in de koortsverheffingen; groote tegenstrijdigheid in de toevallen; spoedig klimmen der ziekte, zoodat zij reeds in de eerste dagen een' zeer hoogen graad bereikt; groote zwakte; zware zenuwtocvallen; zeer vervallen aangezicht en ontstelde ge-

gelaatstrekken; groote vrees en angst voor den dood; *colliquative* ontlastingen; bruine en zwartachtige vlekken; bloedvloeijingen; opzwellen van den buik, enz.

Doodelijke teekenen zijn: wankleurig, zwart, blaauw, geel aangezigt; ingevallene, flauwe, holle, half geopende oogen; onbeweegbare pupil; diepe, aanhoudende slaapzucht, met snorkende ademhaling; mondklem; watervrees; hevige stuiptrekkingen met koud en plaatselijk zweet, of algemeen sterk zweet met koude rillingen; waterachtige, zwarte, zeer stinkende, onwillekeurige buikontlastingen; verstervingen van geheele ledematen, enz.

De geneeskundige behandeling der zenuwkoorts is allermoeijelijkst; de Geneesheer heeft in geene ziekte met zoo vele en groote zwarigheden te kampen, dan in deze. De tegenstrijdige ziekteverschijnselen maken, in den beginne, de kennis der geaardheid van de koorts onzeker, de vele en tegenstrijdige toevallen twijfelachtig. De kennis der oorzaken is ontoereikende om hare werking te verklaren, en de gewrochte veranderingen in het zenuwgestel zijn ons, bij al de vastgestelde *Hypothesen*, onbekend. De werking der geneesmiddelen is onzeker, niet zelden tegenstrijdig: braakmiddelen verwekken geene braken, ontlastende verstoppen, stoppende ontlasten, de *Kina* verwekt buikloop, enz. Dan eens zijn de lijders onaandoenlijk voor de geneesmiddelen; in de grootste giften blijven de laatste zonder uitwerking; dan eens zijn de lijders al te aandoenlijk en ge-

Doodelijke teekenen.

(*Signa mortis*).

Geneeswijze.

(*Ratio medendi*)

gevoelig, de kleinste giften hebben sterke wederwerkingen ten gevolge, en worden nadeelig.

Om zich tegen de kwade, hieruit voortvloeiende gevolgen, zoo veel doenlijk, te wachten, wordt er, van de zijde des Geneesheeren, de grootste oplettendheid en naauwkeurige kennis dezer koortsvormen in alle mogelijke gedaanten vereischt.

In het algemeen laten zich de volgende aanwijzingen, die als zoo vele regelen bij de geneeskundige behandeling in acht te nemen zijn, vaststellen:

- 1°. Men trachte de toevallige oorzaken op te ruimen, te verwijderen, onschadelijk te maken, en op alle mogelijke wijze tegen te werken.
- 2°. Men ondersteune en houde de levenskrachten in stand.
- 3°. Men bestrijde de naaste oorzaak door specifieke middelen.
- 4°. Men lenige de belangrijkste en gevaar dreigende toevallen.
- 5°. Men houde de bijzondere complicatiën in het oog.
- 6°. Men bevordere en ondersteune de kritische ontlastingen.
- 7°. Behandeling der genezenden.
 - 1°. Aan de eerste aanwijzing, het wegnemen der toevallige oorzaken, kan dikwijls in het geheel niet, somwijlen gedeeltelijk voldaan worden, doordien zij, wanneer de koorts zich eenmaal ontwikkeld heeft, niet meer kunnen weggenomen worden; somwijlen blijven zij aan den Genees-

neesh eer onbekend , of zijn , gelijk doorgaans het geval is , van dien aard , dat zij zich geneeskundig alleen niet laten verwijderen. Intusschen houde men zoo veel mogelijk in den beginne der koorts , bij de geneeskundige behandeling , datgene in het oog , wat ter voldoening aan de eerste indicatie bij rotkoortsen gezegd is. De verzwakkende en ontlastende geneesmiddelen , buiten noodzakelijkheid toegediend , zijn in deze koorts even nadeelig als in de rotkoorts , en de gevallen , waarin zij aangewezen zijn , komen zeldzamer voor , dan vele Geneesheeren wanen.

Men brenge den lijder in een ruim , luchtig , vrolijk ziekenvertrek , vermijde alles , wat daaraan hinderlijk is en den dampkring bederven kan ; vooral drage men zorg , waar het maar immer geschieden kan , dat de lijder alleen en zonder andere zieken bij hem , zij , en dat het getal der omstanders niet grooter zij , dan er tot de oppassing noodwendig gevorderd wordt. Wat de zinwerktuigen des lijders sterk kan aandoen , moet uit hetzelfde verwijderd worden ; men matige een te sterk licht door gordijnen en blinden , verhoede ieder geruisch , en alles , wat den lijder ontrust ; verzuim van het eene of het andere ontstelt de verbeelding , en vermeedert de ijlhoofdigheid.

Bloedvloeiingen en buikloop moeten , met uitzondering van de ontstekingsachtige en gastrische complicatie , overal , waar zij de koorts
heb-

hebben helpen ontwikkelen, gestuit en onderdrukt worden; insgelijks ook alle andere ontlastingen. Wellustelingen en Onanisten verdienen vooral de oplettendheid des Geneesheeren, daar zij niet zelden, nog in het begin der koorts, met deze vuile zelfvernietiging voortgaan en de ziekte dagelijks verflimmeren. Waar hartstogten, gemoedsaandoeningen, kommer, angst, te leur gestelde hoop, beleedigd eergevoel, enz. de voornaamste of medewerkende oorzaken geweest zijn, moet de behandeling tevens zielkundig (*psychisch*) ingerigt worden. Men trachte het vertrouwen van den lijder te winnen, sprekende hem een woord van moed en troost toe, bemoedige zijne hoop op vervulling zijner wenschen, verzeker hem van de medewerking zijner naastbestaanden en van hen, waarvan zij afhangt, en zoeker deze te bewegen, om hem dezelfde verzekeringen te herhalen. Het is in voortgelijke gevallen voor den lijder dikwijls beter, eenen menschenvriend, dan eenen Geneesheer met een deftig ambtsgezicht, tot arts te hebben.

- 2°. Aan de tweede aanwijzing, onderhouding en ondersteuning der levenskrachten wordt door een gepast en doeltreffend toedienen der prikkelende, opwekkende en versterkende geneeswijze voldaan. De vlugge, prikkelende geneesmiddelen zijn meer dan de aanhoudend versterkende aangewezen; in de latere tijdperken der koorts moet men ze gewoonlijk met elkander vereenigen.

gen. Steeds houde men daarbij in het oog, of men met eene prikkelbare zwakte (*debilitas cum erethismo*), of met gevoellooze zwakte (*debilitas cum torpore*) te doen heeft, en of beide toestanden oorspronkelijk door de oorzaken der koorts zelve, dan wel door eene ongepaste geneeswijze, zijn voortgebracht. De eerste is dikwijls het gevolg van eene ondoelmattige, al te verzwakkende ontlastende geneeswijze (*dibilitas directa*); de tweede van eene te prikkelende behandeling, voornamelijk dan, wanneer men de opwekkende geneesmiddelen in al te groote giften toedient (*debilitas indirecta*).

De middelen, waarvan men zich bij voorkeur bedient, en die de ervaring als de meest vermogende heeft doen kennen, zijn: *Naphta*, *Moschus*, *Camphor*, *Castoreum*, vlugge loogzouten, Spaansche vliegen, *Phosphorus*, *Valeriana*, *Serpentaria*, *Arnica*, *Angelica*, *Contrajerva*, *Asfa Foetida*, *Kina*, Wijn, Wijngeest, Spaansche vliegenpleisters, mostaardpappen, lavementen uit afkookfels en aftreksels der genoemde middelen, prikkelende, opwekkende stoffen, met wijn en aromatische kruiden, inwrijvingen en waschingen met geestrijke opwekkende middelen; heele en halve warme baden, met Wijn, Wijngeest of kruiderijen toe bereid; koude- en stort-baden.

In de keuze der geneesmiddelen blijft er veel aan het oordeel des handelenden Geneesheeren over-

overgelaten; niet bij allen kan men één en hetzelfde geneesmiddel toedienen; de graad der zwakte, de geaardheid der koorts, de bijkomende toevallen, de plaatselijke aandoeningen (*Idiosyncrasien*), de smaak des lijders, veroorzaken veelvuldige veranderingen, die de keuze moeilijk maken. De instandhouding der krachten hierbij het voornaamste doel zijnde, zoo moet ook het meest op het grooter of kleiner verval van dezelve geacht worden. In den beginne der koorts, wanneer de krachten nog weinig geleden hebben, is een aftreksel van de *Valeriana*, de *Arnica*, *Serpentaria*, enz., met kamilbloemen, dikwijls genoeg, om dezelve in stand te houden, de koorts te verkorten en de genezing te bespoedigen;

R ϕ . Rad. Valer. Sylvest., Serpent. S. Arnicae,
unc. ß—j.

Flor. Chamom. 3 iij.

Infunde c. s. q. aq. ferv.

In vase Clauso refrigr.

Col. unc. xij.

adde

Syr. Cort. Aur. unc. j. ß.

Liq. Anod. M. H. 3 j.

M. D. S.

Om het uur een half kopje.

Wanneer de krachten, gedurende het gebruik van deze middelen, steeds zinken, de lijder zwakker wordt, en de toevallen vermeederen,
moe-

moeten naast de genoemde, ook nog andere middelen, die eene meer doordringende en sterkere prikkelende eigenschap hebben, toegediend worden. Men geve de *Camphor* in eene *emulsie* of poeder met suiker:

R̄. Camphor. ʒ ʒ.

Puly. Gum. Arab.

Sachar. alb. ā ʒ ij.

F. leg. art. Emulsio.

C. Aq. Dest. Menth. unc. vj.
adde

Liq. Anod. ʒ j.

D. S.

Afwisselend om de twee uren een' lepel vol.

R̄. Camphor. ʒ ʒ—j.

Sachar. alb. ʒ ij.

M. F. puly. div. in x partes.

D. S.

Om de twee uren een poeder met water of wijn.

Waar de *Camphor* niet genoegzaam opwekt, of door den lijder niet verdragen wordt, vereenige of verwisfele men met dezelve de *Amonia pura*, het *Castoreum*, de *Moschus*; de eerste van twee tot zes greinen om het uur, of de twee uren, de andere op de reeds bij de rotkoortsen opgegevene wijze:

R_x. *Ammoniae purae*. 3 ℥.

Gum. Arabici. 3 j.

Solve

Aq. Menth. Crisp. unc. vj.

Syr. Alth. unc. ℥.

D. S.

Om het uur een' lepel vol.

In de hoogste graden der zwakte en werkeloosheid, waar de genoemde middelen vruchteloos gebruikt zijn, kunnen de hevigst prikkelende middelen beproefd worden, hoezeer men zich niet te veel van hunne uitwerkingen beloven moet; want zij doen op lang na niet, wat wij in de schriften der Geneesheeren van hunne nuttigheid geboekt vinden.

Bij groote werkeloosheid van het vaatstelsel raadt men de Spaansche vliegen, in toereikende, echter niet te groote giften, met alle mogelijke omzigtigheid gegeven, aan; men laat ze in *tinctuur*, in *emulsie*, of in poeder gebruiken: de *tinctuur* verdient in alle gevallen de voorkeur. Afwisselend met de andere opwekkende geneesmiddelen geeft men ze om het uur of de twee uren met verzachtende of geestrijke dranken, in amandelmelk, of wijn, van vier tot tien druppels. Alleen in de wanhopendste gevallen behoort de mingeoefende dit middel toe te dienen. Even eens is het gelegen met de *Phosphorus*. Bij de grootste zwakte, met de

de hevigste zenuwtoevallen is hij aangewezen, deszelfs gebruik vordert groote omzigtigheid. In de fchriften der Geneesheeren vindt men gevallen van genezenen, door dit middel, verhaald, die aan het ongeloofbare grenzen, waar de lijders nog gered werden, als niemand meer de zekerheid van hunnen dood in twijfel trok.

Talrijker zouden intusfchen de gevallen, waarin de lijders de flagtoffers van het gebruik des *Phosphorus* geworden zijn, in de fchriften der Geneesheeren gevonden worden, indien zij gewoon waren, hunne mislukte proefnemingen met onzekere en hevig werkende geneesmiddelen, even getrouw te verhalen, als zij nimmer verzuimen, den lof te doen weergalmen van eene enkele gelukkige uitkomst, die dan nog wel meerendeels van toevallige omftandigheden afhankelijk geweest is.

Men geeft den *Phosphorus* opgelost in *aether*, van een vierde of zesde grein; een halve grein is reeds eene fterke gif; drie of vier greinen op ééns hebben eenen fpoedigen dood, door verfterving der maag en buksingewanden, ten gevolge gehad.

R. Phosphor. gr. ii—iv.

Solve Digerendo in aether. Sulphur. ʒ i—ij.

Ol. Cin. unc. ʒ i—ij.

Gumm. Arab. ʒ i—3 j.

Om het half uur een klein eijerlepeltje vol.

Wanneer men gelukkig genoeg geslaagd is, de wegzinkende krachten door het gebruik dezer middelen op te wekken en in stand te houden, zoodat de toevallen verminderen en de koorts duidelijke remisfiën maakt, moet men de opgewekte krachten door meer aanhoudende versterkende middelen duurzaam blijven ondersteunen; want de vlug prikkelende middelen alleen zijn daartoe nimmer toereikende, zij wekken wel op, maar hunne werking is voorbijgaande zonder duurzaamheid; zij putten de levenskrachten ten laatste uit, vooral, wanneer zij in te groote giften, of in lange tusschentijden, gegeven worden. De middelen, welke dan te pas komen, zijn: *Kina*, *Cascarilla*, bittere, voedende en staalmiddelen, alleen op zich zelve, of in verband met de eerste.

In de eerste dagen der beginnende beterschap vindt men zich meerendeels verplicht, er vlugge middelen bij te voegen, daar zij zonder deze door de maag niet verdragen worden. Naar mate de spijsverteringskrachten toenemen, en de ziekelijke wederwerking in het zenuwgestel bedaart, kunnen de vlugge middelen verminderd en geheel weggelaten worden. Zelfs verdienen alsdan de minst prikkelende, meer voedende en versterkende geneesmiddelen de voorkeur. De bittere, de ijzerbereidingen, de IJslandsche Mos, Vleeschnat, gelei van Hartshoorn, vleeschspijzen, zijn alsdan aan den toestand des lijders het meest geëvenredigd. Onder de uitwendige
mid-

middelen, welke ter opwekking der levenskrachten verdienen aangewend te worden, zijn de Spaansche vliegenpleisters en mostaardpappen de voornaamste; grooter is hare nuttigheid in deze dan in de rotkoortsen, en haar gebruik met minder zwarigheden en gevaar voor versterkingen gepaard. Vroegtijdig, zelfs in de eerste beginfelen der koorts aangelegd, kunnen zij, door de plaatselijke inwerking, de wederwerking van het zenuwgestel zoodanig van de edeler deelen afleiden en tot min belangrijke bepalen, dat de koorts in haren verderen voortgang gestuit en opgehouden wordt. In den geheelen loop der ziekte blijven zij van groote nuttigheid, mits dat zij dikwijls ververscht, en eene matige, maar voortdurende ontstekings in die deelen onderhouden, waarop zij aangelegd zijn. De dijen, kuit en voetzolen zijn de plaatsen, welke men het meeste verkiest; bij plaatselijke aandoeningen worden zij op het lijdende deel, of zoo veel mogelijk, in deszelfs nabijheid gelegd. Intusschen is de geheele oppervlakte des ligchaams daartoe geschikt.

Lavementen uit aftreksels en afkookfels van de *Valeriana*, *Arnica*, *Kina*, enz. oplosfingen van *Asfa Foetida*, en vleeschnat, zijn vooral dan niet te verzuimen, wanneer geene toereikende hoeveelheid van geneesmiddelen door den mond gebruikt of door de maag verdragen kan worden; waar het dus noodig is, dat men

langs meer dan éénen weg op de bewerktuiging inwerkt.

Warme baden en stovingen, uit prikkelende opwekkende middelen te zamen gesteld, waartoe vooral Wijn, Wijngeest, oplosfingen van *Camphor* en aftreksels van *aromatike* kruiden passen, werken op eene zeer krachtige en oogenfchijnlijke wijze mede, om de krachten te ondersteunen, daar zij hunne inwerking niet tot een klein gedeelte bepalen, maar genoegzaam over de geheele oppervlakte des ligchaams zich uitbreiden. Zij wekken daardoor niet alleen de wederwerking in de einden der zenuwen op, maar geven haar ook, volgens de wetten van het *Antagonismus*, eene andere rigting, in het algemeene punt van vereeniging voor al de zenuwen.

De inwrijvingen met *Linimentum Volatile*, *Laudanum Liquidum Sydenhami*, *Tinctura Cantharidum* en andere, zijn, als algemeene en als plaatsmiddelen gebezigd, van groot nut. Algemeen in eene groote uitgebreidheid op de oppervlakte des ligchaams aangewend, staan zij nagenoeg gelijk aan de warme baden en stovingen, maar hebben boven deze nog vooruit, dat de mechanische prikkeling door het wrijven hare werking verhoogt. Plaatselijk kunnen zij de mostaardpappen en Spaansche Vliegenpleisters vervangen, bijzonder bij kinderen, en bij voorwerpen, die, wegens eene zeer gevoelige huid, de laatste niet wel verdragen.

Eeni-

Eenige Geneesheeren raden ook het dierlijke *magnetismus* aan, en meenen daarin niet alleen een voornaam middel tot instandhouding der levenskrachten, maar zelfs een bijna onfeilbaar middel ter genezing gevonden te hebben, mits het in tijds aangewend worde.

Op het standpunt, waarop het dierlijke magnetismus voor als nog staat, uit een geneeskundig oogpunt beschouwd, kan hetzelfde, mijns bedunkens, geenszins als een geneesmiddel tegen deze koortsen, tot algemeen gebruik, aangeraden worden.

Ten aanzien van den leefregel geldt hetzelfde, wat er van de geneesmiddelen gezegd is. De dranken moeten vlug, prikkelend, opwekkend en versterkende zijn. Van den Wijn heeft men in deze koortsen het meeste te verwachten: hij wekt de krachten op, zijne werking is meer aanhoudend, dan die van de andere vlug prikkelende middelen, hij is den lijders aangenaam, en de meeste hebben eenen sterken trek daarnaar. Men geeft den wijn met water, afkookfels van rijst, gerst of brood, met citroensap en suiker tot gewonen drank. Goede, Roode- en Rhijnsche wijnen zijn de meest geschikte; de hoeveelheid moet volgens de jaren, het geslacht, den trap en aard der zwakte en de gewoonte bepaald worden. Tusschen beiden kan men nog de beste en edelste wijnsoorten, als oude Rhijnsche-, Madera-, Spaansche-, Hon-

gaarsche-, Kaap- en Fransche wijnen lepelsgewijze toedienen.

Zelden komen er in den loop der koorts, voor het tijdperk der genezing, eenige voedsels te pas, daar de eetlust ontbreekt en de spijsverteringswerktuigen te zwak zijn, om eenig voedsel te verdragen en te verteren. Alles, wat men van deze zijde tot duurzame ondersteuning der krachten doen kan, bepaalt zich tot het gebruik van krachtig vleeschnat met wijn, citroenen en kruiderijen; de hoeveelheid moet eerst klein zijn, allengskens, als men ziet, dat het genuttigde aan den lijder wel bekomt, kan men grootere hoeveelheden toedienen, en eenige meer vaste voedsels, als rijst, brood, beschuit, vermicellie, bijvoegen; trapsgewijze en langzaam gaat men tot voedzamere spijsen, het vleesch van jonge dieren, en ten laatste tot den gewonen leefregel des lijders, met uitzondering van zeer zware en moeilijk verteerbare spijsen, over.

3°. *Aanwijzing.* Men bestrijde de naaste oorzaak door specifieke geneesmiddelen.

De voor als nog onverklaarbare wijzigingen en veranderingen, die in de verrigtingen van het zenuwgestel in deze koortsen plaats hebben, het wezenlijke der ziekte uitmaken, en wederkeerig de oorzaken zijn van al de stoornissen, welke in de bewerktuiging plaats grijpen, maken in de behandeling het gebruik van genees-

neesmiddelen noodig, wier werking wij ons volgens de meest in het oog loopende verschijnselen, die er op volgen, trachten te verklaren; maar waarbij wij toch meer door eene gezuiverde, uit de ervaring afgeleide *empirie*, dan wetenschappelijke zekerheid, geleid worden. Zoodanige middelen nu, die in de zenuwkoorts het meeste bijdragen, om de genezing te voldingen, zonder dat wij ons de wijze hoe, anders dan hypothetisch verklaren kunnen, noemen wij specifieke.

De geheele reeks van de zoogenaamde zenuwmiddelen (*Nervina*), bedarende (*Sedativa*), krampstillende (*Antipasmodyca*), stelt men onder deze klasse. Wij zien wel, dat zij eene veranderde stemming in het zenuwgestel uitwerken; dan hoe zij dit doen, blijft als nog een raadsel. Ware het alleen door opwekken, verzwakken, bedaren, afleiden, enz., hoe zoude men dan het verschil verklaren, dat er in de wijze van hunnen invloed op de bewerktuiging plaats heeft? waarom zoude dan niet het eene middel veilig in de plaats van een ander kunnen gesteld worden, en zelfs alle andere onnoodig maken? Maar het is niet het meer of minder (het *quantitative*), doch de hoedanigheid afhankelijk van de zamenstellende deelen van ieder middel (het *qualitative*), waaruit dit onderscheid moet verklaard worden. Zoo lang deze en soortgelijke zwarigheden niet opgeruimd zijn, zoo lang mag men, mijns bedunkens, ook eene ei-

genaardige specifieke geneeswijze dezer koortsen aannemen, mits, gewijzigd en bepaald volgens regelen, die de ervaring geleerd heeft.

Braak-
middel.

Het eenstemmige getuigenis der voornaamste Geneesheeren, sedert de vroegste tijden, dat de Geneeskunst regelmatig door bijzondere personen beoefend wordt, bewijst de groote nuttigheid der braakmiddelen, en stelt ze op eene der eerste plaatsen tegen deze koortsen.

Een spoedig werkend braakmiddel, in het eerste begin der koorts toegediend, vernietigt haar niet zelden in hare eerste kiem; de meer gevorderde tijdperken echter verbieden haar gebruik niet, en zij kunnen ook dan nog en bij herhaling met voordeel gebruikt worden.

In de besmettelijke en slepende zenuwkoortsen zijn zij vooral, en in het eerste begin overal, aangewezen, waar geene toevallen en omstandigheden aanwezig zijn, die in het algemeen het gebruik der braakmiddelen verbieden, en de krachten niet te zeer vervallen zijn. Zij kunnen herhaald worden, waar de toevallen, die na het braken bedaard waren, zich naderhand weder verheffen. De redenen, waarom men ze toedient, gronden zich op de goede uitwerkingen, die zij in andere gevallen gehad hebben, dus alleen op *empirie*; eene bepaalde indicatie is er niet; het blijft aan het oordeel des Geneesheeren overgelaten, in welke omstandigheden hij van dezelve voor- of nadeel te wachten heeft. Bij ontstekingsachtige gesteldheden

en

en toevallen, congesties naar het hoofd, bij groote gevoeligheid van de maag, vordert derzelve gebruik vooral omzigtigheid.

Of zij alleen door opwekking, door de *mechanische* schuddingen, die hunne werking in het geheele gestel te weeg brengt, of door afleiding der zenuwen werkdadigheid naar de maag werken, is zelfs met geene genoegzame redenen van waarschijnlijkheid te bewijzen. Het grofst schijnen zij te dwalen, die hunne nuttigheid alleenlijk in de ontlasting van schadelijke stoffen uit de maag zoeken. Zoo veel mag intuschen voor zeker gesteld worden, dat de hoeveelheid der ontlast wordende stoffen en hunne nuttigheid in hoegenaamd geene evenredigheid tot elkander staan.

Als na de voorafgegane braken het hoofd vrijer en opgeruimder wordt, de zenuwtoevallen verdwijnen, de krachten zich verheffen, en een algemeen gelijkmatig zweet uitbreekt, voldoen zij aan de hoofdzakelijkste vereischten ter genezing.

De zwakte, welke hare werking, volgens de begrippen der onberedeneerde aanhangers van zekere Theoriën, zoo zeer vermeederen zoude, dat zij daarin redenen genoeg waanden te vinden, om braakmiddelen bij de behandeling der zenuwkoortsen geheel te verbannen, behoeft men niet te vreezen, als zij niet ontijdig toegediend, en, na den afloop van hunne werking, de lijder
door

door een glas wijn, opwekkende geneesmiddelen, krachtig vleeschnat met kruiderijen, ondersteund en te gemoet gekomen wordt.

De *Ipecacuanha* en de Spiesglasbereidingen kunnen ieder voor zich of vereenigd, op de wijze bij de rotkoorts reeds breeder omschreven, toegediend worden.

Onder verdoovende en bedarende middelen behoort het *Opium*, de *Hyosciamus* en de *digitalis purpurea*, voornamelijk nader in overweging genomen te worden.

Het *Opium* schijnt onmiddellijk en regstreeks op het zenuwgestel in te werken, en deszelfs gevoeligheid en beweegbaarheid te verminderen. Mischien door de afscheiding van de zenuwvloeistof en het geleidend vermogen der zenuwvezel te verminderen. Alle verschijnselen, die op het gebruik des *Opiums* volgen, geven deze verandering in het hersen- en zenuwgestel te kennen, dewijl de toevallen, welke gelijktijdig aanwezig zijn en daarmede strijden, van andere gelijktijdig gebezigde geneesmiddelen en toevallige omstandigheden afhangen.

Het *Opium* is aangewezen, waar de verrigtingen van het hersen- en zenuwgestel verhoogd zijn, en met te veel levendigheid en vlugheid geschieden, bij slapeloosheid, te groote aan doenlijkheid voor zinnelijke indrukken, bij hevige pijnen, aanhoudende ijlhoofdigheid, stuip-trekkingen, kramp, onwillekeurige bewegingen der spieren, en tegen overmatige uitputtende ontlastingen. Het is schadelijk, bij onaandoen-
lij-

Verdoo-
vende en
bedaren-
de midde-
len.
(*Narco-
tica, se-
lativa.*)

lijke zwakte (*Dibilitas cum Torpore*), bij slaapzucht, stille ijlhoofdigheid, gevoelloosheid, verlammingen, congesties naar het hoofd, langdurig verstopte buiksonstlasting, en bij ophooping in de eerste wegen.

De hoeveelheid en gedaante, waarin men het *Opium* toedient, regelt zich naar de hevigheid der toevallen, de jaren des lijders en bijzondere omstandigheden. Het is beter met kleine giften van een achtste of vierde grein te beginnen, die men om de twee uren herhaalt, dan dat men te veel op ééns geeft, waardoor de lijder door verdooving in een' slaapzuchtigen toestand valt.

R. Opii. depur. gr. ij.

Sachar alb. 3 ij.

M. F. pulv. Div. in xii part.

Aeq. D. S.

Om de twee uren een poeder met water.

R. Opii. depur. gr. i—ij.

Sachar alb. gr. x.

M. F. pulv. D. S.

Op ééns des avonds.

Bij zeer zware zenuwtoevallen heeft men aangeraden, hetzelfde in groote giften, van een tot twee greinen, en zeldzaam herhaald, toe te dienen, naarmate de eerst bedaarde toevallen naderhand zich weder verheffen. In plaats van het eenvoudige *Opium*, kan men zich van het waterachtige Extract bedienen, waaraan zelfs eeni-

eenige Geneesheeren, wegens zijne zuivere narcotische werking, de voorkeur geven. Het werkt zwakker dan het opium, de giften moeten derhalve ook iets grooter zijn. Het *Laudanum Liquidum*, de *Tinctura Thebaica*, en de *Tinctura Opii Eckardi*, geeft men van drie tot tien droppels om de twee of drie uren, of van tien tot twintig droppels op ééns. Waar men tevens op de prikkelbare vezel, en niet alleen verdoovend op het zenuwgestel werken wil, bij buikloop en andere uitputtende ontlastingen, bij aandoeningen van de maag en hevige pijnen, komen zij te pas; waar te veel *irritatie* in het vaatstelsel heerscht, zijn zij nadeelig; het zuivere *Opium* of waterachtige *extract* verdienen alsdan de voorkeur.

Het *extractum Hyosciami* kan daar, waar het *Opium* aangewezen is, van een vierde tot een geheel grein om de twee uren, of twee greinen des avonds op ééns, gegeven worden. Weinig verschilt zijne werking van die van het *Extractum Opii Aquosum*. Eenige Geneesheeren meenen vast te mogen stellen, dat de *Hyosciamus* alleen de verdoovende eigenschap der *Narcotica* bezit, en niet prikkelt, dewijl het *Opium* steeds even prikkelend als verdoovend werkt, en altijd de wederwerking in het vaatstelsel, als zijne eerste werking, vermeedert. Zij willen derhalve ook, daar, waar de pols hard en schielijk en eene ontstekingsachtige gesteldheid aanwezig is, aan de *Hyosciamus* de voorkeur gegeven heb-

hebben; wijders bewerende, dat dezelve ook daar veilig kan toegediend worden, waar het *Opium* niet aangewezen is, en echter de geweldige wederwerking van het zenuwgestel dringend bedarende middelen vordert.

De *Digitalis Purpurea* heb ik dikwijls met groot voordeel voor mijne lijders in de zenuwkoorts gebruikt. Zij is aangewezen bij drooge, zeer heete huid, schielijken pols, ijlhoofdigheid en verminderde pisaffcheiding. Men geeft ze in poeder, *Tinctuur*, aftreksel, alleen of met andere middelen gemengd, in kleine giften van een vierde tot een geheel grein om de twee uren, van een tot twee greinen des morgens en 's avonds op ééns.

R ϕ . Pulv. Digital. purp. gr. iv.

Sachar. alb. 3 ij.

M. F. Pulv. Div. in xii partes

Aeq. D. S.

Om de twee uren een poeder.

R ϕ . Pulv. Fol. Dig. purp. gr. vi—xij.

Sachar. alb. 3 ij.

M. F. pulv. Div. in vi partes.

Aeq. D. S.

Des morgens en des avonds een poeder.

Zoo lang er zenuwtoevallen aanwezig zijn, kan men de *Digitalis* vereenigd met *Opium* geven; zijn deze geweken, maar blijft de pols schielijk, en houdt de hette aan, dan doet men
wel,

wel, de *Tinctuur* met het zuur van HALLER te bezigen:

R_p. *Tinct. Digitalis purp.*

Elixir. acid. HALLER, \bar{a} 3 ij.

D. S.

Om de twee of drie uren 10 tot 20 droppels met water.

De naaste uitwerking der *Digitalis* is verminderte wederwerking in het vaatstelsel, de pols wordt langzaam, de hette en ijlhoofdigheid verminderen, de pisaffcheiding neemt toe. Regtstreeks, zonder prikkeling, schijnt zij door eene materiële verandering der bewerkte stof de prikkelbaarheid en gevoeligheid te verminderen. Zoo ras de pols langzamer wordt, maakt men de giften kleiner; de polsslagen tot 60 of 70 gedaald zijnde, moet zij geheel ter zijde gesteld worden. Eene al te lang gestremde prikkelbaarheid doet de verrigtingen kwijnen, onderhoudt de zwakte, daar de te langzame bloedsomloop de voeding en reproductie vertraagt, en de gewone prikkels geene toereikende wederwerking onderhouden kunnen.

Daar men zich de werking der zenuwmiddelen door prikkeling, opwekking, en versterking verklaart, waarom zij ook ter voldoening aan de tweede indicatie, ter instandhouding der krachten, toegediend worden, en in dat opzigt het noodige reeds gezegd is, kunnen wij dezelve hier onaangeroerd laten, hoezeer hunne werking

king

Zenuw-
middelen.
(*Nervi-
na.*)

king misfchien meer eigenaardig of fpecifiek, dan wel prikkelend is. Hierbij behoort nog aange-merkt te worden, dat men in de zenuwkoortfen niet het gebruik der zenuwmiddelen ftandvastig moet volhouden; zoo lahg men ziet, dat de koorts niet verflimmert, en de lijder in dezelfde omftandigheden blijft, verandere men de middelen, waarop men zijn vertrouwen gefield heeft, niet te fpoedig, maar late onafgebroken er mede voortgaan: ftandvastigheid heeft menigen lijder het leven gered. Indien de zenuwmiddelen in den beginne de toevallen doen verminderen, doch deze zich na verloop van eenige uren of dagen weder verheffen, zonder dat de geneesmiddelen daarop verder eenigen invloed hebben, en de koorts toeneemt, dan moet men zich niet tot één middel bepalen, maar onderscheidene middelen te gelijk, en bij afwifeling, toedienen. Men geve het eene uur *Aether*, aetherifche Oliën met fuiker, vlug Loogzout, *Spiritus Corn. Cervi*, *Oleum animale Dippeli*, of iets anders; het andere halve uur *Camphor*, *Moschus*, *Castoreum*, enz.; tufchen beiden eenige lepels wijn van goede kwaliteit.

Door alles voor het welzijn zijner lijders te willen, doet men dikwijls te veel, waartegen men zich niet minder, dan voor het te weinig doen, behoort te wachten. De natuur geneest de ziekte, niet wij; wij onderfteunen haar slechts door onze geneesmiddelen, ten einde zij in ftaat blijve, den ftrijd vol te houden en de overwin-

ning te behalen. Het is belagchelijk, hoe Geneesheeren, niet zelden reeds in de eerste dagen der koorts, alle mogelijke geneesmiddelen verwisten, zoodat zij ten laatste niet meer weten, wat zij geven zullen, daarbij wanende alles gedaan en niets verzuimd te hebben. Twee of drie, volgens de omstandigheden der zieken, wel gekozene geneesmiddelen zijn in die gevallen, waar de genezing mogelijk is, doorgaans genoeg, om dezelve daar te stellen.

Kina.
Koorts-
bast.

Nog altijd blijft de koortsbast in de zenuwkoortsen, gelijk in alle anderen, het voortreffelijkste hulpmiddel, om de koorts met alle daarvan afhange toevallen het krachtigste tegen te werken en de genezing te bespoedigen. Waar de maag ze verdraagt, is zij ook aangewezen, in welk een tijdperk zich de koorts ook bevinden moge. In het eerste tijdperk wordt zij somwijlen in het geheel niet verdragen, of bekomt den lijder alleen dan wel, wanneer men ze met vlugge middelen vereenigd toedient; daar, waar, na haar gebruik, de lijder bedaart, de pols langzamer en krachtiger en de remisfiën duidelijker worden, moet men vooral hiermede volhouden. De tegenaanwijzingen, die haar gebruik verbieden, en de manier, waarop zij gegeven wordt, zijn dezelfde als die, waarvan reeds breeder gehandeld is. Het volgende voorschrift is in de zenuwkoorts eenigzins be- roemd geworden:

R.

R_ç. *Pulv. Cort. Peruv. Opt. unc. i—ij.*

— *Rad. Calami Arom. unc. ſ.*

Vini boni Rhenan. lib. j.

Agitet. per Horam, Cola.

D. S.

Om het uur een' of twee lepels.

In de laatste tijdperken der zenuwkoorts heeft men de kwikbereidingen zeer aangeprezen.

Kwikbe-
reidingen
(*Mercurialia*).

Volgens het getuigenis van vele Schrijvers, doch vooral de Engelsche en Duitſche Geneesheeren, bedaren zij de overmatigewederwerkingen zonder te verzwakken. Zij zijn derhalve aangewezen bij aandoenlijke zwakte, waar de prikkelbaarheid zeer verhoogd en de krachten gering zijn; bij plaatselijke aſtheniſche ontstekingen, kramp en andere plaatselijke aandoeningen, vooral in vereeniging met *Opium*. De *Calomel* of *Mercurius Dulcis* wordt bij uitſluiting gebezigd; de giften moeten niet te klein, van een tot vier greinen zijn, en in geene al te groote tuſſchenruimte gegeven worden.

Zij zijn ſchadelijk bij ophooping en in de eerſte wegen; bij uitputtende buikontlaſtingen, neiging tot *paſſive* bloedvloeijingen; bij de rotachtige *complicatie*; en *ſcorbutike* geſteldheid der vaste en vloeibare deelen.

Koude- en ſtoribaden verminderen de hette, Baden. maken de huid vochtig, bevorderen de uitwaſeming en bedaren de ijelhoofdigheid. Zij zijn

aangewezen in het eerste tijdperk der koorts, voornamelijk bij die door besmetting voortgebracht, als de hette zeer groot, de huid droog, de ijlhoofdigheid raaskallend is, en de lijder nog tamelijk zijne krachten heeft. Bij kleine, zeer zwakke pols; onaandoenlijke zwakte; matig warme, vochtige, tot zweet neigende huid; uitputtende buikontlastingen; stille ijlhoofdigheid; zware zenuwtoevallen, en in de meer gevorderde tijdperken zijn zij schadelijk.

Over het algemeen vordert derzelver gebruik meer omzigtigheid, dan door vele Geneesheeren bij het gebruik van dit hevige middel in acht genomen wordt. Nimmer late men zich, alleen op het getuigenis van anderen, in den waan brengen, dat eenige emmers koud water, over den zieken uitgestort, genoegzaam zijn, om eene zenuwkoorts te genezen.

- 4^e. *Aanwijzing.* Men bestrijde de belangrijkste en gevaar dreigendste toevallen. Hoezeer eene doelmatig ingerigte geneeskundige behandeling der zenuwkoorts de bijzondere toevallen het krachtadigst tegengaat, doordien zij die gesteldheid der bewerktuiging, waarvan dezelve de gevolgen zijn, tegenwerkt, kan het toch niet ontkend worden, dat er ook in deze koorts toevallen voorkomen, die eene bijzondere symptomatische behandeling noodig hebben, dat het geenszins ongepast en ondoelmatig is, dezelve in het oog te houden en zich daarnaar te regelen,

len, mits dat deze symptomatische aan de algemeen aangewezen kunstbehandeling geëvenredigd zij en daarmede niet in tweestrijd sta.

De voornaamste der toevallen, welke eene bijzondere behandeling kunnen noodig maken, zijn: braken, buikloop, zware ijlhoofdigheid, aandoeningen der borst, hoest, benaauwdheid, moeilijke adembaling, enz., stuiptrekkingen, verstopte pisontlasting en spruw.

Braken zijn gewoonlijk een gevolg van verhoogde prikkelbaarheid in de maag, waardoor dezelve zoo aandoenlijk wordt, dat er op de zwakste prikkels braken volgen. Men trachte daar, waar dit toeval van het uiterste aanbelang is, hetzelfde door zoodanige middelen tot bedaren te brengen, die ons de meest nuttige heeft leeren kennen: kleine giften *Opium* of *Laud. liq. Syd.* van twee tot vijf droppels, met wijn of een *aromatiek* overgehaald water, om de 10 tot 20 minuten, met ter zijde stelling van alle andere geneesmiddelen, zoo lang totdat dit lastige toeval bedaard is, en de meest aangename dranken, en de noodige geneesmiddelen verdragen worden, is, ter voldoening van deze aanwijzing, een der beste hulpmiddelen. Naast het *Opium* verdient het koolzuur de eerste plaats, dat, door middel van het drankje van RIVERIUS, in de maag ontwikkelt, of door bottelbier en Champagnewijn in de maag kan gebragt worden. Het koolzuur vermindert de prikkelbaarheid onmiddellijk, en oogenblikkelijk

als het met de prikkelbare vezel in aanraking komt; bijzonder heeft dit verschijnsel in de maag plaats. Het drankje van RIVERIUS bestaat uit loogzout, met citroenzuur, dat gedurende de opbruifing moet ingenomen worden. Daar, waar de werkzaamheid van dit middel alleen en geheel afhangt van de hoeveelheid koolzuur, dat zich in de maag ontwikkelt, houd ik het voor beter, het zuur en het loogzout ieder afzonderlijk te geven, opdat zich beide middelen eerst in de maag vereenigen en de ontwikkeling van het koolzuur alleen en onmiddellijk in dezelfde plaats hebbe:

R_o. *Alcali Vegetab.* ʒ ʒ.

Aq. dest. unc. j.

S. N^o. 1.

R_o. *Succ. Citri, seu Acetum destillat.*

Aq. destil. ā unc. ʒ.

S. N^o. 2.

Men laat den lijder eerst N^o. 1, en terstond daarop N^o. 2 nemen.

Fachinger water met Rijnschen wijn en suiker ontwikkelt veel koolzuur, en kan, daar het voor de zieken doorgaans aangenaam is, in de plaats van het drankje van RIVERIUS gesteld, en tot gewonen drank gegeven worden.

Het bottelbier geeft men, terwijl het schuimt, in kleine hoeveelheden, om het half uur herhaald. Waar dikwijls alle andere middelen vruch-

teloos gebruikt werden om het braken te stillen, heb ik het fomwijlen nog door een lepelsgewijs gebruik van goed mouferenden Champagnewijn tot bedaren gebragt.

Het *Oxydum Bismuthi* heeft zich zeer werkzaam getoond, om de te groote gevoeligheid der maag te verminderen en het braken te bedaren. Veelmalen heb ik mij daarvan, met *Opium* verbonden, met het beste gevolg be- diend:

R_ç. *Oxyd. Bismuth.* gr. vj.

Pulv. gg. Arab. 3 j.

Aq. dest. Menth. unc. iv.

Laud. liquid. Syd. gutt. xvj.

D. S.

Ieder half uur een' halven lepel.

Uitwendig kan men gebruik maken van inwrijvingen met *Linimentum Volatile* en *Laud. liq. Syd.* in de bovenbuikstreek, van eene roodmakende pleister, drooge koppen, omslagen uit *aromatike* kruiden in wijn gekookt, of in een stuk brood met brandewijn geweekt en bestrooid met kruidnagels en nootmuskaat, op de maagstreek gelegd; dit laatste heb ik dikwijls werkzaam bevonden, dan alle andere uitwendige hulpmiddelen.

Smeltende Buikloop. (Diarrhoea Colliquativa).

Waar deze ontstaat, trachte men dien zoo spoedig mogelijk te bedaren, mits dat er geene mate. iëele stoffen aanwezig zijn, welke haar onder-

houden; waar dit het geval is, moet hij wel gematigd, maar niet geheel onderdrukt worden, daar zulks brakingen, opzwellings van den buik, hik en benaauwdheden gewoonlijk ten gevolge heeft; kleine giften Rabarber met Arabische Gom en Braakwortel doen, in het begin der koorts, en waar men de ontlastingen alleen matigen wil, zeer goede diensten:

℞. *Pulv. Rad. Rhei* ℥ j.
 ——— ——— *Ipec* gr. iv.
 ——— *Gumm. Arab.* ʒ ij.
Aq. dest. flor. Cham. unc. vj.
Syr. Altheae unc. ʒ.
M. D. S.

Om het uur of de twee uren een' lepel.

Waar de buikloop een gevolg van zwakte der darmbuis is, moet men denzelfden naar den aard der zwakte, met vlug prikkelende, of aanhoudend prikkelende geneesmiddelen behandelen; bij de prikkelbare zwakte is het *Opium* het voornaamste middel; men geeft het in kleine giften, met Arabische Gom, Salep en Kaneel; in groote giften verwekt het *Opium* ligt brakingen. Bij onaandoenlijke zwakte komen de *Columbo*, de *Lopeziana*, *Arnica*, *Simaruba*, Aluin en adstringerende wijnsoorten te pas, op dezelfde wijze toegediend, als bij de behandeling van dit toeval bij de rotkoorts reeds gezegd is.

Ook de andere bijkomende toevallen zijn op de-

dezelfde wijze te behandelen, als daar ter plaatse breeder is opgegeven, mits dat men steeds het zenuwachtige karakter in het oog houde.

- 5e. *Aanwijzing.* Men houde de bijzondere complicatiën in het oog. De ontstekingsachtige complicatie bepaalt zich gewoonlijk alléén tot het eerste begin der koorts, in de zeldzame gevallen, waarin zij bij de niet besmettende zenuwkoorts voorkomt. Zelden zijn er algemeene bloedontlastingen noodig, en ook dan worden zij slechts in kleine hoeveelheden verdragen; eenige bloedzuigers, in de nabijheid der bijzonder lijdende deelen, zijn tot dat einde in de meeste gevallen toereikende. Gedurende de aanwezigheid der ontstekingsachtige gesteldheid, onthoude men zich van de prikkelende geneesmiddelen; zuurachtige dranken, en de verdere voortgang der koorts vernietigen doorgaans zeer spoedig dezelve. Eene strenge antiphlogistische behandeling komt derhalve ook zelden te pas; in de meeste gevallen zal zij zeer nadeelig zijn, en maar zeldzaam iets wezenlijks tot de genezing bijdragen. De gastrische complicatie, in deze koorts de meest gewone, wordt het doelmatigst door braakmiddelen, welke meermalen kunnen herhaald worden, opgeruimd. Laxeermiddelen zijn minder aangewezen, echter moeten zij daar, waar ophooping in de darmbuis aanwezig zijn, niet verzuimd worden; de Rhubarber met Magnesia is daartoe meer dan andere middelen geschikt, daar zij genoegzaam

ontlast zonder veel te verzwakken; waar prikkelende middelen tevens aangewezen zijn, bedien ik mij van dezelve, vereenigd met de *Valeriana*, met het beste gevolg:

R_φ. *Rad. Valer. Sylvest.* 3 vj.

— *Rhei* 3 ij—iij.

Infunde c. lib. aq. ferv.

*Vase Clauso, refrig. Cola
et Adde*

Syr. Cort. Aurant. unc. j.

D. S.

Om het uur een half kopje.

In de meer gevorderde tijdperken der koorts is het het beste, de darmbuis van de nog aanwezige stoffen door lavementen te ontlasten, die zacht laxerend en prikkelend zijn kunnen.

De rotachtige complicatie vordert het ruime gebruik der minerale zuren en andere in de behandeling van de rotkoorts met de zenuwachtige complicatie aangeprezene geneesmiddelen.

De catarrhalische of zinkingachtige complicatie, die zich door hoest en andere aandoeningen der ademhalingswerktuigen te kennen geeft, eischt het gebruik van die middelen, welke de *Expectoratie* en huiduitwaseming bevorderen. Het meeste zijn hiertoe geschikt: de spiesglasbereidingen met vlugge, prikkelende middelen gepaard, waar de zwakte onaandoenlijk; met bedarende, waar de lijder zeer prikkelbaar en eene krampachtige gesteldheid aanwezig is; de kwik-

kwikbereidingen zijn vooral daar heilzaam, waar zich de ademhalingswerktuigen in eene ontstekingsachtige gesteldheid bevinden, de zwakte en de gevorderde staat der koorts de antiphlogistische behandeling verbieden; de aftreksels der *Arnica* bloemen en *Senneka* wortel, met *antimonial* bereidingen en vlug loogzout, hebben zich vooral dan zeer werkzaam getoond, wanneer de borst vol, de ademhaling reutelend en benaauwd, en de lijder geene fluimen kan opbrengen;

℞. *Rad. Sennekae*
Flor. Arnic. \bar{a} 3 ij. unc. β,
Infunde c. f. q. aq. ferv.
et Coq. per aliq. momenta,
Colat. unc. viij. adde
Vin. Huxh.
Liq. Corn. Cerv. \bar{a} 3 iß—iij.
Syr. Alth. $\frac{z}{j}$.
M. D. S.

Om het uur een' lepel vol.

Uitwendig legt men vliegenpleisters op de borst, of maakt men inwrijvingen met vlug prikkelende smeersels en zalven.

6^e. *Aanwijzing.* Men bevordere en ondersteune de kritische ontlastingen.

Hoezeer de volkomene kritische ontlastingen in de zenuwkoortsen zelden waargenomen zijn, kan echter haar bestaan en regelmatig plaats grijpen niet geheel geloochend worden, wanneer

neer men de lijders doelmatig behandeld en de krachten toereikend ondersteund heeft.

Waar men zich, bij het voldoen aan deze aanwijzing, het meeste voor te wachten heeft, is, dat men geene toevallige, de krachten uitputtende ontlastingen, voor kritisch houde, en door ze nog meer aan te zetten, den dood des lijders bespoedige.

Een algemeen gelijkmatig zweet is de meest gewone weg, waarvan zich de natuur in deze koorts bedient, om de scheiding daar te stellen. Waar derhalve, in den loop der koorts, de weeke, gelijk warme, eenigzins vochtige huid, een volle, golvende pols neiging tot zweet te kennen geven, bevordere men zulks door zacht zweetdrijvende middelen, waartoe de *Camphor* met vlierconferf, de *Spiritus Mindereri*, de vlug loogzout inhoudende middelen, de *Liquor Cornu Cervi simplex* en *Succinatus*, warme baden en wrijvingen, de meest geschikte opleveren.

Het zweet moet niet overmatig zijn, noch te lang aanhouden, daar het anders de krachten uitput, en ligt eene *colliquative* geaardheid aanneemt.

Zeldzaam zijn in deze koorts andere kritische ontlastingen; waar dezelve mogen voorkomen, den lijder verligten, de toevallen verminderen en de krachten in stand blijven, moet men ze niet onderdrukken, liever de natuur gedurende eenige uren aan zich zelve overlaten, de ge-
neces-

neesmiddelen, welke niet dringend aangewezen zijn, ter zijde stellen, en alleen een' gepasten drank in genoegzame hoeveelheid toedienen; worden de ontlastingen overmatig, dan moet men ze tegengaan, matigen of geheel stoppen.

Menigvuldig komen ook de verplaatsingen in deze koortsen voor; zij komen met die in de rotkoorts zeer overeen, en vorderen dezelfde behandeling.

7^e. *Aanwijzing.* Behandeling der genezenden. Van de beginnende beterfchap tot de volkomene wederkeering der gezondheid, verloopt gewoonlijk een zeer langdurig tijdperk, waarin de lijders zwak, hunne verrigtingen gestoord en eene neiging tot instorting terug blijven, en zij hebben nog zoo lang het toezigt des Geneesheeren noodig. De herstelling der verlorene krachten, en vermindering van alle schadelijkheden, die de koorts zouden kunnen terug brengen, zijn de aanwijzingen, waaraan men voldoen moet.

Tot bereiking van de eerste, bepale men den lijder tot eene voedzame, ligt verteerbare diët, uit krachtige *bouillon*, soepen, vleesch van jonge dieren, rijst en voedzame, vooral wortelgroenten.

Tot gewonen drank late men goed bier gebruiken en geve dagelijks eenige glazen goeden wijn; de versterkende, vooral bittere geneesmiddelen, late men aanhoudend voort gebruiken; de *Kina*, die hier ook het eerste middel blijft, voldoet intusfchen niet in alle gevallen

aan

aan het daarmede bedoelde oogmerk; waar zij reeds lang en in groote hoeveelheden gebruikt is, zijn de lijders er zoodanig aan gewoon geworden, dat zij volstrekt de krachten niet vermeerdert; waar dit plaats vindt, blijve zij achterweeg, en men geve de bittere en staalmiddelen.

Als de herstellenden zeer vermagerd zijn, en de borst geleden heeft, zijn gefaturceerde afkookfels van de IJslandsche Mos en Salep, en dagelijks eenige glazen versche zoete melk, bijzonder heilzaam, daar zij de voedende stof in eene groote hoeveelheid bevatten, ligt verteerbaar zijn, en niet prikkelen.

Ter vermijding van schadelijke invloeden moet men in acht nemen, wat er in het algemeen over den leefregel bij herstellende koortslijders gezegd is. Vooral drage men zorg, dat zich de lijder, zoo ras het zijne krachten toelaten, bij helder en droog weder matig in de opene lucht bewege, en daarbij naar evenredigheid der temperatuur behoorlijk gekleed zij. Men onderhoude eene aangename gemoedsgesteldheid, door goed gezelschap, aangename prikkeling der zinnwerktuigen, menschlievende behandeling, voorkoming zijner wenschen, en zij behulpzaam, om ze op eene gepaste wijze te bevorderen. Van alle sterk vermoeijende lichaamsbewegingen moet hij zich wachten, als mede van zielsaandoeningen, studie, en veel denken, vooral over moeilijke onderwerpen.

§. 3.

*Symptomatische koortsen.*A. *Gastrische koortsen.*

(*Febris Gastrica, Abdominalis, Intestinalis
Mesenterica*).

Koortsen, die haren oorsprong uit stoffelijke oor- Bepaling.
zaken in de eerste wegen ontleenen, of daardoor
onderhouden worden, noemt men *gastrische*. Deze
stoffelijke oorzaken kunnen van buiten door den
mond in het spijsverteringskanaal worden gebragt,
of de voortbrengfelen eener ziekelijk gewijzigde af-
scheiding in de maag, de darimbuis, in de lever en
alvleeschklier zijn: naarmate het eerste of het twee-
de geval plaats heeft, noemt men ze oorspronkelijk-
ke, eenvoudige (*Febris gastrica simplex, Idiopa-
thica*), of toevallige (*Febris gastrica symptomatica*).
Bij de eerste gaat de gastrische gesteldheid vooraf,
en is de eenigste oorzaak der koorts, die nalaat,
zoo ras hare oorzaak opgeruimd is. Bij de tweede
gaat de koorts vooraf; deze en de gastrische ophoo-
pingen zijn twee voor zich bestaande ziekte-toestan-
den, die zich gelijktijdig of achtereenvolgend ontwik-
kelen, en zoo naauw vereenigen, dat zij zich slechts
als één ziektevorm voordoen.

De-

Karakter. Deze uit een plaatselijk lijden der spijsverteringswerktuigen en koorts zamengestelde ziekteform, kan het rotachtige, zenuwachtige, of ontstekingsachtige karakter aannemen, eenen remitterenden of tusschenpoozenden *typus* houdende.

Verdeeling. Volgens den aard der stoffelijke oorzaken, en het lijden van bijzondere deelen, verdeelt men de gastrische koorts gevoegelijk in vier onderscheidene foorten:

- 1°. De eenvoudige gastrische koorts (*Febris saburrhalis*), met ophooping van onverteerbare, of bedorvene spijsen, en andere in de maag gebragte afgescheidene stoffen.
- 2°. Galkoorts (*Febris biliosa*), met aandoening der lever, vermeerderde en ziekelijk gewijzigde galafscheiding.
- 3°. Slijmkoorts (*Febris pituitosa*), met ziekelijke gesteldheid der slijmafscheidende klieren, voornamelijk van het voedingskanaal, met vermeerderde en veranderde slijmafscheiding.
- 4°. Wormkoorts (*Febris verminosa*), met wormen en slijm in de eerste wegen.

I. Gastrische koorts. (*Febris saburrhalis*).

Bepaling. Eene aanhoudende of tusschenpoozende koorts, met ophooping in de eerste wegen, van vreemd-aardige stoffen, die door de spijsverteringswerktuigen niet kunnen bewerkt, onschadelijk gemaakt en ontlast worden, de hulp der kunst behoeven, om ze

te

te ontlasten, daar zij, als eene stoffelijke oorzaak, de koorts voortbrengen, onderhouden en verslimmeren.

Sporadisch vindt men ze in alle jaargetijden, on- Karakter.
der alle volksklassen en iederen ouderdom, voornamelijk echter bij kinderen, bij lieden, die eene zwakke maag hebben, en bij hen, die zich met ongewone en zeer zware spijsen voeden. Zij heerschen dikwijls epidemisch, maar zijn alsdan meer toevallig dan oorspronkelijk, en alle andere koortsen gaan alsdan met gastrische toevallen gepaard. In het voor- en najaar vindt men ze het meest.

De oorspronkelijke gastrische koorts is doorgaans Verdel-
ling.
eenvoudig, en gegrond in de ziekelijke wederwerking op de vreemdaardige prikkels in de eerste wegen; zij duurt slechts eenige dagen en wordt door ontlastingen genezen.

In de toevallige gastrische koorts gaat aan de gastrische gesteldheid de koorts vooraf, of die gesteldheid komt toevallig daarbij, of is een gevolg der aandoeningen in de spijsverteringswerktuigen, welke door eene voorafgegane koorts voortgebracht zijn, die de spijsverteringswerktuigen door zwakte, of door ziekelijk afgescheidene vochten overladen, buiten staat stellen, het daarin bevatte te bewerken en te verteren; de hierdoor ontstane ophoopingten worden steeds nog vermeerderd, en de nieuwe scheikundige veranderingen, welke zij meer en meer ondergaan, hebben ten gevolge, dat zij, wegens hare verre afwijkende menging van de stoffe, door de darmbuis in den gezonden toestand bevat, als zeer schadelijk-

ke prikkels inwerken en de koorts onderhouden. De koorts, waarmede deze toestand gepaard gaat, kan eene ontsteking-, rot- of zenuwkoorts zijn. Zij is langdurig, meer of minder gevaarlijk, en de geneeskundige behandeling moet aan meer, dan ééne aanwijzing voldoen.

Toeval-
len en
loop der
koorts.

Bij de oorspronkelijke gastrische koorts zijn de koortsachtige bewegingen gering, de pols is niet zeer snel, de koorts begint met ligte koude rillingen, die met vliegende hette afwisselen; het aangezicht wordt beurtelings rood en bleek, er ontstaat zware hoofdpijn, pijn in de lendenen en ledematen. De lijders klagen over drukking, spanning, en volheid in de maagstreek, zijn daarbij misfelijk, hebben neiging tot braken, walging tegen alle spijsen en dranken, met uitzondering van zuren en koud water. Stinkende oprispingen; vuile, smerige tong; onaangename, papachtige smaak; opspanningen van winden; verstopte buikontlasting; drooge huid; spaarzame ontlasting van troebele, sterk ruikende pis, zijn de meest gewone toevallen. Tusschen den derden en zevenden dag, somwijlen vroeger, zelden later, ontstaat er een vrijwillig braken of buikloop, met ruime stofontlastingen, waarna de toevallen verdwijnen, de koorts, die gewoonlijk des avonds verheft, ophoudt; de lijder gevoelt zich, uitgezonderd de zwakte en ontbrekenden eetlust, hersteld. Waar de genoemde toevallen zonder koorts aanwezig zijn, noemt men het eene gastrische ophooping (*Affectio gastrica localis*, *Indigestio*, *Cruditates*, *Saburrha primarum viarum*); wanneer na de ontlasting der

op-

opgehoopte stoffen de koorts voortduurt, neemt zij het karakter van eene rot- of zenuwkoorts aan, en moet als eene zoodanige behandeld worden.

Bij de symptomatistische gastrische koorts zijn de gastrische toevallen zwaarder, duurzamer, en houden langer aan; de hoofdpijn is zeer hevig, de lijder wordt doof, ijlhoofdig; hij klaagt over hevige, vliegende pijnen, er ontstaan stuiptrekkingen, somwijlen *apoplectische* toevallen; de buik zwelt sterk op, is zeer heet en pijnlijk, de buiksonstlasting hardnekkig verstopt, of er is buikloop met ontlasting van zwarte, groenachtige, scherpe en zeer stinkende stoffen. De koorts is hevig, hare verheffingen zijn gewoonlijk in den namiddag en na middernacht; gelijktijdig zijn er toevallen aanwezig, welke aan hare bijzondere karakters eigen zijn. De ontlastingen nemen de gastrische toevallen weg, de lijder gevoelt zich voor eenigen tijd verligt, maar de koorts duurt voort, en ontwikkelt zich met de haar eigene toevallen, volgens het karakter van eene ontstekingsachtige, rot- of zenuwkoorts.

Zwakke der spijsverteringswerktuigen, groote aan- Oorza-
doenlijkheid, zeer opvliegende gemoedsgesteldheid, ken.
verblijf in warme vochtige oorden, in hospitalen, Voorbe-
gevangenhuisen en schepen, het einde van den zo- schikken-
mer, zittende leefwijze, aanhoudend denken bij de.
schralen en zwaren kost, deelen aan het menschelijk
ligchaam eene bijzondere voorgeschiedheid voor deze
koorts mede.

Toevallige oorzaken zijn: het overvloedig genot van Toevalli-
spijzen en dranken van eene zeer zamengestelde berei- ge.
ding,

ding, flechte en bedorvene voedfels, als vleesch, dat reeds bedorven, of van dieren aan ziekte gestorven, herkomstig is, stinkende visch, oesters, mosselen, eieren,lecht brood, van bedorven graan gebakken, of met schadelijke zelfstandigheden, uit winzucht, vermengd; alles wat met tegenzin en walg genuttigd wordt. Dezelfde spijs, met smaak gegeten, bekomt wel; terwijl die, met tegenzin gebruikt, onverteerd blijft en gastrische ophoopingën veroorzaakt.

Vermeerderde afscheiding dier vochten, welke tot de spijsvertering noodig zijn, zoodat dezelve van de natuurlijke gesteldheid afwijken, en zoo wel in hoeveelheid, als hoedanigheid tot een' vreemden en ziekmakenden prikkel worden, komen ook hier in aanmerking; ook schijnen er verplaatsingen van zekere stoffen naar de eerste wegen plaats te kunnen hebben, die gastrische ophoopingën veroorzaken.

Naaste
oorzaak.

De naaste oorzaak is gelegen in de prikkelende inwerking der vreemdaardige stoffen, op de zeer aandoenlijke en hoogst gevoelige oppervlakte van het voedingskanaal.

Voorzeg-
ging.
(Prognosis).

De eenvoudige gastrische koorts is voor zich niet gevaarlijk, de voorzegging meerendeels gunstig, de gevallen, waarin eene al te zeer opgevulde maag eene doodelijke beroerte ten gevolge heeft, hoogst zeldzaam. Zij, die in eene andere koorts overgaat, of een zamengesteld karakter heeft, is met meer of minder gevaar verbonden, en moet beoordeeld worden volgens de beginfelen, bij de voorzegging van ieder koortskarakter vastgesteld.

Het

Het hoofdzakelijke der geneeskundige behandeling ^{Geneeswijze.} bepaalt zich tot het opruimen of ontlasten der ma- ^{(Metho-} teriëele oorzaken der koorts, door het gebruik van ^{duis me-} braak- en buikzuiverende geneesmiddelen. De eer- ^{dendi).} ste zijn aangewezen in het begin der koorts, wanneer de bedorvene stoffen, die te ontlasten zijn, zich als onverteerbare overblijffelen of bedorvene stoffen in de maag bevinden. De teekenen, welke dit aanwijzen, zijn: misfelijkheid, neiging tot braken, stinkende oprispingen, onaangename reuk uit den mond, wit, geelachtig beslag op de tong, dat er eenigermate los opzit, gevoel van volheid, spanning en drukking in de maagstreek, eene kloppende beweging en hette, hoofdpijn boven de oogen, bleek, betrokken aangezicht en bevingen van de bovenlip.

Inwendige etterzakken, voorafgegane bloedspuwing, bloedvloeiingen uit de baarmoeder, breuken, zwangerheid, zijn zoo vele tegenaanwijzingen, en verbieden het gebruik der braakmiddelen, waar zij anders zouden aangewezen zijn.

Tot braakmiddel bedient men zich van den braakwijnsteen, of den braakwortel, alleen of met elkander vereenigd, op de reeds vroeger opgegevene wijze; bij kinderen, zwakken en zeer aandoenlijke gestellen komt alleen de braakwortel te pas.

Laxeermiddelen zijn aangewezen, waar de koorts niet meer in haar eerste tijdperk, reeds eenige dagen geduurd heeft, de vreemdaardige stoffen zich niet meer in de maag bevinden, maar reeds in de darmbuis zijn overgegaan, of zich van het begin af

daarin bevonden hebben; bij ophoopingingen, uit ziekelijke afscheidingen herkomstig, heeft dit bijna altijd plaats.

De toevallen en kenteekenen, welke haar gebruik en nuttigheid aanwijzen, zijn, opgespannen heete buik, zonder misfelijkheid en neiging tot braken, rommelen in den buik, opspanningen van winden, ontlastingen van zeer stinkende winden, hette en jeukte aan den *aars*, perfsingen met weinig of geene ontlasting, verstopte buik, hevige dorst, weinig beslagen tong en bevende onderlip, angst, benaauwdheid, korte, afgebrokene, hijgende ademhaling.

De keuze der ontlastmiddelen regelt zich naar de bijzondere gesteldheid des lijders, de meerdere of mindere ontlasting, die men bedoelt, in de bijzondere gelijktijdig aanwezige geaardheid der koorts. Bij jonge, volbloedige, anders gezonde en sterke lieden, vermijde men de verhittende, sterk prikkellende laxermiddelen, en bepale zich tot de Tamarinde, *Cassia*, Manna, oplosfende *Extracten*, en Middenzouten, met bijvoeging der Sennebladen. Bij zwakke, zeer trage gestellen en ingewanden, bij bejaarden met drooge en zeldzame ontlastingen, als zij gezond zijn, geve men de Rabarber of Jalappe met Middenzouten:

℞. *Fruct. Tamarind.*
Mann. Calab. ā unc. j.
Fol. Sennae. ʒ iij.
Infunde c. s. q. aq. ferv.
et Coq. per aliq. momenta,
Colat. unc. vj. Adde
Sulphat. Sodae. unc. ʒ—j.
M. D. S.

Om het uur een kopje.

℞. *Pulv. Rad. Rhei.* ʒ j. *vel*
— Rad. Jalapp. ʒ ij.
Cremor. Tart.
Sachar. alb. ā ʒ ij.
M. F. pulv. div. in vi part. aeq.
D. S.

Om het uur een' poeder.

In de gecompliceerde gastrische koortsen komen in de ontstekingsachtige, de verkoelende; bij de rotten zenuwachtige, de prikkelende laxeermiddelen, voornamelijk de Rabarber, te stade.

Wanneer, na het gebruik van het eerste braak- of laxeermiddel, de toevallen verminderen, en zich later weder verheffen, wijzen zij aan, dat alles nog niet ontlast is, wat er ontlast moet worden; men herhaalt dezelve, derhalve, nog één of meermalen, totdat er aan deze aanwijzing volkomen voldaan is. Na het braakmiddel is het dikwerf noodig, nog een laxeermiddel toe te dienen, doordien een gedeelte der bedorvene stoffen, vóór en gedurende het bra-

ken, uit de maag in de darmbuis is overgegaan. Als de braak- en laxermiddelen geene genoegzame uitwerking hebben, en de gastrifche toevallen blijven voortduren, dan zijn de zoogenaamde oplosfende geneesmiddelen (*resolventia*) aangewezen, om de ftoffen tot de ontlasting voor te bereiden en gefchikt te maken.

Hoezeer aan dezelve de uitgebreide nuttigheid, die de vroegere Geneesheeren gewoon waren hun toe te kennen, geenszins toekomt, kan er echter van de andere zijde niet ontkend worden, dat zij in vele gevallen niet alleen nuttig, maar volftrekt noodzakelijk zijn kunnen.

De *Extracten* van graswortel en paardenbloemen, met kleine giften braakwijnsteen, het *Ammoniak*-zout, oplosbare wijnsteen, bitter zout, enz., zijn de werkzaamfte en meest gebruikelijkfte. Als er gelijktijdige toevallen aanwezig zijn, die een braak- of laxermiddel aanwijzen, kan men beide middelen toedienen, op zulk eene wijze met elkander verbonden, dat zij te gelijk aan beide aanwijzingen voldoen. Bij fterke robuſte geſtellen, en waar er veel op eene ſpoedige en ruime ontlaſting aankomt, kan men zich van deze, voor zwakke en zeer aandoenlijke geſtellen te hevig werkende geneesmiddelen bedienen. Gewoonlijk kiest men daartoe eene oploſſing van een ſterk purgerend middenzout met braakwijnsteen:

R₂.

R_o. *Sulphat. Magnes.* unc. i—iſſ.

Tartrit. Potasf. Stibiat. gr. iij.

Aq. Coct. unc. x.

Syr. Simpl. unc. j.

M. D. S.

Om het half uur een kopje, totdat er eenige brakingen gevolgd zijn.

Gedurende dat men de ontlastende geneeswijze volgt, moeten de lijdens niets eten, zich eenige dagen van spijs geheel onthouden, of ten hoogste een weinig gestoofde groenten of vruchten nuttigen. Waterachtige, met plantenzuren gemengde dranken, zijn, in ruime mate en naar welgevallen des lijdens toegediend, nuttig.

Eene zuivere gastrische koorts geneest gewoonlijk, wanneer de ontlastende geneeswijze niet overdreven, noch verwaarloosd wordt, op deze wijze alleen en volkomen; de lijder heeft geene andere geneeskundige voorschriften in acht te nemen, dan dat hij nog eenige dagen zware en vette spijsen vermijde, en zich tot eene ligt verteerbare en voedende diët bepale, alvorens hij tot zijne gewone voedfels en beroepsbezigheden terug keert.

De ontlastende geneeswijze al te werkdadig aangewend, en te lang volgehouden, doet de gastrische koorts ligtelijk in eene rot- of zenuwachtige ontaarden, niet door rotting en bederf van overig geblevene, niet ontlaste stoffen, maar door uitputting van krachten, en overmatig verlies van vochten.

Waar na voorafgegane matige ontlastingen de

krachten spoedig afnemen, de lijder zeer over afgematheid klaagt en de koortsverheffingen spoediger elkander volgen en meer aanhouden, dan heeft men dezen uitgang steeds te vreezen. De beredeneerde Geneesheer, die zich meer door het verstand, dan door theoretische stellingen laat befluren, stelt dan de ontlastmiddelen ter zijde, en tracht door de versterkende en opwekkende geneeswijze het kwaad in zijne beginselen te stuiten; ongelukkig is het doorgaans voor den lijder, zich onder zulke omstandigheden in de behandeling van eenen Geneesheer te bevinden, die, ook wakende, van niets, dan van schoonmaken, laxeeren en purgeren droomt, die tevreden schijnt, als hij maar verzekerd kan zijn, dat zijn lijder met schoongemaakte ingewanden ten grave daalt.

De grootste omzigtigheid in het gebruik der ontlastmiddelen kan dikwijls niet verhoeden, dat het tijdperk der genezing met een' algemeenen en bijzonderen toestand van zwakte der spijsverteringswerktuigen gepaard gaat, die eene bijzondere behandeling vordert.

De zwakte en daarvan afhankelijke werkeloosheid der spijsverteringswerktuigen maakt de bittere geneesmiddelen en de *Kina* noodig, hetzij in de gedaante van *Extracten*, afkookfels of *Tincturen*; deze laatste zijn vooral bij zoodanige lijders aangewezen, die in hunne gezonde dagen gewoon zijn wijn en andere geestrijke dranken in ruime hoeveelheden te gebruiken:

R_p. *Ext. Rad. Gent.* ʒ ij.

Aq. dest. Menth. Cr. unc. viij.

Syr. Cort. Aur. unc. j.

Liq. Anod. m. H. ʒ j.

M. D. S.

Om de twee uren een' lepel vol.

R_p. *Tinct. Lign. Quass.*

— *Cort. Aur.* ā unc. ij.

D. S.

's Daags viermaal een' paplepel vol met witten wijn.

De algemeene zwakte bereikt zelden eenen hoo-
gen graad, en herstelt zich het spoedigst, wanneer
de eetlust terugkeert, het genotene wel verdragen
en verteerd wordt, de diët tot ligt verteerbare en
voedende spijsen bepaald blijft; eenige glazen goe-
den wijn dagelijks, en de straks genoemde bittere
geneesmiddelen maken, in de meeste gevallen, alle
andere hulpmiddelen onnoodig.

Bij de herstelden blijft nog een geruime tijd
eene sterke neiging tot instorten terug; de minste
fout in den leefregel is daartoe eene genoegzame
oorzaak: het is uit dien hoofde noodzakelijk, dat
de herstelde een' zeer regelmatig en leefregel in acht
neme, alle zware spijsen, vooral die, welke men
weet, dat de lijder ook in gezonde dagen niet wel
verdragen kan, vermijde; daarnevens moet men de
buiksontlasting in het oog houden, die in dit tijd-
perk gewoonlijk traag is, om, waar het de omstan-
digheden vorderen, door de Rabarber met de bit-
tere middelen te vereenigen, dagelijks open lijf te
hou-

houden. Veel en sterk laxeerden in dit tijdperk is hoogst schadelijk, en kan ligtelijk de oorzaak van recidiven, en andere meer belangrijke ongesteldheden der buiksingewanden worden.

II. *Galkoorts.*

(*Febris Biliosa*).

Bepaling. Koorts, die met eene ziekelijke gesteldheid der galafscheidende werktuigen verbonden is, waardoor eene, zoo wel in hoeveelheid als hoedanigheid ziekelijk gestelde gal afgescheiden wordt, noemt men eene galkoorts.

Karakter. Matige koorts, met een' remitterenden of tusschenpoozenden, hoogst zeldzaam met een' volstrekt aanhoudenden *Typus*; de verheffingen hebben 'snamiddags en tegen den avond plaats, zij is met weinig gevaar verbonden, en beslist zich meerendeels binnen tien dagen, door kritische brakingen en buikloop; duurt zij langer, dan grijpt gewoonlijk de overgang in eene rot- of zenuwkoorts plaats. Zij komt sporadisch voor, heerscht veelal epidemisch; in warme vochtige landstreken is zij endemisch. Zij wordt zelden in het voorjaar en in den winter, meest in den winter en in het najaar, na voorafgegane zeer heete weêrsgesteldheid, waargenomen. Lieden van een galachtig temperament, zij, die aan den invloed der weêrsveranderingen het meeste blootstaan, en diegenen, welke zich met zware en vette spijs voeden, zijn het meeste aan haar onderworpen. De meest in het oog loopende toevallen geven eene ziekelijke gesteldheid der galafscheidende werktuigen

te kennen, gepaard met toevallen en verschijnselen, die eene ontstekingsachtige, rot- of zenuwachtige gesteldheid der vaste en vloeibare deelen aanwijzen. Uit dien hoofde verdeelt men ook de galkoorts in de ontstekingsachtige (*Febris biliosa inflammatoria*), de rotachtige (*Febris biliosa putrida*), en de zenuwachtige (*Febris biliosa nervosa*).

Bedorvene spijsvertering, ^{verloopers.} mangel aan eetlust, bittere smaak, geelachtig beslagene tong, stinkende adem, afwisselende koude en hette, loomheid, hoofdpijn, vooral in het voorhoofd, pijn in den rug, lendenen en het dikke der beenen, opgespannen buik, rommelingen van winden, duizelingen, geelgekleurde huid, en vooral het wit van de oogen, gaan eenige dagen aan de volkomene ontwikkeling der koorts vooraf, somwijlen echter ontstaat zij ook plotseling.

Gewoonlijk heeft de eerste koortsaanval des morgens ^{Loop der galkoorts.} plaats; dezelve begint met koude rillingen, of sterke koude, die uit den rug schijnt voort te komen, met bevingen der ledematen; de daarop volgende hette is hevig en brandend, de hoofdpijn zeer zwaar; gedurende de hette is de pols vol, hard en schielijk, het aangezicht rood en opgezet, met een' geelachtigen weerschijn; de oogen staan flauw en met tranen; de dorst is zeer groot; de lijders zijn begeerig naar zure en koude dranken. Deze eerste koortsaanval eindigt met ruim zweet, zonder verligting der aanwezige toevallen. Na eenen meer of minder volkomen' koortsvrijen tusschentijd van twaalf, vier en twintig, zes en dertig, twee en

ze-

zeventig uren, komt de aanval met meerdere hevigheid terug, en blijft voor het vervolg aanhouden, nalaten, of tusschenpoozen, met een' daagschen, anderendaagschen, of derdendaagschen *Typus*; de dubbele derdendaagsche komt intusschen wel het meeste voor.

De koortsaanvallen en verheffingen houden lang aan, loopen in elkander, en bootsen eene aanhoudende koorts na, met duidelijke en regelmatige remisfiën. In den verderen loop wordt de *Typus* onduidelijk en onregelmatig; tegen het einde der koorts neemt hij gewoonlijk weder een' regelmatigen loop aan; de verheffingen komen 's morgens en 's avonds; vroeg in den morgen en 's namiddags neemt de hette, onrust en ijlhoofdigheid af.

Haar duur is verschillend, volgens den aard, de hevigheid en den *Typus* der koorts. De aanhoudende galkoorts duurt zelden langer dan vijf of zeven dagen, de remitterende van zeven tot een en twintig, de tusschenpoozende van drie tot zeven aanvallen, de derdendaagsche wordt gewoonlijk slepend en duurt zeer lang.

Zij beflist zich op eene gunstige wijze, door galbrakingen, buikloop, sterk en algemeen zweet, of ruime ontlasting van hooggekleurde pis, met zetsel van eene donker gele kleur. Deze ontlastingen hebben op onbepaalde dagen plaats, en zijn niet regelmatig aan de kritische dagen gebonden. Waar deze ontlastingen ontoereikende zijn, of geheel achterwege blijven, gaan de galkoortsen meerendeels in eene rot- of zenuwachtige, tusschen den vijftienden en een

een en twintigsten dag over. Somwijlen grijpt ook de overgang in andere ziekten, van eene slepende geaardheid, met aandoeningen van enkele deelen plaats, die men gewoon was aan de verplaatfing der gal toe te fchrijven; meerendeels zijn het ontstekingen van eene roosachtige geaardheid, van de herfenen, de longen, de buiksingewanden, en vooral van die der fpijsvertering. Verhardingen en ont-aardingen der lever zijn dikwijls de overblijffelen der voorafgegane galkoorts, en wel bijzonder dan, wanneer zij ondoelmatig met te weinig of te veel ontlastmiddelen is behandeld geworden; later hebben deze tering, waterzucht, chronifche buikloop, bedorvene fpijsvertering, enz. ten gevolge, waaronder de lijders fpoediger of langzamer bezwijken. De herstelden blijven lang zwak, de fpijsvertering gebrek-kig, de hoofdpijn houdt nog een' geruimen tijd aan, en de lijders zijn zeer genegen tot recidiven.

De toevallen zijn: bittere, onaangename, walgende ^{Toeval-} fmaak, geen eetlust, geelachtig beflagene tong, tanden ^{len.} en lippen, eerst vochtige, naderhand drooge mond; misfelijkheid, ftinkende oprispingen, brakingen met weinig of geene ontlasting van gal, zonder verligting, woedende hoofdpijn, die ook in de remisfiën en tufchenpoozingen aanhoudt, dikwijls in eene raaskallende ijlhoofdigheid overgaande; hevige dorst, heete, brandende, drooge huid, bij het afgaan der koortsverheffingen en aanvallen en tegen het einde der koorts, ruim zweet, gele kleur, vooral op die deelen, welke eene dunne opperhuid hebben. De omtrek der lever en maag is gespannen, hard, zeer pijnlijk bij het

het aanraken, warmer dan natuurlijk, in de hoogere graden kloppend, met stekende pijnen in den omtrek van het middelrif en in de borst; de lijders klagen over pijn in de regter zijde, in eene half maansgewijze strekking. De gezwollene lever is uitwendig voelbaar, de omtrek der galblaas zeer pijnlijk, de buik verstopt. In de verder gevorderde tijdperken, ruime galontlastingen door braken en buikloop, gele, saffraankleurige pis, met een dik hooggekleurd zetsel; groote angst, onrust en benaauwdheid, algemeene of plaatselijke geelzucht, magteloosheid, groote zwakte, de pols schiekelijk en vol, en de aanvallen hard, tegen het einde der ziekte, klein en zwak.

De gal, die door brakingen en buikloop ontlast wordt, is in hoeveelheid en hoedanigheid zeer verschillend; de hoeveelheid kan buitengemeen groot zijn. Zij is alsdan ligtgeel, bruin, zwart of grasgroen, dik en taai, of dun, zuur en scherp, veroorzaakt een brandend gevoel, en ontsteking in den flokdarm, de keel en mondholte, maakt de tanden loof, bruist met koolzure middenzouten op, en werkt op andere dieren als een vergif; somwijlen echter wijkt zij weinig of niet aan hare natuurlijke menging en eigenschappen af.

In de lijken vindt men de lever doorgaans opgezwollen, groot, met vochten opgevuld, van kleur en zelfstandigheid veranderd; de galvaten vol gal, en de maag en darmbuis bevatten mede eene groote hoeveelheid daarvan.

Behalve de opgenoemde toevallen zijn er nog vele
an-

andere, minder standvastige, die dan eens bij dezen, dan bij genen lijder voorkomen, en waar zij aanwezig zijn, een consensueel lijden van het zenuwstelsel aanwijzen, of hunnen grond hebben in de prikkeling, die de opgeslurpte gal, of eene te groote hoeveelheid harer bestaandeelen in het bloed, op het vaatstelsel uitoefenen. Ijlhoofdigheid, krankzinnigheid, zenuwtoevallen, stuiptrekkingen, benaauwde ademhaling, hoest, stekende pijnen op de borst, bekend onder de benaming van galachtig zijdewee (*Peripneumonia biliosa*), zijn onder deze toevallen de meest gewone.

Zeer onderscheiden en veelvuldig zijn de oorzaken, die eene ziekelijke gal-afscheiding, en bijgevolg eene galkoorts, kunnen voortbrengen. Voorgeschiedt om er door aangedaan te worden, zijn het meeste zij, die eene zeer aandoenlijke en prikkelbare lever hebben, waardoor de afscheiding in dezelve ligtelijk veranderd en gewijzigd kan worden, lieden van een cholerisch en melancholisch temperament, van eene driftige en eerezuchtige gemoedsgeaardheid.

De *toevallige oorzaken* zijn: heete, vochtige lucht, groote hette in den zomer en herfst, met koude nachten, en moerasuitwasemingen, eene eigenaardige gesteldheid des dampkrings, een bijzonder *miasma*; Hevige en aanhoudende gemoedsaandoeningen, toorn, schrik, vrees, angst, verdriet, beledigingen, te leur gestelde hoop; slechte, vochtige woonplaatsen, die tegen de veranderingen der seizoenen niet genoegzaam beschutten; aanhoudende, sterke vermoeijensissen, of geheele werkeloosheid; aanhoudend

waken ; zware , onverteerbare , vette , fcherpe , gerookte , gezoutene , ongegiste meel- en andere fpijzen ; misbruik van verhittende , geestrijke dranken en kruiderijen ; gastrifche ophoopingten , die men aan zich zelve heeft overgelaten ; onmatig gebruik van braak- en laxeermiddelen ; uitwendige beleedigingen en wonden , vooral van het hoofd , en herfenontftekingen ; de beet van zekere vergiftige dieren , voornamelijk van eenige flangen en adders.

Hoe grooter de vooraf aanwezige aanleg tot deze ziekte is , en hoe meerder er van deze fchadelijkheden gelijktijdig bijeen zijn , zoo veel te fpoediger zal zich eene galkoorts ontwikkelen.

Naaste
oorzaak.

De naaste oorzaak der galkoorts is fteeds eene ziekelijke gefteidheid en af fcheiding in het leverftelfel , die het meest met eene ontftekingachtige gefteidheid van andere af fcheidende werktuigen overeenkomt , en waarbij tevens eene te groote hoe veelheid van de zamenftellende deelen van de gal in het bloed aanwezig is. Iedere ontfteking van een af fcheidend werktuig gaat met vermeerderde af fcheiding gepaard , na een kortftondig tijdperk , gedurende het hevigfte der ontfteking , waarin de af fcheidingen onderdrukt zijn ; met afwijkingen in de hoedanigheid van het afgefcheidene vocht , hetwelk , wanneer de ontlasting uit het ligchaam niet onmiddellijk , maar , gelijk hier het geval is , in eene bijzondere vergader- en bewaarplaats en in andere ingewanden uitgeflost wordt , door zijnen vreemdaardigen en zeer fterken prikkel , de ziekte-
ver-

verschijnselen vermeedert, de koorts onderhoudt en verslimmert.

In de galkoorts, zonder een duidelijk ontwikkeld, ^{Voorzeg-}ontsteking-, rot- of zenuwachtig karakter, is de ^{ging.}voorzegging steeds gunstig, want voor zich sluit deze koorts geen gevaar in. Eene verkeerde behandeling en plaats grijpende complicatiën maken haar gevaarlijk en doodelijk, de voorzegging rigt zich dan naar het karakter der koorts, volgens het eigendommelijke zijner verschijnselen en toevallen.

Bij jonge volbloedige lijdens heeft er meerendeels eene wezenlijke ontsteking in de lever plaats, die zeer genegen is, in ontaarding van dit ingewand over te gaan, waarvan de gevolgen den lijder nog over lang naar het graf slepen.

Bij zwakken, uitgeputten en kwaadsappigen, is de overgang in rot- en zenuwkoortsen zeer gewoon; maar vooral heeft men dezen ongunstigen keer te vreezen, wanneer de toevallen zeer hevig, hardnekkig, aanhoudend, en de galachtige ontlastingen geene of slechts zeer geringe en kortstondige verligting te weeg brengen.

Goed is het daarentegen, wanneer de ontlastingen de toevallen verligten, en gelijktijdig de koorts minder wordt, met duidelijke remisfiën en intermisfiën, regelmatig wederkeerende koortsverheffingen en aanvallen.

In het begin der koorts heeft er niet zelden eene krampachtige gesteldheid in de galbuizen plaats, die de gal terug houdt, en hare ontlasting in den twaalfvingerigen darm belet, zoodat de toegediende braak-

en laxeermiddelen weinig of geene gal ontlasten; eerst nadat deze kramp bedaard is, ontledigt zij zich in groote menigte, en wordt door ruime brakingen en buiksontlastingen uitgeworpen. Deze toestand kan den Geneesheer ligtelijk misleiden, om de koorts voor zwaarder en gevaarlijker te houden, dan zij wezenlijk is, en hem tot eene verkeerde behandeling vervoeren.

De meest in het oog loopende toevallen en verschijnselen, welke eene galkoorts aanwijzen, zijn somwijlen bedriegelijk, daar zij toevallig en de gevolgen van andere ziekelijke gesteldheden zijn kunnen; of zij ontbreken geheel en al, terwijl eene wezenlijke galkoorts aanwezig is. Deze praktische daadzaken zijn voor den beoefenenden Geneesheer ten hoogste belangrijk, daar zij hem even zeer waarschuwen tegen de fout, om de galkoortsen te loochenen, als tegen het vooroordeel beveiligen, om den oorsprong van alle ziekten uit de gal af te leiden.

Genees-
wijze.

De galkoorts is steeds eene zamengestelde ziekte, waarin eenige deelen oorspronkelijk, andere alleen consensueel, lijden; haar karakter is zoo verschillend, dat zij dan eens alleen een gevolg der vreemd-aardige prikkeling van de darmbuis is, en ophoudt, zoo ras deze prikkel verwijderd is, dan weder een bepaald karakter heeft, dat voor zich bestaan kan, en alleen met de galachtige gesteldheid zich verbonden heeft, wanneer er te gelijk aan meer dan aan ééne indicatie moet voldaan worden.

Over het geheel genomen, vordert eene doelmatige behandeling der galkoorts, van de zijde des

Ge-

Geneesheeren, meer omzigtigheid en juiste kennis van den aard der aandoeningen van de bijzonder lijdende deelen, dan velen wel gelooven, die in den waan verkeerden, reeds genoeg te doen, wanneer zij braak- en laxermiddelen voorschrijven en vlijtig herhalen. Eenzijdigheid en stelselzucht heeft in deze koorts veel kwaad gedaan, en misbruiken in de beoefenende geneeskunst gebragt, die eene gezuiverde ervaring in geene jaren geheel heeft kunnen weren. Dan eens moest de gal de oorzaak van alle ziekten zijn, dan weder geheel uit de rij der ziekmakende oorzaken verbannen worden, totdat men eindelijk, nu, daar de hevigste twisten, uit leerstellige en bespiegelende opvattingen ontsproten, bedaard zijn, tot de waarheid wederkeert, de gal als ziekmakende oorzaak hare plaats aanwijst, zonder dat men de gesteldheid der galaffcheidende werktuigen, die eerst moet veranderd zijn, alvorens haar produkt ziekelijk worden kan, uit het oog verliest.

Als aanwijzingen, waaraan in de kunstbehandeling moet voldaan worden, laten zich de volgende vaststellen:

- 1°. De overvloedige in de darmbuis uitgestorte, ziekelijk gestelde, gal moet ontledigd worden.
- 2°. Men moet de plaatselijk lijdende galaffcheidende werktuigen tot haren gezondheidsmatigen toestand terug voeren, om daardoor den verderen voortgang der ziekelijke afscheiding te verhoe-den.
- 3°. De behandeling regelt zich naar het bijzondere karakter der aanwezige koorts.

R 3

4°. Men

4°. Men tracht de zwaarste toevallen te bedaren.

5°. Behandeling der herftellenden.

Eerste Aanwijzing. Aan deze voldoet men, door den weg, dien de natuur aanwijst, en waarheen zij hare pogingen wendt, te volgen. Vele der aanwezige toevallen geven te kennen, dat zij zich van de galophooping tracht te ontdoen, hetzij door braken of buikloop. Dit noemt men het *turgesceren* der stof, naar boven, of naar beneden: volgens de meening der vroegere Geneesheeren moest hierop voornamelijk gelet worden, en de behandeling in dier voege ingerigt zijn, dat de stoffen naar de darmbuis geleid werden, en het *turgesceren* bevorderden, waar zulks door de natuur nog niet geschied was, alvorens men dezelve ontlasten mogt.

De teekenen, welke het *turgesceren* naar boven aanwijzen, dat is, dat zij geschikt zijn door een braakmiddel ontlast te worden, zijn: drukking in de maagstreek, misfelijkheid, walging, neiging tot braken, dikwijls uitspuwen, drukkende hoofdpijn, duizeligheid, zweet in het aangezicht, bevende bovenlip, koude handen en voeten, flaauwten, los opzittend beslag der tong, en galbraken. Het *turgesceren* der stof naar beneden wordt aangewezen: door zwaarte in de lendenen en kniën, tuschenpoozenden pols, opgezette onderbuik, opspanningen van winden, pijn in den buik, met een gevoel van zwaarte langs den loop van het dwarsche gedeelte des karteldarms, dat de lijdens door de benaming van een' band aanwijzen; aandrang tot buikontlasting, perlingen, flikkeren voor de oogen, be.

bevende onderlip, plotfeling uitbreken van een plaatselijk of algemeen zweet, met een bijzonder gevoel van zwakte en afgematheid. Zonder in de fout te deelen, die men aan de vroegere Geneesheeren berispt, dat zij het voortbrengfel der ziekte voor hare naaste oorzaak, of de koorts zelve hielden, mogen de practifche, daaruit afgeleide regelen, in geenen deele verzuimd worden.

De genoemde toevallen en verschijnselen zijn het, die aanwijzen, of een braak- of laxermiddel voor den lijder noodig of nuttig zij, onverschillig of men daarbij het turgesceren der stof voor iets wezenlijks of denkbeeldigs beschouwen wil; waar zij niet aanwezig zijn, komen de ontlastmiddelen hoogst zeldzaam te pas, maar het is alsdan noodig, gedurende één' of meer dagen, de oplosfende geneesmiddelen toe te dienen, om de stoffen voor de ontlasting voor te bereiden of geschikt te maken, of, zoo als het de oudere Geneesheeren noemen, te doen turgesceren. De ervaring zal wel iederen onpartijdigen Geneesheer genoegzaam overtuigd hebben, dat de oplosfende geneesmiddelen in vele gevallen noodzakelijk zijn, dat, zonder derzelver voorafgegaan gebruik, de braak- en laxermiddelen weinige of geene uitwerking doen; dat zij echter niet alleen op de stoffen in de maag en darmbuis inwerken, ze op eene chemifche wijze oplossen, en tot ontleding geschikt maken, wordt toereikende daaruit bewezen, dat zich hare nuttigheid alleen tot het eerste tijdperk der galkoorts bepaalt, wanneer het leverstelsel in een' met de ontstekingsachtige gesteld-

heid overeenstemmenden toestand verkeert, de afscheiding eer verminderd dan vermeerderd is, en er bij gevolg nog geene gal in de darmbuis kan ontlast zijn. Hunne werking schijnt uit dien hoofde meer sympathetisch te zijn, waardoor de vermeerderde werkdadigheid van de lever afgeleid, in het spijskanaal opgewekt, en de krampachtige gesteldheid der galvaten en galbuizen bedaard wordt. Het gevolg hiervan is, vermeerderde afscheiding en gemakkelijke ontlasting in den twaalfvingerigen darm; het turgesceren der stof heeft dan plaats als een gevolg der galophooping (Colluvies biliosa). Ook schijnen de zoogenaamde oplosfende geneesmiddelen uit dien hoofde nog nuttig te zijn, dat zij de trage werking der darmbuis opbeuren, en daardoor het opgehoopte taaije slijm, dat hare inwendige oppervlakte bedekt, — een toestand, die geenszins zeldzaam met de galkoorts gelijktijdig bestaat, — losmaken, ter ontlasting voorbereiden, en deszelfs verdere afscheiding tegenwerken.

Volgens datgene, wat tot hiertoe gezegd is, laat zich nu gemakkelijk de geneeskundige behandeling, die de galkoorts ten opzigte der eerste aanwijzing vordert, ontwikkelen en vaststellen.

Als de stof naar boven *turgisceert*, ondersteunen men de pogingen der natuur, door een braakmiddel uit den braakwijnsteen, den braakwortel, of door beide middelen vereenigd. Bij kinderen, vrouwen, zeer zwakke en aandoenlijke gestellen, verdient de laatste; daar, waar het tegendeel plaats heeft, de eerste den voorrang. Heeft men eene ruime en
spoe-

spoedige ontlasting ten doel, dan vereenige men beide met elkander.

Turgesceert de stof naar beneden, dan geve men een laxeermiddel uit de middenzouten, met Manna, Tamarinde, Sennebladen of Rabarber. De hevig werkende drastische laxeermiddelen zijn te vermijden, want wegens hunne sterk prikkelende eigenschappen vermeerderen zij den toevloed der vochten naar de spijsverteringswerktuigen nog meer, en kunnen ligtelijk tot ontstekingen aanleiding geven, behalve dat zij ook de krampachtige gesteldheden der ziekelijk gewijzigde afscheidende werktuigen vermeerderen.

Wanneer de toevallen van dien aard zijn, dat zij het turgesceren der stof, tevens naar boven en naar beneden, aanwijzen, dan kunnen braak- en laxeermiddelen, met elkander vereenigd, zeer gevoegelijk gegeven worden: men late een Braak-laxeermiddel (*Emetico catharticum*) uit een middenzout en braakwijnsteen nemen, dat eenige ontlastingen naar boven en naar beneden bewerkt:

R. *Sulphat. Magnes. unc. j.*
Tart. Potas. Stibiat. gr. iij.
Aq. Coct. ℥ viij.
Oxym. Simpl. ℥ j.
M. D. S.

Om het half uur twee lepels, totdat er eene genoegzame werking gevolgd is.

Waar de natuur het braken uit zich zelve bewerkt, en sterk genoeg is de stoffen te ontledi-

gen, behooren de braakmiddelen achterweeg te blijven; het is alsdan reeds genoeg, dat men hetzelfde, door drinken van warm water met een weinig zout, flappe thee, aftreksel van Kamille, Munt, Melisse, enz. onderhoude en bevordere, totdat alles ontlast zij, wat tot de ontlasting geschikt is. Hetzelfde heeft plaats ten aanzien van den buikloop, dien de natuur bewerkt, om zich zelve te helpen; ook hier vermijde men hevig werkende laxeermiddelen, ondersteune alleen de natuur, waar de ontlastingen niet toereikende zijn mogten, door dranken uit afkooksels van Tamarinde, met *Cremor Tartari*, wei van melk met zuurachtige zouten vervaardigd; ook kunnen kleine giften van Rabarber met Magnesia, of waar de snijdende pijnen hevig zijn, de eerste met *Ipecacuanha* en Arabische Gom, of in *Tinctuur*, bijzonder bij vrouwen en kinderen, gebezigd worden:

R ϕ . *Pulv. Rad. Rhei* 3 ℥.

Magn. Alb. 3 i—ij.

Aq. Chamm. unc. viij.

Syr. Altheae. unc. j.

M. D. S.

Om het uur een' of twee lepels vol.

R ϕ . *Tinct. Rhei Aquos.* unc. ℥—j.

Aq. Menth. Crisp. unc. v.

Syr. Coct. Aur. unc. j.

M. D. S.

Om het uur een' pap- of eetlepel vol.

Waar

Waar het braakmiddel door tegenaanwijzingen, als braken, bloedspuwingen, zwangerheid, organische gebreken, enz. verboden wordt, moet het achterweeg blijven; de ontlasting der vreemde stoffen behoort dan alleen door laxeermiddelen te geschieden. Hoezeer het in vele gevallen, het braakmiddel ter pas gegeven, genoegzaam is, de ophooping in de eerste wegen op te ruimen, de koorts weg te nemen, en alle andere geneesmiddelen onnoodig te maken, gebeurt het toch ook menigwerf, dat zich de eerst verminderde toevallen den volgenden dag weder verheffen, en een tweede braakmiddel noodzakelijk maken, of dat na hetzelfde de in de darmbuis aanwezige gal verder door laxeermiddelen moet ontlast worden.

Waar de ontstekingstoevallen zoo hevig zijn, dat zij eene aderlating vereischen, moet deze steeds aan het braak- of laxeermiddel voorafgaan, zoo als het eerste aan het tweede.

Eene hevige ontsteking onderdrukt even zeer de afscheidingen, als zij door eene matige bevorderd worden. Zoo lang dus de galafscheidende werktuigen in eenen hoogen graad ontstoken zijn, zal er ook geene gal in de darmbuis kunnen aanwezig zijn; hier heeft dan die toestand plaats, bekend onder de benaming der raauwheid, onbewegelijkheid, het niet turgesceren der stof. De pols is dan gewoonlijk zeer snel, de huid brandend heet, de dorst hevig, algemeen gele kleur, bittere smaak, een vastzittend geelachtig beflag der tong, saffraankleurige pis, het linnen geelverwend zweet, stekende

de pijnen in de regterzijde, die zich tot in de borst uitbreiden, hoest met geelgekleurde fluimen; alle afgescheidene vochten geven 'een' overvloed van galachtige bestaandeelen in het bloed te kennen, die een gevolg is der verminderde afscheiding in de lever, waarvan zich de natuur door wijzigingen der andere afscheidende werktuigen tracht te ontdoen. Niet altijd echter is deze toestand het gevolg eener ontstekingsachtige gesteldheid, maar zeer dikwijls krampachtig. Bij jonge, anders gezonde, sterke, volbloedige lieden heeft doorgaans de eerste; bij zeer prikkelbare, aandoenlijke en hartstogtelijke, bij een cholerisch en melancholisch temperament, bij zwakken en bejaarden, het laatste plaats. In beide gevallen komen de ontlastmiddelen niet te pas, daar er alsdan nog niets te ontlasten is, en zij meer schadelijk dan nuttig zijn zouden.

Matige bloedontlastingen door aderlatingen of bloedzuigers in de leverstreek, verkoelende geneesmiddelen, ook onder den naam van oplosfende bekend, zijn alsdan te bezigen; vooral de Extracten, middenzouten en spiesglasbereidingen:

R_x. Ext. Taraxac. f. Ext. Gramin. ā unc. β—j.

Tart. Potasfæ Stibiat. gr. ij.

Sal. Polych. vel alius Sal. Neut. ʒ iii—vj.

Aq. Coct. unc. viij.

M. D. S.

Om het uur een' lepel vol.

Tegen de krampachtige gesteldheid zijn verzachtende dranken en lavementen, des morgens en
s avonds

's avonds eene gift *Opium* of *Ext. Hyosciami*, aangewezen, en het meeste geschikt om de kramp spoedig te bedaren.

Waar gelijktijdig eene slijmachtige gesteldheid en werkeloosheid in het spijskanaal aanwezig zijn, stel-
le men, in de plaats der straks genoemde oplosfende
middelen, het *Sal Amoniak* en *Oxymel Squilliticum*,
waarvan men in dit geval het meest te verwachten
heeft:

R_ç. *Ext. Taraxaci* unc. j.

Muriat. Amon. ʒ ij.

Aq. Coct. unc. viij.

Oxym. Squill.

Syr. Simpl. ā unc. j.

M. D. S.

Om het uur twee lepels.

Als nu, na het gebruik van deze of gene midde-
len, de toevallen en ziekteverschijnselen de geschikt-
heid der stof om ontlast te worden aanwijzen, geeft
men een braak- of laxermiddel, en herhaalt ze,
waar het noodig is.

Groot is het misbruik, dat er in de geneeskunst
met de oplosfende middelen bedreven wordt; men
zij derhalve steeds indachtig, dat het lang volge-
houdene gebruik der braak-, laxeer- en oplosfende
middelen, ook aan de gezondste voorwerpen gege-
ven, eindelijk in de spijsverteringswerktuigen die ge-
steldheid voortbrengen, welke aan de gastrische en
galkoortsen beantwoordt.

De toevallen, welke het turgesceren der stof naar
bo-

boven aanwijzen, en een braakmiddel noodig maken, bepalen zich gewoonlijk tot de eerste vijf dagen; zelden zijn de gevallen, waarin zij in de latere tijdperken der koorts voorkomen; waar zulks intusfchen het geval zijn mogt, kan men het braakmiddel, in welk tijdperk de koorts ook staat, zonder vrees toedienen; maar men vergeete niet, dat misfelijkheid en neiging tot braken niet altijd de noodzakelijkheid voor een braakmiddel aanwijzen; in den gevorderden staat der koorts zijn het dikwijls zeer onaangename toevallen, door misbruik der ontlastende en oplofende geneeswijze voortgebracht, die men op alle mogelijke wijze moet trachten te bedaren, door alles te vermijden, wat dezelve zoude kunnen vermeerderen. Het geheel der toevallen met oplettendheid gadegeflagen en overwogen, zullen, in de meeste gevallen, de beftaande twijfelingen, omtrent het al of niet gebruik van het braakmiddel, wegnemen, en ons duidelijk den weg aanwijzen, dien men te volgen heeft.

De laxeermiddelen zijn minder door het eene of andere tijdperk der koorts, maar meer door haar karakter bepaald; tot aan haar einde kunnen zij noodig en nuttig zijn. Eene matige buiksontlasting, tot twee of drie malen 's daags, gedurende den gheelen loop der koorts onderhouden, hoe ook haar karakter wezen moge, bekomt aan de lijders doorgaans zeer wel, en bevordert het meeste hunne volkomene herftelling.

Wat den leefregel, ten aanzien van het fpijsgebruik, betreft, zal het naauwelijks noodig zijn, hier-

hiervan te gewagen, daar de ontlastingen, die men daarstellen moet, en de ontbrekende eetlust, dezelve geheel onnoodig, en zelfs schadelijk doen zijn. Als de lijder dringend vraagt iets te gebruiken, mag men hem alleen drooge beschuit en gestoofde vruchten, met uitzondering van al het overige, veroorloven.

Tot drank zijn in de galkoorts de zuurachtige verdunnende aangewezen, en stemmen het meest met den smaak der lijders overeen. Wei van melk met Tamarinde of Wijnsteen vervaardigd, Limonade, sappen van rijpe vruchten met water verdund; afkookfels van gerst of rijst met *Oxymel*, stillen den dorst, verbeteren den onaangename smaak, en ondersteunen de aangewezene geneeswijze. Aan wijn-drinkers en aan hen, die door de voorafgegane ontlastingen zeer verzwakt zijn, kan men eene matige hoeveelheid Rijnsehe of andere zuurachtige wijnen tot hunnen gewonen drank bijvoegen.

Ligte galkoortsen worden op deze wijze, gewoonlijk in een kort tijdsbestek, genezen, zonder dat er iets meer te doen overig blijft, dan den lijder eene regelmatigte, ligt verteerbare en voedende diëet voor te schrijven. Zijn de spijsverteringswerktuigen zeer verzwakt en ontbreekt de eetlust, dan is het eene of andere bitter, gedurende eenige dagen, waarin zij zich gewoonlijk herstellen, aangewezen. In zware gevallen is de behandeling meer zamengesteld, meer omvattend en uitgebreid. Het hiertoe behorende zal in de opgaaf der behandeling voor de overige aanwijzingen gezegd worden.

2^c. Aan-

2e. *Aanwijzing.* „ De plaatselijk lijdende galafscheidende werktuigen zijn tot hunnen gezondheidmatigen toestand terug te brengen, ten einde den verderen voortgang der ziekelijke afscheiding te verhoeden.”

De uitgestorte gal in de darmbuis, als het produkt der ziekelijk gewijzigde afscheiding in de lever, en niet als de naaste oorzaak der koorts beschouwende, vraagt men, van welken aard is deze gesteldheid der galafscheidende werktuigen? Daar zij niet alleen te veel, maar tevens eene gal afscheiden, die van den gezonden toestand afwijkt, kan zulks niet alleen, gelijk velen willen, aan eene vermeerderde of verminderde, maar moet meer aan eene veranderde werkdadigheid, die dan tevens kan vermeerderd of verminderd zijn, toegeschreven worden. Zoo wel de geschiedenis der galkoorts, als het gevondene in de lijken der daaraan overledenen, waarbij ik het wage, ook mijne eigene ervaringen te noemen, leveren, mijns bedunkens, de onwederlegbaarste bewijzen voor dat gevoelen. Waarin deze veranderingen eigenlijk bestaan, en hoe zij door eigenaardige geneesmiddelen regtstreeks tot den gezonden toestand teruggebragt worden, weten wij niet; zoo veel kan er intusschen voor meer of minder zeker gesteld worden, dat de prikkelbaarheid van het leverstelsel verhoogd is; dat de zenuwen eenen zeer gewigtigen invloed op het voortbrengen van deze veranderingen uitoefenen; dat er een vermeerderde toevloed van vochten plaats heeft; en dat het geheel van dezen toestand het mees-

meeste aan eene ontstekingsachtige gesteldheid beantwoordt.

Het duistere en onzekere, dat zoo wel in het eene als andere nog overig blijft, en de ontoereikende kennis, die wij van de naaste en laatste werking der geneesmiddelen hebben, laten ons voor de beoefenende geneeskunst niet veel meer, dan de empirische aanwending van die geneesmiddelen, welke ons de ervaring als nuttig en heilzaam heeft leeren kennen, en waaruit de voorschriften, die hun gebruik regelen, ontleend zijn.

Dat de oplosfende en ontlastende geneeswijze krachtig medewerken, om de ziekelijk gestelde galafscheidende werktuigen, waarin het naaste der galkoorts schijnt gegrond te zijn, tot de gezondheid terug te voeren, is overvloedig bewezen, door de goede uitwerkingen, die er de Geneesheeren in alle epidemiën van gehad hebben.

Door de prikkelende inwerking, die zij op het spijskanaal uitoefenen, wordt de verhoogde prikkelbaarheid van het lijdende leverstelsel afgeleid, en deszelfs vermeerderde werkdadigheid, door de opwekking van die der darmbuis, verminderd. De vermeerderde toevloed van bloed naar de sterker geprikkelde deelen bevrijdt de lever van hare overvloedige vochten; de daarop volgende ruime afscheiding van vochten in de darmbuis bedaart de afscheiding in de lever, en werkt mede, om de ontstekingsachtige gesteldheid weg te nemen. De invloed, die gelijktijdig op de zenuwen uitgeoefend wordt, heeft de

opwekking van fympathetifche en confenfueele betrekkingen ten gevolge, die medewerken, om eene veranderde ftemming in het galaffcheidende ftelfel te weeg te brengen.

Bij eene duidelyk ontwikkelde ontftekingachtige gefteeldheid, gelijk zij, vooral bij epidemiën, dikwyls gevonden wordt, zijn er bloedontlaftingen, door aderlatingen en bloedzuigers, noodig; maar zij behooren alleen in het eerfte begin der koorts gebezigd te worden, en aan het gebruik der ontlastende middelen vooraf te gaan.

Lavementen, die niet te zeer prikkelen en de buiksontlafting matig bevorderen, zijn mede nuttig, daar zij de vermeerderde werkdadigheid meer naar den dikken darm heenleiden. Zij zijn derhalve bijzonder dáár aangewezen, waar de darmbuis, in haar bovenfte gedeelte, zeer prikkelbaar en aandoenlyk is, de ontlast- en oplofende geneesmiddelen eene te hevige wederwerking ten gevolge hebben, die zich confenfueel aan de lever mededeelt, en deze middelen dus juist het tegendeel bewerken van dat, wat men eigenlyk bedoelde.

Eene Spaanfche vliegenpleifter, in de nabijheid van het ontftokene deel gelegd, brengt de ontfteking tot bedaren, het aanhoudend verbinden echter met prikkelende zalven wekt haar weder op, en doet ze voortduren, zoo lang als niet derzelfver gebruik aanhoudt. Op deze wijze verklaar ik mij de groote nuttigheid, die vele Geneesheeren van de vliegenpleifter, in den omtrek der lever gelegd, gezien hebben, en het na-
deel,

deel, dat zij volgens anderen, door verslimmering der toevallen, gehad hebben; omdat men ze ten onpas aanlegde, en te lang in ettering hield.

De bedarende geneesmiddelen, het *Opium*, de *Hyosciamus*, de *Ipecucuanha*, enz. zijn krachtige hulpmiddelen, doordien zij de prikkelbaarheid verminderen en eene verandering in de verrigtingen des galaffcheidenden stelsels te weeg brengen. Bij ontstekingen en volbloedigheid zijn zij schadelijk, bij eene zeer geprikkelde en galachtige gesteldheid de schielijkste hulpbrengende geneesmiddelen. Zij moeten in geene te groote giften, niet meer dan van een $\frac{1}{4}$ of $\frac{1}{2}$ grein, eenige malen 's daags toegediend worden, in een afkookfel van slijmachtige zaden of wortelen; daarbij moet men de buikontlasting door lavementen in stand houden, en alle prikkelende geneesmiddelen ter zijde stellen.

Hebben wij in de genoemde middelen de zoodanige leeren kennen, die, door eene veranderde stemming in de prikkelbaarheid en gevoeligheid voort te brengen, de werkdadigheid opwekken, naar andere deelen afleiden, en den toevloed van vochten naar de lijdende deelen verminderen, de plaats hebbende veranderingen in het galaffcheidende stelsel tot de gezondheid terug voeren; nog bezitten wij een gewichtig middel, dat door regtstreeksche inwerking op deze deelen, waarvan wij het *hoe* niet kennen, het vermogen bezit, deze veranderingen daar te stellen. Ik bedoel hier de zachte kwikbereidingen, de *Calomel*, of het zoete kwik tot inwendig, en de inwrijvingen met kwikzalf tot uitwendig gebruik. Reeds

voor lang hadden zij in slepende leverziekten hare
 nuttigheid bewezen, totdat men ze ook, voor on-
 geveer vijf en twintig jaren, tegen de *acute* le-
 verziekten en de galkoorts met geen minder goed
 gevolg beproefde, namelijk in die gevallen, waar
 de lever plaatfelijke aandoeningen ondergaat. Nadat
 de opgehoopte stoffen uit de darmbuis ontlast zijn,
 en het lijden der lever voortduurt, behoort men ze
 nimmer te verzuimen; de giften moeten niet te klein
 zijn, veilig van 5 tot 10 greinen gegeven worden;
 bij zeer prikkelbare gestellen voegt men tot ieder
 gift een vierde tot een heel grein *Opium*; zelden be-
 hoeft men langer dan eenige dagen daarmede vol te
 houden, daar alsdan ook gewoonlijk de aanwezige
 toevallen bedaard zijn, en de lijder zich in het tijd-
 perk der genezing bevindt, om de kwijling te ver-
 hoeden; waar haar gebruik langer mogt noodig
 zijn, geve men tusfchen beiden een laxermiddel uit
 Rabarber met Magnesia, en stelle de kwikbereidingen
 geheel ter zijde, zoo ras de lijder over pijn in den
 mond klaagt, en het tandvleesch rood en opgezwol-
 len is. Wanneer de lever fterk gezwollen en hard is,
 zoodat zij uitwendig kan gevoeld worden, en ook
 in die gevallen, waar men fpoedig eene groote hoe-
 veelheid kwik door onderscheidene wegen in het
 ligchaam brengen wil, of waar de lijders de kwik-
 bereidingen inwendig niet verdragen kunnen, zijn
 de inwrijvingen met de gewone kwikzalf in de le-
 verftreek, van eene halve tot heele drachma, da-
 gelijks twee malen herhaald, vooral niet te ver-
 zuimen; na de gedane inwrijvingen bedekt men

de

de leverstreek met dubbele warm gemaakte wollen doeken.

Stovingen en pappen, uit verzachtende zelfstandigheden bereid, op de leverstreek en den onderbuik gelegd, zijn in de gevallen eener meer ontwikkelde leverontsteking nuttig; buiten deze heb ik daarvan nimmer eenige belangrijke uitwerking gehad.

De Spaansche vliegenpleisters op de leverstreek hebben in het laatste tijdperk der galkoorts somtijds eene zeer goede uitwerking, en werken krachtig mede, om de ziekelijke afscheiding, die nog voortduurt, nadat de koorts geweken is, te herstellen. Voorafgegane ontstekingen, zeer verzwakkend behandeld, in het tijdperk der genezing telkens op nieuw plaats grijpende galophoopingen, eene doffe pijnlijkheid en zwelling in de leverstreek, zijn de aanwijzingen voor haar gebruik; wegens de traagheid in de verrigtingen der lever, die gelijktijdig aanwezig is, doet men wel, om ze eenige dagen open en in verettering te houden: de nadeelen, die men er in het ontstekings tijdperk van te vreezen heeft, en waarvan hier boven gesproken is, zijn hier niet te duchten.

3^e. *Aanwijzing.* „Behandeling der koorts volgens haar bijzonder karakter.”

Over de wijze, op welke aan deze aanwijzing kan en moet voldaan worden, kunnen wij zeer kort zijn, om niet te herhalen, wat reeds bij de behandeling der andere koortsen gezegd is.

Waar de aanwezige koorts, niet slechts in eene,

door de vreemdaardige prikkeling der gal voortgebragte, *reactie* van het vaatstelsel bestaat, maar bepaaldelijk daarnevens een ontstekingsachtig, rot- of zenuwachtig karakter heeft, of in den loop der koorts aanneemt, moet zij ook dienvolgens en in dier voege behandeld worden, dat men de behandeling der galachtige gesteldheid in overeenstemming brengt en aanwendt met die, welke het karakter der koorts aanwijst.

Aderlatingen en antiphlogistische behandeling bezigt men in de *Synocha*, en laat ze aan de braaken en laxermiddelen voorafgaan; met de antiphlogistische geneeswijze, waarbij vooral de zuurachtige dranken te pas komen, laat men zoo lang volhouden, als de koortstoevallen dit karakter aanwijzen; tusschen beide wordt er van de ontlastmiddelen en laxerende lavementen het noodige gebruik gemaakt.

Heeft de koorts het karakter van *Typhus*, dan geve men ten spoedigste een sterk werkend braakmiddel, vermijde buiten volstrekte noodzakelijkheid de laxermiddelen, door de buiksontlasting met lavementen te onderhouden; inwendig geve men die middelen, welke tegen rot- en zenuwkoortsen zijn aangeraden, vooral in verband met zuren en wijn, wanneer de krachten veel geleden hebben.

4^e. *Aanwijzing*. „Behandeling der belangrijkste toevallen.”

Woedende hoofdpijn met raaskallende ijlhoofdigheid, aanhoudend braken, zoodat de maag niets kan binnen houden, en overmatige buikloop, zijn
die

die toevallen , welke bijzonder de aandacht des Geneesheeren , en niet zelden eene bijzondere behandeling vorderen.

De oudere Geneesheeren zochten de oorzaken dezer toevallen in de fcherpte der gal, de overmatige prikkeling van de darmbuis, hare ophooping, en weder terugvoering naar het bloed; de nieuwere in de ziekelijke prikkelbaarheid en gevoeligheid van de darmbuis: meerendeels gaan beide, de eerste en de laatste, gesteldheden met elkander gepaard. Eene doelmatige behandeling van deze toevallen moet niet alleen, gelijk velen willen, ontledigen of zuiveren, noch alleen, gelijk andere willen, de prikkelbaarheid en gevoeligheid veranderen of verzachten; maar beide behandelingen behooren met elkander vereenigd te zijn, en zich wederkeerig te wijzigen.

De confenfueele betrekking, die er tusfchen het hersengeftel en de lever plaats heeft, fchijnt de eenigfte oorzaak der woedende hoofdpijnen en raaskallende ijlhoofdigheid te zijn. Zij zijn gewoonlijk aanwezig, alvorens er zich nog gal in de darmbuis ontlast heeft, en verdwijnen, zoo ras het bijzonder lijden der lever bedaart, hoe groot ook de hoeveelheid gal in de darmbuis wezen moge.

De behandeling der lijdende galaffcheidende werktuigen is derhalve dan ook die, waardoor dit toeval het krachtigst tegengewerkt en bedaard wordt; in tusfchen zijn warme halve baden, zuurdeeg met mostaard en vliegenpleisters aan de voeten en kuitën gelegd, krachtige hulpmiddelen, om, door opwekking

eener sterkerere wederwerking in de huid, die van het leverstelsel af te leiden en te bedaren.

Het braken. Eene te groote gevoeligheid en prikkelbaarheid van de maag, door misbruik der ontlastende geneeswijze, en de vreemdaardige prikkel der in groote hoeveelheid in het spijskanaal uitgestorte gal, zijn zijne gewone oorzaken. De te groote aandoenlijkheid te verminderen, de aanwezige gal te ontlasten, hare prikkelende eigenschap weg te nemen, en hare verdere afscheiding te verhoeden, zijn de aanwijzingen, die men daarbij te volgen heeft. Aanhoudende krampachtige brakingen, met kleinen, harden pols en koude handen, zonder dat er veel meer dan het gebruikte ontlast wordt, geven eene te groote aandoenlijkheid van de maag te kennen. Geneesmiddelen, die veel koolzuur inhouden en hetzelfde ligtelijk loslaten, *Opium* en *Oxydum Bismuthi*, doen in dit geval het braken spoedig bedaren, mits dat men tevens alle prikkelende en voor den smaak der lijders onaangename en walgende dingen vermijde. Fachinger- en Seltzerwater, bottelbier, Champagnewijn, en de meest in gebruik zijnde *Potio Riverii*, gedurende het opbruischen, of volgens het vroeger medegedeeld voorschrift gegeven, ontwikkelen veel koolzuurgas in de maag, en zijn onze krachtigste hulpmiddelen tegen dit toeval.

Het *Opium* geeft men in *Tinctuur* droppelsgewijze met gedistilleerd water, dikwijls herhaald. Het *Oxydum Bismuthi* in een drankje of poeder met Arabische Gom, op de reeds hiervoren breeder omschrevene wijze.

Bit-

Bittere oprispingen, brandend gevoel in de keel, braken met ruime galontlastingen, geven te kennen, dat de scherpe en overvloedige gal daarvan de oorzaak is. De opslurpende aarden met Kamillen aftreksels, of andere aromatische waters, zijn zeer geschikt om het zuur te dempen:

R₂. *Magn. Alb.*
Eleosachar. Chamn. ā 3 ij.
Aq. dest. unc. vj.
Laud. Liq. Syd. gutt. xx.
M. D. S.

Om het uur een' lepel vol.

Gelijktijdig geve men slijmachtige, verzachtende dranken, met een weinig citroenzuur; als de buikontlasting verstoort is, lavementen met azijn; bij hevige pijnen en overmatige ontlastingen, verzachtende lavementen met *Opium*.

Uitwendig zijn inwrijvingen met vlugge prikkelden, of verzachtende en bedarende smeersels en zalven uit *Linimentum Volatile*, *Ung. Althae* met *Opium*, aromatische omflagen, over den geheelen onderbuik, warme baden, Spaansche vliegenpleisters, enz. aangewezen.

De oorzaken, welke den buikloop ten gevolge hebben, zijn dezelfde, als die van de braken, met dat onderscheid, dat zij hier meer op de darmbuis inwerken. In den beginne der koorts is een braakmiddel uit den braakwortel meerendeels het zekerste en doelmatigste middel, om dezelve te bedaren; overigens moet ze met dezelfde middelen op de-

zelfde wijze als het braken behandeld worden. Groote giften *Opium*, die den buikloop plotseling stoppen, zijn in de meeste gevallen hoogst nadeelig, en hebben aanhoudende brakingen ten gevolge, die den lijder in het grootste gevaar storten.

5^e. *Aanwijzing*. „Behandeling der genezenden.”

De herstelden blijven lang zwak, de spijsverteringswerktuigen zeer aandoenlijk, en zeer genegen tot dezelfde ziekelijke afwijkingen; eene weinig beteekenende fout in den leefregel, onder andere omstandigheden, brengt hier reeds *recidiven* te weeg. Het is uit dien hoofde noodig, dat men met omzigtigheid den leefregel der herstellenden vaststelt, en met het gebruik van bittere versterkende geneesmiddelen, tot de volkomene herstelling volhoude, *Kina*, *Cascarilla*, Oranjeschillen, *Alsem* met Wijn, eene ligt verteerbare diët, vermijding van alle vette, zware, moeilijk verteerbare spijsen, matige beweging, rust naar ziel en ligchaam, goede kleeding en ligging, en men zal zeldzaam, — maar waar het tegendeel plaats heeft, zeer dikwijls *recidiven* te bestrijden hebben. De buiksondasting moet, gedurende het geheele tijdperk der genezing, tot één of twee malen 's daags onderhouden worden.

III. *Slijmkoorts*.

(*Febris Pituitosa*).

Bepaling. Eene langdurige, niet zeer hevige koorts, verbonden met eene ziekelijke gesteldheid der slijm-af-

afscheidende werktuigen, voornamelijk van het voedingskanaal, waarbij het afgescheidene slijm, zoo wel in hoeveelheid, als hoedanigheid, van den gezondheidsmatigen toestand afwijkt.

De koorts doorloopt zeer langzaam en traag hare Karakter. tijdperken, zich zelden vóór den een en twintigsten dag, meerendeels tusfchen den acht en twintigsten en veertigsten befliffende; fomwijlen duurt zij van drie tot vier maanden. Haar *Typus* is gewoonlijk remitterende, zeldzaam tusfchenpoozende, met onregelmatige verheffingen en aanvallen, die zich dikwijls alleen door koude rillingen en vliegende hette te kennen geven, en meerendeels bij nacht plaats hebben. De pols is klein, niet zeer fchielijk, fomwijlen langzamer dan natuurlijk en tusfchenpoozend; zij komt fporadifch het meêst bij kinderen, vrouwen en hoog bejaarden voor; het meest in vochtige hutten, bij flecht gekleede en flecht gevoede, bijzonder onder hen, die zich door buitenfporigheden ontzenuwd hebben. Epidemifch heerscht zij in vochtige, lage, moerasfige landftreken, gevangeniften, belegerde plaatfen, in tijden van oorlog, hongersnood, en andere algemeen trefende volksrampen, bij aanhoudend vochtige weêrsgesteldheid in alle jaargetijden, bijzonder in den herfst en winter. Zelden verbindt zich het ontstekingsachtige, meerendeels het rot- en zenuwachtige karakter met de koorts. Overvloedige flijmaffcheidingen en ophooping en in de eerfte wegen, die zich door flijmachtige gesteldheid des bloeds, met flijm vermengde ontlastingen en flijmvloeiingen, te kennen ge-

geven, maken hare kenteekenen uit. Volkomen kritische ontlastingen zijn zeldzaam; het minst zijn het de slijmachtige, die meer toevallig zijn, en gedurende den geheelen loop der koorts zonder verligting veelvuldig plaats vinden; maar gepaard met andere ontlastingen, brengen zij de koorts langzaam tot scheiding. De overgang in gezondheid gaat met traagheid voort; het tijdperk der genezing duurt zeer lang, de lijders blijven buitengemeen zwak, en tot *recidiven* genegen. De slijmkoortsen zijn nimmer geheel zonder gevaar, dikwijls gaan zij in andere ziekten, tering, waterzucht, verstoppingen, algemeene kwaadfappigheid, enz. over. Veelmalen eindigen zij met den dood, als slepende zenuwkoortsen. Het uit de ader gelatene bloed is met eene slijmkorst bedekt, het bloedwater slijmerig. In de lijken vindt men de slijmvliezen gezwollen, vol vochten, met verlengselen, uitgroeiingen en *polypen*; de inwendige oppervlakte der mondholte, tong, van den flokdarm en het spijskanaal, met een dik, zeer taai slijm overdekt.

Loop en
toevallen.

Nimmer tast deze koorts plotseling aan, maar ontwikkelt zich langzaam, met zeer geringe ziekteverschijnselen in den beginne. Dagen en weken, voordat eene versnelde beweging des bloeds koorts aanwijst, gevoelen zich de lijders afgemat, vermoeid, lusteloos, droevig en onverschillig; de slaap verkwikt hen niet, bij het ontwaken hebben zij een' slijmachtigen mond, wit beslagene tong, lassen, onaangename smaak, klagen over misfelijkheid, ontlasten door oprispingen, hoest en brakingen, slijm-

ach-

achtige stoffen , hebben een' onaangenaamen , zuur-
 ruikenden adem , en klagen niet zelden over eene
 slijmprop in de keel , die zij wanen te voelen. De
 eetlust ontbreekt , zij eten zonder smaak , des mor-
 gens weinig of niets , des middags geven zij aan
 sterk gezoute spijzen den voorrang. Na het eten
 vinden traagheid , lusteloosheid , ongeschiktheid voor
 bezigheden , slaperigheid , oprispingen , opgespannen
 buik , volheid in den onderbuik , en verstopte buiks-
 ontlasting plaats. Des morgens veel , het overige
 van den dag geen dorst ; het aangezicht bleek , opge-
 zet , de oogen flauw en vochtig , hoofdpijn , ligte
 koude rillingen met afwisselende vliegende hette ;
 meerendeels drooge huid , zeldzaam zweet , spaar-
 zame pis , de pols blijft langzaam en klein , zelden
 vol en hard. Onder steeds toenemende verslimme-
 ring der toevallen , komen er tusfchen den tienden en
 twintigften dag , tegen den avond en des nachts ,
 duidelijke koortsaanvallen bij , die zich om den
 anderen dag verheffen. De eerste aanvallen zijn ge-
 ring , zij nemen langzaam in hevigheid toe , loopen
 in elkanderen , zoodat men met moeite de remis-
 siën onderscheidt ; de koude rillingen worden ster-
 ker , de daarop volgende hette heviger , de druk-
 kende hoofdpijn zwaarder en aanhoudender , de zin-
 werktuigen onaandoenlijk , met geruisch in de ooren ,
 groote zwakte , kleine , fchielijke pols ; drooge , heete
 huid , fomwijlen voorbijgaand zweet met gierstuit-
 slag , de buik is opgespannen en bij het aanraken pijn-
 lijk. De slijmontlastingen worden overvloediger , en
 hebben door brakingen , buikloop , slijmerige pis ,
 hoest ,

hoest, vloeijing uit de geslachtsdeelen, als goedaardige druiper en witte vloed plaats. De tong en mondholte zijn met een zeer taai slijm bedekt, dat weggenomen zijnde, spoedig weder afgescheiden wordt; de stem is veranderd, hol, moeilijk en vermoeijend, de slijmklieren der mondholte opgezwollen, waardoor deze even als met roodachtige korreltjes bezaaid is; van tijd tot tijd komt er sprouw te voorschijn, die de mondholte, tong en keel bedekt, somwijlen verdwijnt, en telkens weder uitbot. Eindelijk komen er zenuwtoevallen, duizelingen, slape-loosheid of dofheid (*Stupor*) en slaapzucht, ijlhoofdigheid, hik en stuiptrekkingen bij; de lijder sterft, met al de toevallen en verschijnselen van eene volkomen ontwikkelde zenuwkoorts, gepaard met de genoemde toevallen, die den *Status Pituitosus* kenschetsen.

De overgang in gezondheid heeft met herhaalde onvolledige kritische ontlastingen, door buikontlasting, ruime pislozing en zweet plaats, die veel slijm ontlasten; de toevallen verminderen allengskens en van tijd tot tijd, de eetlust keert langzaam terug, en het tijdperk der genezing is zeer langwijlig. Bij den overgang in eene andere ziekte neemt de koorts en de daarmee in een onmiddellijk verband staande toevallen af. De slijmontlastingen duren voort, en de karakteristieke toevallen der ziekte, waarin de overgang plaats heeft, ontwikkelen zich meer en meer.

Oorza- De aanleg (*praedispositio*) tot deze koorts is ge-
ken. grond in zwakte en verminderde veerkracht der
slijm-

slijmafscheidende klieren en vliezen, waardoor zij aan een' vermeerderden toevloed en aandrang der vochten geen' genoegzamen tegenstand bieden. Phlegmatische personen, kinderen, vrouwen, bejaarde lieden van eene zittende leefwijze, gevangenen, bewoners van vochtige oorden, die eene prikkelende, verhittende, werkzame leefwijze plotseling met eene tegengestelde verwisfelen, en die zich door misbruik van sterken drank verzwakt hebben, zijn bijzonder aan deze koorts blootgesteld.

De toevallige oorzaken dezer koorts zijn: natte, koude luchtgesteldheid, vochtige woonplaatsen, flechte, zwaar verteerbare spijsen, aanhoudend gebruik van vet vleesch en spek, ongegiste meelspijze, niet gaar gebakken brood, drooge peulvruchten, enz. treurige gemoedsgesteldheid, en alles, wat verzwakkend op het menschelijk ligchaam inwerkt. Bij epidemisch heerschende schijnt er eene eigenaardige gesteldheid des dampkrings, of een bijzonder *miasma* aanwezig te zijn, dat haar voortbrengt en zoo spoedig en algemeen doet heerschen, als in onderscheidene epidemiën plaats gehad heeft.

De naaste oorzaak der slijmkoorts is gelegen in eene ziekelijke gesteldheid der slijmafscheidende werktuigen, waardoor het produkt harer afscheiding, zoo wel in hoeveelheid als hoedanigheid, veranderd wordt. De vermeerderde wederwerking in het vaatstelsel en de daarmede gepaard gaande koorts schijnt een onmiddellijk gevolg der vermeerderde slijmafscheiding te zijn, zoodat de *Status Pituitosus* en de koorts niet van elkander kunnen afgescheiden en als

bij-

Toevallige oorzaken.

(*Causae Occasionales*).

Naaste oorzaak. (*Causae Proxima*).

bijzonder bestaande gedacht worden. Waarin nu eigenlijk de veranderde toestand der slijmafscheidende werktuigen bestaat, is ons niet minder duister, dan het ons de naaste oorzaken van bijna alle andere ziekten is. Met de meeste waarschijnlijkheid laat zich, mijns bedunkens, deze verklaring geven en aannemen: de inwerkende schadelijkheden brengen, door onderdrukking van andere gewone afscheidingen, of door den prikkel eener eigenaardige stof in den dampkring, een' vermeerderden toevloed van vochten naar de slijmvliezen en klieren te weeg, waarin zij zich, wegens het slappe, losse weeffel dezer deelen, ophoopen en teruggehouden worden; deze opgehoopte vochten brengen door hunne voortdurende prikkeling eene vermeerderde afscheiding te weeg; de groote hoeveelheid der aangevoerde vochten tot de slijmafscheiding niet genoeg voor- en toebeleid, is de oorzaak, dat het produkt zoo zeer van den gezondheidsmatigen toestand afwijkt, gelijk men in bijna alle gevallen van deze koorts gelegenheid vindt waar te nemen.

Voorzeg-
ging.
(*Prognosis*).

De slijmkoorts is steeds met gevaar verbonden, waarom de voorzegging, vooral in haar begin, niet al te gunstig zijn moet. Het gevaarlijkste is zij bij bejaarde, en door buitensporigheden in de leefwijze uitgeputte lieden. De eenvoudige slijmkoorts is minder gevaarlijk dan de zamengestelde, de *complicatie* met wormen maakt haar het gevaarlijkste voor kinderen, met het zenuwachtige karakter voor bejaarden; een gelijktijdig lijden der ademhalingswerktuigen, zonder uitzondering, voor allen; het

in stand blijven der krachten, meer opgeruimde gemoedsgesteldheid, terwijl de ontlastingen wederom meer en meer van hare afwijkingen terugkeeren, en natuurlijk worden; verkwikkende slaap, beginnende eetlust, verminderende slijmafscheidingen, het afvallen en niet weder opkomen der sprouw, voorstellen een' gunstigen uitgang. Voortgaande vermindering der krachten, steeds toenemende slijmafscheidingen, ontlastingen van enkel slijm, ongevoeligheid en onaandoenlijkheid voor de meest aangewezen geneesmiddelen, volstrekt gemis van eetlust, aanhoudend hoesten met slijmontlasting, holle, heesche stem, benaauwdheden en zenuwtoevallen, voorstellen een' ongunstigen, meerendeels doodelijken uitgang.

De geneeskundige behandeling der slijmkoorts is ^{Geneeswijze.} steeds moeilijk en onaangenaam, daar men met onaandoenlijkheid voor de gegevene geneesmiddelen, en ontevredenheid wegens den langen duur der ziekte, te worstelen heeft; zij doen het practische geluk van jonge Geneesheeren dikwijls schipbreuk lijden, en geven dikwijls aan oudere medestanders de schoonste gelegenheid, om den jongen kunstbroeder te veroordeelen. Eene specifieke geneeswijze der slijmkoorts, waardoor de ziekelijke toestand der slijmafscheidende werktuigen onmiddellijk tot de gezondheidsmatige gesteldheid teruggevoerd, en dus de naaste oorzaak bestreden wordt, kennen wij niet. Ook hier moet men, gelijk bij de andere koortsen, waarbij de spijsverteringswerktuigen bijzonder lijden, uit de erva-

T
ring

ring afgeleide regelen voor de geneeskundige behandeling vaststellen, door welker opvolging men in de meeste gevallen slaagt, om dus, zoo al niet regtstreeks, toch op eene middellijke wijze, de koorts te genezen en de gezondheid volkomen te herstellen.

Deze regelen of aanwijzingen zijn de navolgende:

- 1°. Verwijdering der toevallige oorzaken, die nog op den lijder werken, de verdere ontwikkeling der koorts bevorderen, of die ontwikkeling onderhouden.
- 2°. Ontlasting des afgescheidenen en ziekelijk gestelden slijms.
- 3°. Regeling der behandeling volgens het eigenaardige karakter der koorts, en de gesteldheid der krachten.
- 4°. Te zorgen, dat de plaatselijke ziekte der bijzondere deelen weggenomen worde, ten einde de ziekelijke slijmafscheiding tot den gezonden toestand terugkeere.

1e. *Aanwijzing.* Men ontheffe den lijder van de werkingen van al die schadelijkheden, welke het ontstaan der koorts en hare verdere ontwikkeling bevorderen. Drooge, gezonde verblijven, warme kleeding, beweging in de opene lucht, eene voedzame, prikkelende diët, wel gekruide spijzen, eenige glazen wijn, of eene kleine hoeveelheid sterken drank, opgebeurde gemoedsgesteldheid, enz., zijn hiertoe dienstig, dewijl alle meelachtige, vette, zwaar verteerbare spijze, warme, waterachtige dranken, misbruik van geestrijke dranken, te veel rust, lang

lang slapen, overmatige ontlastingen moeten vermeden worden. Dikwijls zal men alleen hiermede slapen, om de koorts in hare eerste beginselen, vóór zij zich volkomen ontwikkeld heeft, te stuiten, of, waar zulks reeds plaats vindt, haren verderen voortgang te verminderen. Nog zekerder zal men slapen, wanneer het gebruik van zoodanige middelen daarmede verbonden wordt, die geschikt zijn, om de aanwezige zwakte der slijmafscheidende werktuigen weg te nemen, ten einde de verdere afscheiding te verhinderen, en het reeds afgescheidene te ontlasten. Bittere middelen, verbonden met de prikkelend-laxerende, als Aloë en Rabarber, zijn daartoe het meest geschikt.

R̃. Ext. rad. Gentian. 3 ij.

Pulv. rad. Rhei. ̃ ij.

Aq. Menth. unc. viij.

Syr. Cort. Aur. unc. j.

M. D. S.

Om het uur een' lepel.

R̃. Aloes Succotrin. ̃ j.

Ext. Absinth. 3 ij.

Pulv. rad. Gentian. q. s.

ut. f. pill. gr. iij. arg.

Obd. D. S.

's Daags 3 of 4 maal vijf pillen.

2^e. *Aanwijzing.* Verwijdering van het voortbrengsel der ziekelijke afscheiding.

In geene der gastrische koortsen is het hoofdzakeker, en eene voorbereidende behandeling algemeene

aangewezen, om datgene, wat er te ontlasten is, daartoe geschikt te maken, dan in de slijmkoorts. Wat zullen in de volkomen ontwikkelde *Status Pituitosus*, waar de geheele inwendige oppervlakte van het spijskanaal met eene dikke korst van taai slijm overtrokken is, en de lijdende deelen hoogst onaandoenlijk zijn, de braak-, laxeer- en prikkelen-de middelen uitwerken, daar zij niet eens met de oppervlakte, waarop zij werken moeten, in onmiddellijke aanraking kunnen komen, en deze bovendien voor hare werkingen ongevoelig zijn? De natuur alleen is niet krachtig en werkzaam genoeg, om de stoffen voor de ontlastingen geschikt te maken, of die, gelijk in andere gastrische koortsen somwijlen nog geschiedt, te asfimeren.

De teekenen eener *turgescerende* stof en de vrijwillige ontlastingen ontbreken derhalve ook meerendeels, de ontlastende geneesmiddelen blijven zelfs zonder uitwerking, wegens de taaiheid en het vast aankleven des slijms, zoo lang men niet, door prikkelende oplosfende middelen, de werkdadigheid der lijdende deelen heeft opgewekt, waardoor de afscheidingen vermeederen en de afgescheidene stoffen dunner, waterachtiger, en meer geschikt zijn, om het taaije slijm op te losfen en tot de ontlastingen te bereiden.

In de eerste tijdperken der koorts, en in derzelver verderen loop, zoo lang het slijm, dat de tong bedekt, vast zitten blijft en zeer taai is, en de teekenen, die het *turgesceren* der stof aanwijzen, ontbreken, bezige men de oplosfende *Methode*. De
daar-

daartoe het meest doelmatige door de ervaring beproefde geneesmiddelen, zijn de fcherpere middenzouten, die prikkelen en weinig laxeren. Het *Sal Amoniac* verdient de eerste plaats onder de loogzouten, welke op eene eigenaardige wijze op de slijmaffcheidende werktuigen zoo wel als op het slijm zelf werken; de spiesglasbereidingen, de kwikmiddelen, de bittere en fcherpe zelfstandigheden, de fpaansche vlieginctuur, welker gebruik echter veel omzigtheid vordert, en alleen in de hoogste graden der koorts bij de grootste onaandoenlijkheid mag aangewend worden.

In de keuze der middelen moet men zich naar de jaren, de bijzondere gesteldheden der lijders, en het ontwikkelde karakter der koorts regelen; met inachtneming der fcheikundige betrekkingen, welke de midden- en loogzouten, en andere chemifche bereidingen, op elkander uitoefenen, ten einde nieuwe verbindingen en zamenftellingen, waardoor de bedoelde werkingen vernietigd, of andere gewrocht worden, die gevaarlijke uitwerkingen hebben konden, vermeden worden.

Het *Sal Amoniak* geeft men van één tot twee drachmen met spiesglasbereidingen in mixturen, of, wegens den onaangenaamen fmaak, in pillen:

Rp. Sal. Ammon. (Muriat. Ammon.) 3 i—iij.

Extr. rad. Helen. 3 iij.

Aq. Coct. unc. viij.

Syr. Cort. Aur. unc. j.

M. D. S.

Om het uur een' lepel vol.

T 3

Rp.

R̄. Muriat. Ammon.

Puly. rad. Arnic. rec. ā 3 ij.

Tart. emet. gr. ij.

Ext. Helen. q. s. ut. f. pill. gr. iij.

Obd. puly. rad. Liquir.

D. S.

Om de twee uren 3 tot 5 pillen.

De loogzouten in een gedistilleerd water opgelost, van één tot drie drachmen alleen, met rabarber of andere prikkelende middelen:

R̄. Alcal. Veget. vel mineral 3 ij.

Puly. rad. rhei. 3 ℥.

Solve

Aq. destil. Menth. unc. vj.

adde

Syr. Cort. Aur. unc. j.

M. D. S.

Om het uur een' lepel vol.

De kwik- en spiesglasbereidingen geeft men alleen met elkander of met andere middelen verbonden, in geene te kleine giften; om eene schadelijke kwijling te verhoeden, moet het gebruik van het kwik niet te lang volgehouden worden:

R̄. Ext. Helen. unc. ℥.

Aq. Cort. Aur. unc. vj.

Vin. Stibiat. 3 i—ij.

D. S.

Om het uur een' lepel.

R̄.

R_ç. *Sulphur. Aurat. Ant.*

Merc. Dulc. ā gr. x.

Sachar. alb. 3 j β.

M. F. pulv. Div. in x part. aeq.

D. S.

Om de twee uren een poeder.

In zeer slepende langdurige gevallen komen vooral de *gummi-soorten*, de *Squilla*, met bittere en laxerende middelen vereenigd, te pasfe:

R_ç. *Gummi Ammoniac.*

Pulv. rad. Rhei.

Sap. Venet. ā 3 j.

Sulphur aur. Ant. gr. x.

Ext. Helen. q. f.

ut f. Pill. pond. gr. iij. obv. pulv. Liq.

D. S.

Drie of vier malen 's daags vijf pillen.

R_ç. *Gummi. Galban.*

—— *Ammon.* ā 3 j.

Pulv. rad. Squill. gr. x.

—— *Arnic. recent.* 3 j.

Oxym. Squill. q. f.

ut f. Pill. pond. gr. iij. inv. pulv. Liq.

D. S.

Om de twee uren vier pillen.

Zoo ras er, gedurende het gebruik van deze middelen, misfelijkheid, walging, neiging tot braken, slijmontlastingen uit den mond, losworden van

sljim , dat de tong bezet , plaats grijpen , geeft men een schielijk en krachtig werkend braakmiddel , uit braakwijnsteen of zeeajuin ; voor kinderen zijn de *oxymel squilliticum* , en wijnachtige oplosfingen van het spiesglas , zoo ook voor zeer zwakke en aandoenlijke gestellen , het meest geschikt. Zelden verdwijnen na het eerste braakmiddel al de sljimtgevallen , maar duren in een' minderen graad voort ; waar dit gebeurt , laat men de oplosfende middelen voortgebruiken , en herhaalt het braakmiddel , zoo dikwijls het voor den toestand des lijders noodzakelijk wordt.

Wanneer , gedurende het gebruik der oplosfende geneesmiddelen , de teekenen eener naar beneden *turgescerende* stof plaats vinden , geve men een laxeer-middel ; uit spiesglas , middenzouten en Rabarber , of de eerste met verzoete kwik en Aloës ; gelijktijdig kunnen er lavementen met *Sal Amoniak* , Braak-wijnsteen , of andere oplosfende geneesmiddelen gebezigd worden.

3e. *Aanwijzing.* Regeling der behandeling volgens het eigenaardige karakter der koorts , en de gesteldheid der krachten.

In welk tijdperk de koorts zich ook bevinden moge , steeds moet deze aanwijzing in het oog gehouden , en de keuze zoo wel als de wijze van toediening der geneesmiddelen diensvolgens geregeld worden. Nimmer kunnen de ontlastmiddelen geheel buiten gebruik blijven , daar zij het wezenlijkste gedeelte der kunstbehandeling uitmaken , en zonder hun

hun de genezing, hoe men dezelve ook beproeven moge, eene ijdele onderneming blijft.

Zelden gaat er met de slijmkoorts het ontstekingskarakter gepaard; waar dit intusfchen nog mogt plaats vinden, is het steeds en alleen in het eerste begin der koorts, gedurende eenige weinige dagen, en daarbij in een' zoo gematigten trap, dat men naauwelijks noodig heeft, eenige veranderingen in de behandeling te brengen. Het voortgezette gebruik der oplosfende geneeswijze, vooral der middenzouten, is toereikende, om den ontstekingachtigen toestand weg te nemen. De noodzakelijkheid eener bloedontlasting kan als eene hoogst zeldzame uitzondering op den regel beschouwd worden, en dan nog behoort zij in het eerste begin der koorts en beperkt te geschieden.

Ook het rotachtige karakter paart zich zeldzaam met deze koorts, en naar mate het zich ontwikkelt, ziet men alle slijmachtige gesteldheid verdwijnen; beide deze ziektevormen volgen meer op elkanderen, en gaan meer in elkander over, dan dat zij, volkomen ontwikkeld, gelijktijdig met elkanderen bestaan.

Het zenuwachtig karakter, daarentegen, ontwikkelt zich altijd meer of minder, indien de slijmkoorts eenigen duur heeft, en niet reeds in zijne eerste wording op eene krachtdadige wijze tegengegaan wordt. Hierin moet dan ook wel voornamelijk de oorzaak gezocht worden, dat wij bij vele schrijvers beide koortssoorten met elkander verwisfeld vinden, die dan eens de slijmkoorts als eene zenuwkoorts, en dan weder de zenuwkoorts als eene slijmkoorts beschrij-

ven. Somwijlen ontwikkelen zich, reeds met de eerste slijmtoevallen, verschijnselen, die het lijden van het zenuwgestel aanwijzen; meerendeels echter heeft dit eerst in de meer gevorderde tijdperken plaats. Ook gebeurt het niet zelden, dat er zich eene volkomene slepende zenuwkoorts ontwikkelt, en naar mate dit plaats heeft, de ziekelijke gesteldheid der slijmafscheidende werktuigen verdwijnt, en weder te voorschijn komt, als de zenuwtoevallen bedaren.

Deze zamengestelde geaardheid vordert ook eene zamengestelde geneeskundige behandeling. Door de oplofende en ontlastende geneeswijze alleen te bezigen, zoude men de zenuwtoevallen tot eene hoogte opvoeren, die de lijder in het graf sleept, alvorens men het voorgestelde doel bereikt. De zenuwmiddelen, alléén gegeven, zouden zonder uitwerking blijven, wegens den bijzonderen toestand der deelen, waarop zij werken moeten. Men vereenige derhalve beide geneeswijzen met elkander, geve de *Arnica*, de *Valeriana*, de *Camphor*, het *Castoreum*, met *Sal amoniak*, de *Squilla*, de spiesglasbereidingen, de *Gummi*soorten, enz., tusschen beiden een braakmiddel; laxeermiddelen vermijde men buiten volstrekte noodzakelijkheid, daar hunne werking meer verzwakt, eenen nadeeligen invloed op de zenuwtoevallen uitoefent, en tot een' uitputtenden buikloop zoude kunnen aanleiding geven; men handelt doelmatiger, de buiksonstlasting door lavementen te onderhouden.

Met de andere gastrische koortsen is de slijmkoorts

koorts gewoonlijk verbonden, geheel zuiver komt zij zeer zelden voor; de epidemifche luchtgefteldheid fchijnt daarop een' zeer grooten invloed te hebben, en de oorzaak te zijn, dat de galachtige en wormtoeftand met den flijmachtigen zoo algemeen voorkomen.

De behandeling ondergaat daardoor weinige of geene veranderingen. Het vroeger gebruik van een braakmiddel, in de galachtige complicatie, als anders bij de flijmkoorts alleen zoude aangewezzen zijn; het gelijktijdig gebruik van wormmiddelen met de oplofende, en onder deze de zoodanige, die tevens krachtige wormmiddelen zijn, en men voldoet aan al de aanwijzingen, welke in deze complicatie behooren voldaan te worden.

Bij het aanhoudend gebruik der oplofende en ontlastende geneeswijze, lette men vooral op de krachten. De flijmachtige gefteldheid op zich zelve is reeds door zwakte, traagheid en werkeloosheid gekenfchetst; het verlies van vochten, een gevolg der vermeerderde affcheidingen, doet de zwakte fteeds toenemen, behalve nog de verzwakkende werking der geneesmiddelen, en het laat zich ligtelijk inzien, hoe noodzakelijk het is, in deze koorts de krachten in het oog te houden. Menig een voorbeeld zoude er uit de gefchiedenis dezer ziekte kunnen bijgebracht worden, waarin de oplofende geneeswijze, te hevig en te langdurig aangewend, ten laafte zelfs de banden heeft opgelost, die ziel en ligchaam verbinden.

Het

Het gebruik 'der oplosfende en matig ontlastende geneeswijze fluit geenszins de versterkende geneesmiddelen uit; het is geene dwaasheid, gelijk men wel eens gewild heeft, maar een door de ervaring geftaafd overleg, dat beide geneeswijzen en geneesmiddelen, tot het meeste voordeel der lijdens, met elkanderen verbonden aangewend worden: waar derhalve de krachten zeer verminderd zijn, fteeds afnemen, en er gelijktijdig teekenen plaats hebben, die het voortdurende gebruik der oplosfende en ontlastende middelen vorderen, geve men onbescroomd de *Kina*, de *Cascarilla* en andere bittere aromatische geneesmiddelen, vereenigd met Rabarber, *Extract. Taraxaci*, *Tart. Emet. Vin. Antim: Sal Amoniak* of andere middenzouten, met die voorzorgen, dat zij geene overmatige ontlastingen te weeg brengen, waardoor anders de versterkende middelen, te spoedig door de darmbuis gevoerd, geen' tijd voor hunne werking vinden, en nutteloos weder ontlast worden.

Hebben er uitputtende ontlastingen plaats, dan moeten dezelve door opwekkende, stoppende en bedarende middelen tot ftaan gebragt, en zoo lang alle oplosfende en ontlastende middelen ter zijde gefield worden. De *Rad. Columbo*, de *Lopeziana*, de Kaneel, de *Simaruba*, kleine giften *Opium* en roode wijn zijn in dat opzigt de krachtigfte hulpmiddelen.

Bij deze indicatie vergete men niet, dat de natuur eene zekere maat van krachten behoeft, om eene ziekte tot fcheiding te brengen en op eene gunstige wij-

wijze te beflissen; en dat de ontlastingen eerst alsdan de gewenschte uitwerking hebben kunnen, wanneer de werktuigen de verrigtingen, waarvoor zij bestemd zijn, met eene zekere kacht en levendigheid ten uitvoer brengen.

4^e. *Aanwijzing*. Men trachte de ziekelijke gesteldheid der slijmafscheidende werktuigen tot de gezondheid terug te voeren, om de vermeerderde en verminderde slijmafscheiding te doen ophouden.

De eigenaardige werkingen van zekere schadelijkheden op de slijmafscheidende werktuigen, waardoor hunne verrigtingen zoodanig gewijzigd worden, dat eene ziekelijke afscheiding daarvan het onmiddellijke en noodwendige gevolg is, geeft het regt, om te vooronderstellen, dat er ook geneesmiddelen zijn, die even bepaald op deze werktuigen in hunnen ziektestaat werken, en tot de gezondheid terugbrengen. Maar voor als nog zijn ons zoodanige geneesmiddelen der slijmkoorts genoegzaam onbekend, en wij kunnen ons in de behandeling, in dat opzigt, alleen tot eene doelmatige aanwending der algemeene geneeswijze bepalen.

De oplosfende geneesmiddelen, en onder deze bijzonder het *Sal Amoniak*, de loogzouten en *Gummi*soorten, schijnen wel eenigzins dit vermogen, eene regtstreeksche werking op deze werktuigen te oefenen; daar zij echter ook in andere ziektevormen nuttig zijn, kan men hun, met evenveel waarschijnlijkheid, dit bijzonder vermogen betwisten, en hunne uitwerkse-
len aan algemeene eigenschappen, waardoor zij de
be-

werktuiging aandoen, toeschrijven. De ontlastende geneesmiddelen schijnen insgelijks, behalve het opruimen van het voortbrengfel der ziekte, eene veranderde stemming in de ziekelijk afscheidende werktuigen, door hunne prikkeling en schokkende bewegingen, voort te brengen, en den terugkeer tot den natuurlijke toestand te bevorderen.

Eene gepaste toediening derhalve der algemeen aangewezene oplosfende, ontlastende en versterkende geneeswijze en leefregel, omvat alles, wat ter voldoening van deze indicatie kan geschieden.

Bij de genezing moet vooral daarvoor gezorgd worden, dat er geene ziekelijke slijmafscheidingen terugblijven, en men alles vermijde, wat dezelve op nieuw zoude kunnen veroorzaken. Alle eene slijmachtige gesteldheid bevorderende schadelijkheden, trachte men zoo veel mogelijk te verwijderen; men onthoude aan den lijder meelspijzen, drooge peulvruchten, aardappelen, vette en zoete spijsen, kaas, visch, enz., en beperke zijne diët met welgekruiden spijsen, scherp prikkelende planten, versch vleesch, bittere bieren, kruiderijen, vooral mostaard en peper, en dagelijks eenige glazen goeden wijn; oesters, verse haring en ansjovis kunnen met mate, bij wedergekeerden eetlust, toegestaan worden. Waar de eetlust ontbreekt, en de lijders nog zwak zijn, late men *Kina*, bittere en staalmiddelen in genoegzame hoeveelheden, tot de volkomene herstelling, voortgebruiken; recidiven, langdurige ziekten, de ontwikkeling van plaatselijke slepende ge-

gebreken worden daardoor tegengegaan en meerendeels verhoed.

IV. *Wormkoorts.*

(*Febris Verminosa.*)

Eene meerendeels onregelmatige met zenuwtoeval- Bepaling.
len gepaarde koorts, met eene stoffelijke oorzaak in
de eerste wegen, bestaande in wormen en slijm,
noemt men eene wormkoorts.

De wormkoorts komt meest sporadisch, zeldzaam, Karakter.
doch somwijlen epidemisch voor; meer in het voor-
en najaar, bij vochtige luchtgesteldheid, dan in
den winter en zomer. In laagliggende, koude, moe-
rasfige landen meer dan in andere. Kinderen en
lieden met zwakke ingewanden, en zij, die zich
met visch, kaas en zware meelspijzen voeden, zijn
het meest aan haar blootgesteld. De koorts heeft
geen bepaald karakter, somwijlen bootst zij het
sthenische, meerendeels het asthenische karakter na.
Epidemisch heerschend, is zij gewoonlijk eene rot-
of zenuwkoorts, waar de wormen als een de ziek-
te verslimmerend toeval bijkomen. Haar typus is
gewoonlijk remitterende met onregelmatige remis-
siën en exacerbatien, zeldzamer tuschenpoozen-
de, maar dan ook zijn de koortsaanvallen onrelma-
tig en maken vele afwijkingen.

Deze koorts begint doorgaans met de gewone Toeval-
gastrische verschijnselen en toevallen, die eenigen len en
loop der
tijd koorts.

tijd aanhouden , alvorens de versnelde beweging des
 bloeds duidelijk koorts aanwijst ; somwijlen begint
 zij ook plotseling , met groote hette , opgespannen
 buik en hevige kolijkpijnen. De tong is , van het
 begin der ziekte af , dik , met een taai wit slijm be-
 zet , en blijft zoo tot aan het einde der koorts ; uit
 den mond komt een onaangename eigenaardige reuk ;
 het speeksel ontlast zich in groote hoeveelheid in
 den mond , en de lijder moet dikwijls uitspuwen ;
 de bovenlip en neus zijn gezwollen , de neusgaten
 zeer verwijd , met aanhoudende jeukte in den neus ,
 bleek , eenigermate opgezet aangezigt , blaauwe krin-
 gen rondom de oogen , zeer verwijderde pupil , dub-
 bel zien , verschijningen van vreemde gezigten ; on-
 rust , benaauwdheid , door schrikken en opspringen ,
 afgebrokene slaap. De pols is snel en onregelmatig ,
 de lijdersknarsen op de tanden , hebben eene korte , afge-
 brokene , benaauwde ademhaling , sterk opgezwollen ,
 bij het aanraken pijnlijken buik ; persingen en buik-
 loop , met ontlastingen van vele slijmachtige , zeer
 stinkende stoffen en levende of doode wormen , pis
 met een slijmachtig en wit zetsel , dat niet volkomen
 neêrslaat , maar gedeeltelijk drijvende blijft , jeukte aan
 den *anus* en de geslachtsdeelen. Na een' korteren of
 langeren duur komen er zenuwtoevallen bij : als , bevin-
 gen der ledematen , stuiptrekkingen , krampachtige za-
 mentrekkingen der spieren , onbeweegbaarheid der ge-
 wrichten , stomheid , doofheid , blindheid , ijlhoofdig-
 heid , flauwten en stuipen , die niet zelden aan het leven
 een einde maken. De ontlastingen van wormen blij-
 ven

ven intusfchen in deze koorts de eenigfte zekere teekenen, die den aard der koorts duidelijk doen kennen, dewijl, buiten deze, alle andere toevallen onzeker en bedriegelijk zijn.

Zwakke buksingewanden, vermeederde slijmaf-
scheiding, koude, vochtige lucht, moerasfige land-
ftreken, onzuiver en flecht water, taaije, vette,
zoete, meelachtige fpijzen, visch en kaas, zijn het
voornamelijk, die het ontstaan van wormen veroor-
zaken, en ze, waar zij ééns aanwezig zijn, onder-
houden: hoe zij dit een en ander doen, weten wij
niet. Het gevoelen, dat de eerfte kiemen en zaden
der wormen met de fpijzen en dranken in de darm-
buis zouden gebragt worden, en zich daar verder
ontwikkelen, fchijnt mij het minst waarfchijnlijk te
zijn.

Oorza-
ken.

De naaste oorzaak der wormkoorts is gelegen in de prikkeling, die deze infekten op de inwendige oppervlakte van de darmbuis uitoefenen, en de daarop volgende wederwerking, die zich, wegens de vele in de darmbuis verfpreade zenuwen, aan het geheele zenuw- en herfengeftel en de geheele bewerktuiging mededeelt, en de vele en tegenftrijdige toevallen en verfchijnfelen ten gevolge hebben, welke wij in deze koorts waarnemen.

In de lijken der aan deze koorts overledenen vindt men de darmbuis en maag met flijm en wormen bezet, ontftoken, door verftervingen aangedaan, door de wormen geknaagd, doorboord, en deze infekten in de holte van den buik, de galbuizen en galblaas.

Voorzeg- De hevigheid der koorts, haar karakter, en de
 ging.
 (Prognosis.) toevallen, regelen de voorzegging; zij is steeds
 moeilijk, somwijlen gunstig, meerendeels gevaar-
 lijk, en dikwijls doodelijk. De eenvoudige Idiopa-
 thische wormkoorts is met minder, de zamenge-
 stelde en symptomatische met meer gevaar verbon-
 den. Waar de koorts niet zeer hevig is, geen
 bepaald karakter heeft, de irritatie van het vaatstel-
 sel alleen uit de consensueele betrekkingen met de
 darmbuis haar aanzijn ontleent, geene zware zenuw-
 toevallen aanwezig zijn, de ware geaardheid der
 koorts van haar begin af bekend, en de behande-
 ling doelmatig geweest is, waar, met verligting der
 aanwezige toevallen, doode of levende wormen met
 veel slijm ontlast worden, is de voorzegging gun-
 stig; de herstelling kan wel niet met zekerheid,
 maar met groote waarschijnlijkheid, voorspeld worden.

Waar de koorts met den eersten aanvang reeds
 zeer hevig, met zware zenuwtoevallen, stuipen en
 ijlhoofdigheid gepaard gaat, de buik sterk opzwellt,
 zeer pijnlijk bij het aanraken is, en de ontlastingen
 hardnekkig opgestopt zijn, de aard der ziekte mis-
 kend en de behandeling ondoelmatig geweest is, de
 doelmatigste geneesmiddelen zonder uitwerking blij-
 ven en geene wormen ontlasten, de koorts na den
 vijfden dag blijft aanhouden, met steeds verslimme-
 rende toevallen: daar is de voorzegging ongunstig;
 onder deze omstandigheden bezwijkt op verre na
 het grootste gedeelte der lijders. Zij is mede on-
 gunstig, wanneer de wormen niet de eenigste oor-
 zaak der koorts zijn, en deze het karakter der rot-
 of

of zenuwkoorts heeft. Deze voor zich reeds zoo gevaarlijke ziekten worden in haren loop door de prikkeling der wormen nog onregelmatiger en slepende, hare toevallen vermenigvuldigd en verflimmerd, de kritische ontlastingen gestoord, daardoor het gevaar vergroot, en de hoop op eene gunstige uitkomst verminderd.

Zeer hevige, lang aanhoudende pijnen in den onderbuik, die plotseling nalaten en door sterke zwelling van dit deel gevolgd worden, braken met hevige stuiptrekkingen en krampachtige bewegingen, ingevallen aangezicht, koude handen en voeten, koud zweet, kleine, tuschenpoozende, onregelmatige pols, groote angst en benaauwdheid, voorspellen een' spoedigen en doodelijken uitgang.

In deze, gelijk bij alle andere koortsen, die eene Geneeswijze. bekende stoffelijke oorzaak hebben, moet het eerste doel zijn, dezelve te verwijderen. De hevigheid der toevallen, en het bijzonder karakter der koorts, maakt het intuschen dikwijls ondoenlijk, alleen en bij uitsluiting daarop onze geneeskundige behandeling te gronden en in te rigten.

De aanwijzingen ter genezing, waaraan doorgaans gelijktijdig, achtereenvolgende of beurtelings moet voldaan worden, zijn :

- 1°. Het dooden en ontlasten der wormen en van het overtollige slijm.
- 2°. Het bedaren der hevigste en gevaarlijkste toevallen, door lenigende geneesmiddelen.
- 3°. Behandeling van de daarmede gepaard gaande koorts.

4°. Behandeling der herstellenden.

1^e. *Aanwijzing*. Aan de eerste aanwijzing wordt voldaan, door het gebruik van worm- en laxeermiddelen; overal, waar de omstandigheden des lijders het veroorloven, moeten zij onbeschrond toegediend worden; want nimmer verzuimt men ze, zonder groot nadeel voor de zieken. In het eerste begin der koorts zijn zij vooral nuttig. Groote zwakte, hevige zenuwtoevallen, plaatselijke ontstekingen in den onderbuik, vooral wanneer de koorts het kwaadaardige *Typhus* karakter duidelijk ontwikkeld heeft, eischen in derzelver gebruik groote omzigtigheid, of verbieden dezelve geheel.

Als laxeer- en wormen doodende middelen, die tevens op slijm werken, kunnen de *Jalap*, de *Rabarber* en de zoete Kwik gebezigd worden. De alleen wormverdrijvende, niet laxerende geneesmiddelen verbindt men met de eerste, het *Semen Santalini*; de *Valeriana*, de Alsemknoppen, de *Cortex Geoffrea Surinamensis*, het *extract* der onrijpe okkernoten, en de conferf van de gele wortelen, zijn het meeste in gebruik, en door de ervaring bekend, als aan-deze aanwijzing te voldoen.

De hoeveelheid en de keuze der genoemde middelen regelt zich volgens de bijzondere omstandigheden en de jaren der lijders; bij zeer jonge voorwerpen, bij lieden met eene zeer gevoelige darmbuis, en waar de buiksonstlasting niet verstopt is, geve men de Rabarber van 6 tot 25 greinen, met één tot 6 greinen zoete kwik, drie of vier malen 's daags; de Jalap in dezelfde hoeveelheid met kwik vereenigd,

eenigd, bij bejaarde, hardnekkig verstopte buiksontlasting en lieden van een traag gestel en weinig prikkelbare darmbuis:

R̃. Pulv. Rad. Rhei. v. Pulv. Rad Jalapp. 3 ij.
Muriat. acid. Hydrarg. ̃ ij. (Merc. Dulc.)
Sachar alb. 3 ij.
M. F. pulv. N². x.
D. S.

's Daags drie of vier malen een poeder.

In de tusschentijden maakt men gebruik van het een of ander wormmiddel, in zelfstandigheid, aftreksel of afkooksel. Zoo lang er, gedurende het gebruik dezer middelen, wormen ontlast worden, de buiksontlastingen niet overmatig zijn, de krachten het toelaten, de toevallen verminderen, maar nog eenige overig blijven, die gegronde redenen geven, om nog meer wormen te vermoeden, de koorts geen *typhus* karakter aanneemt, blijft men hiermede voortgaan. Vindt de eene of andere der genoemde tegenaanwijzingen plaats, dan stelt men ze ter zijde. De laxermiddelen zijn schadelijk, zoo ras de buikloop hevig wordt, de krachten uitput, de wormtoevallen geweken, en men bijgevolg besluiten kan, dat er geene meer aanwezig zijn.

Voornamelijk vereischen echter de kwikmiddelen de oplettendheid des Geneesheeren; zoo lang de buiksontlastingen veelvuldig zijn, heeft men minder nadeelige gevolgen hiervan te vreezen; bij verstopte buiksontlasting hebben zij ligtelijk kwijling ten gevolge, een toeval, dat wegens den jeugdigen ouder-

dom van de meeste dezer koortslijders, en de bijzondere geaardheid, die de koorts bij eenigen duur gewoonlijk aanneemt, hoogst belangrijk en dikwijls gevaarlijk worden kan.

De wormmiddelen kunnen onbeschroomder en gedurende den geheelen loop der koorts, ook dan, wanneer zij een rot- of zenuwachtig karakter aanneemt, toegediend worden; voornamelijk is dit het geval met de *Valeriana*, die in beide der genoemde koortssoorten een der meest vermogende genceesmiddelen oplevert. Tot voorbeelden om de wormmiddelen toe te dienen, strekken de volgende voorschriften:

Rp. Rad. Valer. Sylv.

Semin. Santon. ā unc. β.

Infunde C. aq. Fon. unc. viij.

Vase Clauso, refriger. Cola.

et adde

Ext. Nuc. Jugland. Immat. 3 iij.

Syr. Cort. Aur. unc. j.

D. S.

Om het uur een' lepel vol.

Rp. HB. Absinth.

— Tanacet. a unc. β.

Coq. C. aq. Comm. unc. xij.

ad Colat. unc. viij.

adde

Rob. Dauci unc. j.

M. D. S.

Om het uur één' of twee lepels vol.

Rp.

R_ç. Cort. Geoff. Sur. unc. ß.

Coq. c. f. q. aq. Comm.

ad Colat. unc. viij.

adde

Ext. Nuc. jug. 3 ij.

Syr. Cort. Aur. unc. j.

D. S.

Om het uur één' of twee lepels.

Dikwijls heb ik mij met de beste uitwerking van een aftreksel der *Valeriaan* met Rabarber bediend, zoodat ik sedert lang, in voorkomende gevallen, daarvan bij voorkeur gebruik make.

Bij kinderen, waar het dikwijls moeilijk is, deze geneesmiddelen, zoo onaangenaam van smaak, te doen innemen; en daar, waar aanhoudende brakingen gelijktijdig met verstopte buiksontlasting aanwezig zijn, en men de laxerende geneesmiddelen in zulke ruime giften toegediend heeft, dat hun verder gebruik wegens de sterke prikkeling nadeelige gevolgen laat vreezen, moeten zij ter zijde gesteld worden; lavementen zijn alsdan aangewezen, waartoe aftreksels, van de Jalappe of Rabarber met Valeriaan en andere wormmiddelen, oplosfingen van *Asfa Foetida*, gal, enz., vooral dáár, waar men niet laxeren en alleen tegen de wormen werken wil. Als de pijnen in den buik zeer hevig zijn, komen er lavementen met zuivere lijnolie te pas, die ook in andere gevallen, waar de wormen in de dikke darmen nestelen, algemeene aanprijzing verdienen, om

de werking der inwendige geneesmiddelen te ondersteunen. Tot dat einde raadt men ook de inwrijvingen van wormdrijvende smeersels, over den geheelen onderbuik, vooral in den omtrek van den navel, sterk aan:

R_o. *Aloes Succotrin.*

Colocynth. ā unc. β.

in pulv. redact. leni calore digere in f. q.

Fel. Taurin.

M. Fiat Linimentum.

Vier malen 's daags 1 tot 2 drachmen op den buik in te smeren.

Ontstaan er, gedurende de aanwending der geneesmiddelen, om aan de eerste aanwijzing te voldoen, krampachtige pijnen in den buik, en andere zenuwtoevallen, dan moeten alle prikkelende middelen terughoudend, en door bedarende en verzachtende middelen bestreden worden.

2^e. *Aanwijzing.* Het bedaren der hevigste en gevaarlijkste toevallen.

Tot dat einde rade men het gebruik van verzachtende, slijmachtige en zoete dranken in ruime mate aan; zij schijnen voornamelijk daardoor nuttig te zijn, dat zij aan de wormen overvloedig voedsel aanbiedende, derzelver onrustige heen en weder bewegingen en prikkeling der darmbuis matigen en bedaren. De dranken, hiertoe het meest geschikt, zijn afkooksels van havergort, Salep, Arabische Gom, Emul-

Emulsifs, melk of vleeschnat. Wanneer de toevallen zeer dringend zijn en groot gevaar aanwijzen, dan geve men gelijktijdig bedarende en zenuwmiddelen. Bij mindere hevigheid late men, met de verzachtende, de wormdrijvende middelen voortgebruiken, hetzij daarmede vereenigd, of bij afwisseling. Lavementen uit de straks genoemde dranken, of olie, om de twee of drie uren ingespoten, werken krachtig mede, om de toevallen te bedaren. Als de buik sterk gezwollen en pijnlijk is, make men verzachtende omslagen met *Opium*, en inwrijvingen met *Ung. Neapolit.* en *Camphor*, om de twee of drie uren herhaald.

Onder de zenuwmiddelen zijn het de krampstillende en bedarende, waarvan men tot leniging der hevigste toevallen het meeste te verwachten heeft. Het *Opium*, de *Hyosciamus*, *Moschus*, *Castoreum*, vlugge loogzouten, de *Asfa Foetida*, de *Flores Zinci* en het *Oxydum Bismuthi*, verdienen als de voornaamste genoemd te worden.

Naar de hevigheid der toevallen, de bijzondere gesteldheden der lijders, kunne, ouderdom, enz. schrijft men ze in verschillende hoeveelheden en gedaanten voor. Bij het gebruik dezer middelen zij men indachtig, de laxeer- en wormmiddelen, welke de darmbuis sterk prikkelen, geheel te vermijden, daar deze, in ruime hoeveelheden toegediend, even zeer als de wormen, de aanleidende oorzaak der stuiptrekkingen, pijnen en zenuwtoevallen zijn kunnen. Als, na het bedaren der zenuwtoevallen, de wormen aanwijzende verschijnselen voortduren, moe-

ten de wormverdrijvende middelen andermaal gegeven worden, waartoe alsdan voornamelijk de *Asfa Foetida* en *Valeriaan* zich aanbevelen, daar zij voor het zenuwgestel aangenaam zijn, en groote wormverdrijvende krachten bezitten; de buiksonstlasting is door olieachtige lavementen te onderhouden.

3^e. *Aanwijzing*. Behandeling der aanwezige koorts. De zuivere, alleen door de prikkeling der wormen voortgebragte koorts vordert zelden eene bijzondere behandeling; zij laat na en houdt geheel op, zoo ras hare oorzaken weggenomen zijn. In die gevallen, waarin de koorts een bijzonder en duidelijk ontwikkeld karakter heeft, of aanneemt en voortduurt, nadat de wormen ontlast en de wormtoevallen geweken zijn, vordert zij in het eerste geval eene bijzondere wijziging in de behandeling, en in het tweede eene geheele verandering van dezelve.

Men vereenige derhalve met de wormmiddelen de zoodanige, welke geschikt zijn, om het bijzondere koortskarakter te bestrijden.

Heeft zij het karakter eener ontstekingskoorts, dan moet zij als zoodanig behandeld worden. Wij merken hierbij aan, dat dit hoogst zeldzaam het geval is, en dat die toevallen, welke den Geneesheer verleiden kunnen, om eene ontstekingsachtige gesteldheid aan te nemen, doorgaans een gevolg zijn van den hevigen prikkel, dien de wormen op de darmbuis uitoefenen; de bloedontlasting en antiphlogistische geneeswijze kan derhalve niet anders dan zeer matig en met de grootste omzigtigheid aangewend worden.

Me-

Menigvuldiger komen de wormkoortsen met het rot- en zenuwachtige karakter voor, en maken, dan die geneeswijze, welke wij ter behandeling dier koortssoorten opgegeven hebben, noodzakelijk. Waar de koorts eenen hoogen trap bereikt, en met ruime giften *Kina* behandeld wordt, ziet men niet zelden, zonder andere wormmiddelen, de wormen levend of dood ontlasten; de opgebeurde en krachtigere wederwerking der darmbuis schijnt daarvan de oorzaak, en in dit opzigt de *Kina* een krachtig wormverdrijvend geneesmiddel te zijn. Intusschen heeft men zich wel te wachten, om overal, waar de wormen levend het ligchaam verlaten, een' gunstigen uitgang te voorspellen; want dikwijls is dit verschijnsel alleen een gevolg der hevigheid van de koorts, en kenteeken der naderende ontbinding, die den nabij zijnde dood voorspelt.

4^e. *Aanwijzing*. Behandeling der herstellenden. Na de ontlasting der wormen, en het bedaren der daarvan afhankelijke toevallen, blijven de spijsverteringswerktuigen gewoonlijk nog eenigen tijd verzwakt en zeer aandoenlijk, welke een' aanleg tot instorten en verslijming onderhouden, die weggenomen moeten worden, ten einde den lijder eene duurzame gezondheid en volkomene herstelling te verzekeren.

Alles, wat betrekkelijk de herstellenden uit andere gastrische koortsen gezegd is, vindt ook hier zijne toepassing. De bittere en ijzermiddelen zijn hier voornamelijk op hunne plaats. Gedurende nog eenige dagen, en zoo lang, totdat de spijsverterende krachten eene gezonde sterkte bereikt hebben, late men dagelijks drie

of vier malen het *Extract. Absynthic.* met *Valerian-* of staalmiddelen gebruiken :

R̃p. Pulv. Rad. Valer. Sylv. 3 iij.

Vitr. Mart. (Sulphat. Ferri.) 3 j.

Ext. Absinth. q. s.

M. F. Pill. pond. gr. iij. obv. pulv. liq.

D S.

Drie of vier malen 's daags 3 tot 5 pillen.

R̃p. Sulphat. ferri.

Pulv. Cort. Cinn. ā 3 ß—j.

Sachar. alb. 3 j.

M. F. pulv. Div. in x part. Aq.

D. S.

's Daags vier poeders.

De zwakte algemeen zijnde , geeft men , met of in plaats van de bittere middelen , de *Kina* en *Cascarilla* , met bijvoeging der Rabarber , waar de buiksontlasting verstoort of zeer traag is.

De ontbrekende eetlust , gedurende de koorts , maakt de voorschriften in dat tijdperk der ziekte , betrekkelijk het toedienen van spijs , overbodig. Indien de lijders nog eenig verlangen naar spijszeten betoonen , dan late men melk , vleeschnat , haver- , gerst- of rijststijm met een weinig wijn gebruiken ; alle andere meer vaste voedingstoffen zijn schadelijk , en moeten ontzegd worden.

Bij de genezenden keert de eetlust spoediger of langzamer , met meer of minder graagte , terug ; het welzijn des lijders maakt alsdan een streng toezigt
noo-

noodig; rijst en krachtig vleeschnat, beschoit, wittebrood, dat ten minste één dag oud en wel uitgebakken is, kunnen in de eerste dagen, — vervolgens goede groenten, eijeren, vleesch van jonge dieren, toegestaan worden. Vette, meelachtige, slijmachtige spijsen, vooral spek, kaas, gezouten en gerookt vleesch, alle soorten van visch, aardappelen, erwten, boonen en gebak zijn eerst dan toe te laten, wanneer de herstelling genoegzaam verzekerd is, en eene krachtige spijsvertering tegen recidiven vrijwaart.

In de keuze der dranken regele men zich volgens het doel, dat de geneeskundige indicatie aanwijst. Waar het alleen zaak is, den dorst te stillen, kunnen al die dranken, welke bij andere koortsen aangewezen zijn, gebezigd worden. Wil men door de dranken medewerken, om de toevallen te bedaren, dan komen de bovengenoemde verzachtende, inwikkende, slijmachtige dranken; wil men opwekken en versterken, de met wijn aangelengde te pas.

Aan de herstelden late men goed wel uitgist en gehopt bier, waarin men nog het eene of andere aangenaam bitter heeft laten trekken, tot gewonen drank gebruiken, daarbij warme waterachtige dranken verbiedende; dagelijks eenige glazen wijn of mede, welke laatste hier bijzonder onze aanprijzing verdient, helpen krachtig mede, om de herstelling te bevorderen.

Zoo ras het de krachten der herstelden toelaten, en het weder gunstig is, moeten zij zich dagelijks in de vrije lucht bewegen; kinderen of zeer zwakken,

ken, die nog niet gaan kunnen, late men dragen en rijden. Eene matige beweging in de vrije lucht is in alle gevallen zeer heilzaam; zij bevordert de spijsvertering, en verhoedt de ontwikkeling van wormen op nieuw.

Daar er in het hoofdstuk over de wormen nog nader over de bijzondere soorten van deze infekten, en andere hiertoe behoorende zaken, zal gehandeld worden, zoo verwijzen wij den lezer, omtrent het een en ander, dat hier slechts aangestipt, of geheel overgeslapt is, tot dat gedeelte van dit Werk.

B. *Zinkingkoorts.* (*Febris Catarrhalis*).

epaling. Eene koorts, met ontstekingsaardige gesteldheid der slijmvliezen, vooral van de werktuigen der ademhaling, die zich door de gewone toevallen der verkoudheid en onderdrukte huiduitwaseming openbaart, noemt men eene zinking-koorts.

arakter. De gewone toevallen van verkoudheid gaan de koorts vooraf, die niet zeer hevig is en zelden langer dan van vijf tot tien dagen duurt, ten ware zij met andere koortsachtige gesteldheden gepaard ga, of een bepaald koortskarakter aanneme; alsdan beslist zij zich eerst later tusfchen den 14^{en} en 23^{en} dag. Zij beslist zich door ruime en duidelijke waar te neme kritische ontlastingen; de meest gewone zijn: vermeerderde slijmontlastingen uit den neus en de longen; de kritische fluimen moeten dik, geelachtig van

van kleur, kogelvormig, niet in elkanderen vloeijende zijn; algemeen en aanhoudend zweet, pis met een dik roodkleurig zakfel en neusbloedingen. De zinkingkoorts tast zonder onderscheid kinderen en bejaarden, het mannelijke en vrouwelijke geslacht aan.

In vochtige, laag liggende landstrekken, waar spoedige en groote weersveranderingen aan het klimaat eigen zijn, vindt men ze meer algemeen dan in andere oorden, waar deze geene plaats hebben; bij zacht winterweêr en in het voorjaar, meer dan in den zomer en herfst.

Sporadisch ontmoet men haar in alle landstrekken en jaargetijden, onder alle volksklassen, ouderdom en geslachten.

Endemisch heerscht zij in dicht aan zeeën en groote rivieren gelegene landen, waar de luchtsgesteldheid zeer vochtig en het weder veranderlijk is.

Epidemisch komt zij het meeste voor, en is alsdan van besmetting niet vrij te pleiten. Onder de benamingen van *influenza* en griep, zijn zoodanige epidemiën door geheel *Europa* berucht geworden. Waar zij deze geaardheid heeft of aanneemt, gaat zij van het eene land naar het andere, het grootste deel van het vaste land rondtrekkende, totdat zij wedergekeerd is, van waar zij uitging; bij de Chinezen en Tartaren schijnen de genoemde epidemiën ontstaan te zijn.

Gevoegelijk kan men de zinkingkoorts verdeelen: Verdeeling.
 1°. In de eenvoudige goedaardige; van eene ligte, ontstekingsaardige gesteldheid; de toevallen van verkoudheid zijn duidelijk ontwikkeld, de koorts is

is matig, remitteert en verheft tegen den avond, zij duurt van drie tot zeven dagen, beflist zich door kritische ontlastingen, en behoeft buiten een' goeden leefregel weinige geneesmiddelen.

- 2°. In de zamengestelde kwaadaardige met het *Typhus* karakter. Zij heerscht meestendeels epidemisch, ontwikkelt zich onder daartoe gunstige omstandigheden in iedere land- en luchtstreek, neemt doorgaans eene besmettende geaardheid aan, en is bij ons onder de benaming van kwaadaardige zinking- of zinking-zenuwkoorts algemeen bekend. Zij is uit de katarrhale gesteldheid en toevallen, met die eener rot- of zenuwkoorts, zamengesteld, dan eens meer dit, dan het andere karakter ten toon spreidende; zij is doorgaans zeer gevaarlijk, en vordert eene oplettende en zamengestelde behandeling.

De gastrische complicatie komt veelvuldig in de eenvoudige zinkingkoorts voor, zonder dat zij daardoor veel in haren regelmatigen loop gestoord en veranderd wordt, mits dat men bij de geneeskundige behandeling daarop acht geve, de vreemd-aardige ophooping ontlaste en nieuwe verhoede.

Loop en toevallen. Zelden begint de zinkingkoorts plotseling, maar heeft gewoonlijk hare voorloopers, die aan hare volkomene ontwikkeling eenige dagen voorafgaan. Onder deze zijn de meest gewone: ligte verkoudheid, tranende oogen, doffe, niet zeer zware hoofdpijn, kieuwelen in den neus, herhaald niezen, pijn-
lijk-

lijkheid bij het flikken, rood, eenigzins opgezet aangezigt, dorst, weinig eetlust, pijn in de lendenen en ledematen, koude rillingen, verstopte buikontlasting, ontlasting van vele winden, dikke, troebele pis. Bij een steeds toenemen dezer toevallen bekomen de lijders eenige dagen later des avonds koorts, die met hevige koude rillingen begint, door hette en zweet gevolgd wordt, en eerst tegen den morgenstond afgaat; de pols is dan meerendeels vol en schielijk; gedurende den geheelen dag blijft de lijder vrij van koorts, maar des avonds keert de aanval met toenemende hevigheid terug, en breekt zoo volkomen niet af als na den eersten aanval; de koorts houdt nu den remitterenden *Typus*, met vrij regelmatige verheffingen, tegen den avond en des nachts; terwijl de volstrekt aanhoudende en tusfchenpoozende *Typus* hoogst zeldzaam voorkomen.

De nachten worden onrustig en slapeloos doorgebracht, de pijnen in de ledematen en lendenen zijn hevig, de huid is droog en meer dan natuurlijk warm, het aangezigt rood en gezwollen, de neus verstopt, de tong droog, in het midden met eene bruine streep en aan de zijdedeelen door een wit slijm bedekt, de smaak is onaangenaam, de eetlust ontbreekt. In het eerste tijdperk der koorts, en waar de ontsteking meer ontwikkeld en uitgebreid is, keelontsteking, met opgezwollene, uitwendig voelbare halsklieren, heesche stem, moeilijke, benaauwde ademhaling, met pijn en spanning op de borst, droogen hoest, of met weinige dunne, slijmachtige en bloedige fluimen, die men ongekookt noemt (*Sputa cruda*); de hette

is groot, de huid brandend, de pis hoogrood van kleur; de buik blijft doorgaans, gedurende den geheelen loop der koorts, zacht, de buiksontlasting is dan eens verstopt, dan weder natuurlijk, somwijlen overvloedig, de pisontlasting meer of minder moeilijk, met een brandend gevoel, gedurende de lozing in de pisbuis; de pis, die in den beginne troebel met of zonder wolkje is, laat later een digt rood- of bruinachtig zetsel vallen. Na verloop van 3, 5, 7 of 9 dagen grijpen er kritische ontlastingen plaats, en de koorts houdt geheel op; het tijdperk der herstelling duurt alsdan kort, en de lijders bevinden zich na weinige dagen volkomen hersteld. Waar de kritische ontlastingen geheel achterweeg blijven of onvolkomen zijn, nemen de toevallen steeds toe, zoo wel in hevigheid als talrijkheid, en de koorts ontwikkelt meer en meer die verschijnselen en toevallen, welke de rot- of zenuwachtige gesteldheid ken- schetsen; intusschen houden de katarrhalische toeval- len aan. Bij lieden met aanleg voor de tering, vooral wanneer er meermaal verkoudheden achtereenvolgend hebben plaats gehad, en waar men bij eene ontstekingsachtige gesteldheid de antiphlogistische ge- neeswijze verzuimt, en eene al te prikkelende en verhittende gevolgd heeft, grijpt niet zelden de overgang in eene volkomene teerkoorts plaats.

Oorza-
ken.

Lieden, aan een overmatig gebruik van warme dranken gewoon, zij, die het meest in geslotene plaat- sen hun verblijf houden, aan de vrije lucht ont- wend zijn, en zij, die eene week, zeer gevoelige, tot zweeten genegene huid hebben, hebben een' bij-

zon-

zonderen aanleg tot deze koorts; terwijl robuste, gezonde personen, die aan zwaren arbeid en vermoeijende bewegingen in de vrije lucht gewoon zijn, er zelden door aangetast worden.

Gevatte koude door plotselingen of schielijken overgang uit de koude in de hette, of uit de hette in de koude, blootgesteld zijn aan togt, nat worden en het droogen van natte kleederen op het ligchaam, koude baden, spoedige weêrsveranderingen, groote hette bij dag, met daaropvolgende koude nachten en andere oorzaken meer, die onmiddellijk op de huid inwerken en eene belemmering in de huiduitwaseming te weeg brengen; maar vooral een eigenaardig *miasma*, dat als een vreemdaardige prikkel op de slijmvliezen en de huid inwerkt en hare verrigtingen verandert, zijn de toevallige oorzaken dezer koorts. De naaste oorzaak dezer koorts moet gezocht worden in de vermeerderde wederwerking der slijmvliezen van den neus, mond, de luchtpijp en longen, die zich somwijlen ook over die der spijsverterings- en andere werktuigen bekleedende uitstrekt, door eene vreemdaardige prikkeling opgewekt, die waarschijnlijk haren grond heeft in de terughoudene stoffen, welke anders door de huiduitwaseming afgescheiden worden, en in een eigenaardig *miasma*. Door deze prikkeling geraken de slijmvliezen in een' ligt ontstekingsachtigen toestand, waarin het geheele huidorgaan meer of minder deel neemt, met een' vermeerderden toevloed van vochten naar de geprikkelde deelen. Door consensueele betrek-

keuze wordt er in het veld en evenwel tot
verreinde uitwerking opgevoerd, waarvan
keuze niet het gevolg is. Hierin kan zich
overeenkomsting van vele gevallen voordoen, en
de uitkomsten in het veld afgeleiden met
eendracht en in de laatste van de overnemen ge-
maakt zijn, en die van de laatste overnemen af-
geleiden keuzes kan geleiden met een meer
eendrachtigen kan voortduren, en in plaats
van eendrachtigen overnemen.

De overnemen uitkomsten met deze kan
eind van een zeer goede of slechte keuzes
bij de overnemen van de afnemende in het veld
eind van de afnemende. Deze overnemen ge-
maakt van het veld, van de overnemen en
eendrachtigen uitkomsten, met geleiden eendrachtigen
overnemen, die de overnemen ge-
maakt van de overnemen ge-
maakt van de overnemen ge-
maakt, en hebben de overnemen van het
geleiden in het veld eendrachtigen ge-
maakt.

Vraag. Zelden is de overnemen uitkomsten met een
geleiden voortduren: men mag zich deze van
geleiden eendrachtigen geleiden, met een ge-
maakt zijn, die de overnemen eendrachtigen
eendrachtigen keuzes van een overnemen keuzes
of een overnemen van overnemen keuzes en
geleiden te geleiden geven. Deze overnemen, geleiden,
eendrachtigen, met een eendrachtigen geleiden, met
eendrachtigen met een overnemen keuzes eendrachtigen
eendrachtigen geleiden, de geleiden voortduren der keuzes

ontlastingen op den 3^{en}, 5^{en}, 7^{en} en 9^{en} dag, zijn goede teekenen, en laten met grond den spoedigen overgang in gezondheid voorspellen.

Kwaad is het daarentegen, wanneer de pols klein, gespannen en zeer schiekelijk, de huid droog en brandend, de koortsverheffingen onregelmatig in elkan-deren loopen en de remisfiën onduidelijk zijn, de dorst hevig, de tong zeer droog is, zwart wordt, ijlhoofdigheid en zenuwtoevallen daarbij komen, de pis bleek, waterachtig, zonder zetsel blijft, en onvoldoende of geheel geene ontlastingen op de kritische dagen plaats hebben. Ook laat er zich niet veel goeds voorspellen, wanneer de koortsverheffingen tegen den avond nog lang aanhouden, een drooge hoest of kuch terugblijft, de lijders des nachts sterk zweeten, zonder verligting, de krachten verminderen, terwijl de andere toevallen bedaren en de lijders zich schijnbaar beter en wèl gevoelen.

Waar de zinkingkoorts door gedaanteverwisseling in een' anderen koortsvorm is overgegaan, moet de voorzegging volgens de vastgestelde regelen bij iederen anderen koortsvorm ingerigt zijn.

Volgens de bijzondere geaardheid der koorts, de aanwezige toevallen en de tijdperken, waarin de ziekte staat, moet de geneeskundige behandeling ingerigt zijn. Gene-
zing.

In de eenvoudige zinkingkoorts is zij binnen zeer naauwe grenzen beperkt; eenige weinige geneesmiddelen, om de ontlastingen in het algemeen, vooral de huiduitwaseming, en in het bijzonder van die stoffen, welke in eene groote hoeveelheid in de

slimvliezen afgescheiden zijn, te bevorderen; de vreemdaardige prikkels en de scherpe prikkelende eigenschap der afgescheidene vochten, vooral in het eerste tijdperk der koorts, te verzachten en weg te nemen, benevens een doelmatige leefregel, omvatten alles, wat men ter genezing behoeft.

Bij een bijzonder en bepaald koortskarakter, onverschillig of zich de zinkingkoorts van den beginne af met de toevallen eener zuivere ontsteking-, rot- of zenuwkoorts ontwikkelt, of eerst later een zoodanig karakter aangenomen heeft, moet de behandeling diensvolgens gewijzigd worden; aderlatingen en de antiphlogistische geneesmiddelen komen te pas, waar zij het karakter der *Synocha*, rottingwerende, prikkelende, bedarende en zenuwmiddelen, waar zij dat der rot- of zenuwkoorts heeft. Bij de gastrische complicatie zijn de oplosfende en ontlastmiddelen aangewezen. Onder alle omstandigheden houde men de catharrhalische gesteldheid in het oog, en verzuime nimmer in de behandeling daarop acht te geven en dezelve daarnaar te wijzigen.

1^e. *Aanwijzing*. Men bevordere de ontlastingen in het algemeen, voornamelijk de huiduitwaseming.

De onderhouding eener matige huiduitwaseming maakt het meest wezenlijke gedeelte der geneeskundige behandeling van deze koorts. Zij is de gewoonste weg, waarvan zich de natuur ter genezing in deze ziekte bedient; met dezelve te bevorderen, bootst men de natuur na, en is men haar behulpzaam.

Tot dat einde onderhoude men in de ziekenkamer eene gemiddelde, niet te koude en niet te warme

tem-

temperatuur; de lijder zij behoorlijk gekleed, zoo lang hij buiten het bed is; het bed houdende, niet te luchtig, maar ook niet te zwaar en overmatig gedekt. Men late hem veel drinken; water, gerstewater met *Oxymel*, afkookfels van meel- en slijmach- tige zaden en wortelen, water en melk, en bijzon- der een aftreksel van vlierbloemen met zoet hout, zijn hiertoe het meeste geschikt. De dranken moe- ten noch heet, noch ijskoud, maar laauwwarm ge- geven worden; alle verhittende en prikkelende dran- ken, als wijn, bier, enz. zijn schadelijk, zoo lang zich de koorts in een ontstekingsaardig tijdperk be- vindt. Tot spijsen zijn jonge groenten, gestoofde vruchten, rijst, melk en magere soepen nuttig, vleeschspijzen, moeilijk verteerbare, prikkelende en gekruide kost hoogst nadeelig; ligtelijk geven zij aanleiding tot gastrische complicatiën, die de koorts en den toevloed van vochten naar de lijdende deelen vermeederen, waardoor de hette toeneemt, de huid droog wordt, alle toevallen verflimmeren, en het eerst eenvoudige goedaardige koortskarakter in een zamengesteld en meer kwaadaardig overgaat.

In het eerste tijdperk der zinkingkoorts lette men vooral op de buiksontlasting, onderhoude en bevor- dere men dezelve waar zij te traag of verstoep is; want, de onderdrukte huiduitwaseming gaat doorgaans met ver- meerderde afscheidingen in de spijsverteringswerktuigen gepaard, of wordt er door vervangen, en het is nut- tig, dat de opgehoopte stoffen spoedig ontlast wor- den. Dit kan geschieden door laxerende klisteren, of openende en zacht laxerende geneesmiddelen,

waartoe de middenzouten, de braak-wijnsteen en de *Extracten* het meest verkieslijk zijn. Sterke buiksonthlastingen zijn schadelijk en moeten vermeden worden, prikkelende, hevig werkende laxeermiddelen leiden te veel vochten van de huid af en naar het spijskanaal, waardoor zij de kritische beweging storen en beletten, en nimmer zonder nadeelige gevolgen blijven.

Het doelmatigste is de buiksonthlasting door middelen te bevorderen en te onderhouden, die, met het laxerende vermogen, de uitwaseming bevorderende krachten vereenigen, of dat men beide soorten van middelen verbonden toedient, b. v:

R_p. Ext. Gramin.

Rob Samb. ā unc. j.

Aq. Samb. unc. vj.

Acetit. Ammon. unc. j.

M. D. S.

Om het uur twee lepels.

R_p. Ext. Gramin.

Rob. Samb. ā unc. j.

Tart. Stib. gr. ij.

Sulphat. Sod. unc. β.

Aq. Coct. unc. viij.

M. D. S.

Om het uur twee lepels.

Is de buiksonthlasting natuurlijk, en vordert er geene bijzondere wijziging in de behandeling, dan trachte men alleen de huiduitwaseming tot een matigtig

tig zweet te bevorderen, door warme baden, drooge wrijvingen en uitwasemende geneesmiddelen, als vlier, *Spiritus Mindereri*, Spiesglas en vlug loogzout houdende middelen; deze laatste voornamelijk dan, wanneer de borst bezet en de ontlasting der fluimen ondersteuning behoeft, bij zwakke voorwerpen, waar men de overgang in het *Typhus* karakter vreest, en waar de koorts reeds eenigen tijd geduurd en het ontstekingsstijdsperk doorloopen heeft. Ook de *Camphor* en het poeder van DOWER, die, te pas gegeven, gewoonlijk een ruim zweet, en daardoor eene spoedige beslissing der ziekte, bewerken, zijn alsdan aangewezen; doch nimmer moeten zij in het eerste tijdsperk der koorts, zoo lang er toevallen eener ontstekingaardige gesteldheid aanwezig zijn, gegeven worden, daar zij, bij een' aanleg tot ontsteking, door hunne prikkelende eigenschappen, eene ware ontsteking kunnen te weeg brengen.

Rp. Carbonat. Amm. Pyro Anim. liq.

Vini Stibiat. ā 3 j. ſ.

Aq. Hyfop. unc. vj.

Syr. Diacod. unc. j.

M. D. S.

Om het uur een' lepel vol.

Rp. Sulphuret. Stib. Hydrag. gr. x.

Camphor. 3 ſ.

Sachar. alb. 3 iij.

M. F. pulv. Div. in x partes aeq.

D. S.

Om de twee uren een poeder.

Bij jonge volbloedige gestellen, met een' natuurlijk aanleg voor ontstekingsziekte, kunnen zelfs de zweetmiddelen uit *Spiritus Mindereri*, braak-wijnsteen en vlier te veel prikkelen, en den ligten ontstekingsstoestand der slijmvliezen tot een' hooger trap opvoeren. Verdunnende slijmachtige dranken, met Salpeter en *Oxymel*, verdienen alsdan de voorkeur, doordien zij de vermeerderde wederwerking in het vaatstelsel verminderen en meest vermogende middelen zijn, om de uitwaseming voor te bereiden, en de werking der zweetmiddelen gemakkelijk te maken.

R̃. Rad. Alth.

— *Gramin.* ā unc. j.

Coq. c. f. aq. Comm. ut f. Decoct.

Colat. unc. xij. *adde*

Nit. Potasfæ 3 i. ß—iij.

Oxym. Simpl. unc. ij.

M. D. S.

Om het uur een half kopje.

2c. Aanwijzing. Men verzachte den vreemdaardigen prikkel. Tot dat einde worden de zoogenaamde verzachtende demulcerende geneesmiddelen gebezigd. Zij zijn aangewezen in het eerste tijdperk der ziekte, waarin de slijmvliezen ontstoken zijnde, niets of slechts een dun waterachtig scherp vocht afscheiden, dat deze prikkelt, de opperhuid oplost en de ontsteking vermeerdert. Hunne nuttigheid schijnt daarin te bestaan, dat zij op de oppervlakte der slijmvliezen hunne slijmachtige deelen terug laten,

ren, het ontbrekende vervangen, zich met de fcherpe vochten vermengen, deze verdunnen en wegvoeren.

Een afkookfel van de *Althea* en Graswortel, oplosfingen van Salep, Arabifche gom, amandelmelk en andere foortgelijke middelen, zijn het meeste in gebruik, en in allen opzigte ter voldoening aan deze aanwijzing genoeg. De oliën en olieachtige middelen, die mede veelvuldig in gebruik zijn, behooren tot de minder nuttige, daar zij ranzig en fcherp worden, en alsdan in plaats van den vreemden prikkel te verzachten, denzelven nog vermeerderen; ook bederven zij de maag en geven tot gastrifche ophooping en aanleiding. Ook het koude water heeft men tot dat einde uit- en inwendig aangeraaden; had men in vroegere dagen door overdreven warmhouden en broeijen aan de lijders meer kwaad dan goed gedaan; het is niet minder verkeerd, om alleen door koude de katarrhalifche toevallen te willen verdrijven. Het is overbekend, dat er nog vele Geneesheeren zijn, die op de ftelligfte wijze verzekeren, zich met het meeste voordeel van de koude tegen de katarrhalifche toevallen en verfchijfelen te bedienen; intusfchen beweren anderen het tegendeel, waarmede ook mijne ervaring volkomen overeenftemt.

Het inademen der dampen van kokend water, waarin Kamil-, Vlierbloemen en zemelen afgetrokken waren, heb ik fteds met het beste gevolg bekroond gezien, zoo wel om de fcherpte der afgefcheidene, vooral uit den neus vloeijende vochten

te verzachten, de schraalte in de keel weg te nemen, als om den hoest te bedaren en de expectoratie te bevorderen. Er is niet aan te twijfelen, dat er gevallen zijn kunnen, waarin het drinken en opsfuiven van koud water den voorrang boven de warme dampen en stovingen verdienen; vooral en bijna alleen heeft dit plaats, wanneer de slijmvliezen en klieren door misbruik van warme dranken zeer verzwakt zijn, en hare veerkracht verloren hebben, geene wezenlijke ontsteking, maar alleen passive congesties en vochtophooping in deze deelen plaats vinden. Hier brengen zij oogenblikkelijk verligting te weeg, de vliezen reageren op de inwerkende koude door zich zamen te trekken, en herstellen hunne verlorene veerkracht, bieden een' sterkeren tegenstand aan den aandrang der vochten, en keeren in hunne afscheidingen tot de natuurlijke gesteldheid terug. Eene duurzame goede uitwerking der koude wordt niet door eene enkele aanwending verkregen, zij moet standvastig, gedurende eenigen tijd gebezigd en dikwijls herhaald worden. Ongeukkig voor den lijder, die in de handen van eenen Geneesheer valt, welke steeds uit een enkel geval, waarin een middel van goede uitwerking geweest is, een algemeen besluit trekt, het toepast, en dienvolgens alle lijders behandelt.

Om den prikkel in de lijdende deelen te verzachten, zijn ook de afleidende tegenprikkelende geneesmiddelen, op de huid aangewend, van uitgebreide nuttigheid. Doordien zij de werkdadigheid in een ander deel opwekken, en een' vermeerderden toe-

toevloed van vochten bewerken, wordt, door de consensueele betrekkingen, die er tusfchen de lijdende deelen en de huid plaats hebben, de wederwerking op de prikkelende fchadelijkheden verminderd.

Wanneer de katarrhale aandoeningen der keel en borst hevig zijn, het flikken belemmerd, de ademhaling benaauwd en moeilijk, de hoest droog en pijnlijk is, de ziekte zich in haar eerfte en ontftekingaardig tijdperk bevindt, en de genoemde toevallen daarvan het gevolg zijn, dan zijn eene aderlating of bloedzuigers op de keel en de borst aangewezen. In de meer gevorderde tijdperken, waarin zich de flijmvliezen in een' meer paffiven toefland bevinden, met vochten overkropt zijn, of de koorts naar het *Typhus* karakter overhelt, zijn deze toevallen zeer gewone verfchijnselen, maar vorderen dan ook, even als hunne oorzaak tegengefteld is, eene tegengeftelde behandeling. Naast het inwendige gebruik van *Antimonial*-, vlug loogzout houdende middelen en Kamfer, heeft men van het uitwendige gebruik van mostaardpappen aan de voeten en kuiten, warme voet- en halsbaden, rood makende en Spaanfche vliegenpleisters op de keel en borst, inwrijvingen van *Linimentum Volatile* en andere prikkelende fmeerfels en zalven in de nabijheid der lijdende deelen het meest te verwachten. Het is daarbij goed, de ingesmeerde deelen met wollen of flenellen lappen te bedekken, die dag en nacht liggen blijven.

3^e. *Aanwijzing*. Men bevordere de ontlasting der ziekelijk afgefcheidene vochten.

In het laafte tijdperk der koorts, vooral wanneer de flijmvliezen der luchtpijp en longen door de

katarrhale toevallen het meeste geleden, en waar kritische afscheidingen door dezelve plaats gehad hebben, is de hoeveelheid van het slijm, dat zich ontlasten moet, dikwijls zeer groot, en deszelfs ontlasting wegens taaiheid of zwakte in de daarbij werkzame deelen moeilijk, of wordt door eene krampachtige gesteldheid belet, die eene bijzondere geneeskundige behandeling vereischt, waarvoor de aanwijzingen op deze drieledige gesteldheid moet gegrond zijn. Om het taaije slijm te verdunnen, en deszelfs ontlasting gemakkelijk te maken, late men de lijders verdunnende dranken met *Oxymel Simplex* of *Squilliticum* in genoegzame hoeveelheid drinken, vermijde alle prikkelende verhittende geneesmiddelen, spijsen en dranken, en late hun dikwijls, om de twee of drie uren, over eene kom met kokend water, het hoofd en aangezicht met een' doek bedekt, zitten, den waterdamp gedurende 10 tot 15 minuten inademen. Waar geene andere beletfelen het ontlasten van het slijm verhinderen, zal men met deze hulpmiddelen zijn doel volkomen bereiken. Zijn zij aanwezig, dan worden de dampen, met de straks op te gevene geneesmiddelen verbonden, toegediend. Waar eene groote gevoeligheid der ademhalingswerktuigen, werkeloosheid of kramp aanwezig is, kunnen de dampen, door bijvoeging van verzachtende, krampstillende of prikkelende geneesmiddelen, op de bijzondere gesteldheden toegepast worden. Als men verzachten wil, worden zemelen HB. *Malva Althea* enz. in de kom gedaan en het kokende water daarop gegoten, om de kramp te bedaren,

ren, Vlier- en Kamilbloemen, HB. *Hyosciami* of slaapbollen gebezigd, om ze prikkelend te maken, doet men eenige onsen wijnazijn, *Spiritus Mindere-ri*, of een tot twee drachmen *Spiritus Sal. Amoniac* in het water, op het oogenblik, dat de lijder gereed is, daarvan het bedoelde gebruik te maken.

Bij zwakte en werkeloosheid komen de prikkelende expectorerende geneesmiddelen, die op eene eigenaardige specifieke wijze op de ademhalingswerktuigen inwerken en het opbrengen der fluimen gemakkelijk maken en bevorderen, te pas. Het is hier, dat de spiesglasmiddelen, de *Squilla*, de alantwortel, de *Polygala Amara*, de *Polygala Senneka*, de *Ammoniackgom*, de *Arnica* bloemen, verbonden met de vlug loogzouthoudende middelen, de *Camphor* en bij groo-tere zwakte met de Kina, op hunne plaats zijn.

Tegen de krampachtige gesteldheid, die gewoonlijk met de vorige gesteldheid gepaard gaat, bezigen men, nevens de genoemde middelen of vereenige daarmede, kleine giften *Opium* of *Extract. Hyosciami*. Als de gevoeligheid der ademhalingswerktuigen zeer groot is, vordert de aanwending der prikkelende expectorerende geneeswijze vele omzigtigheid, daar zij door hare prikkeling de krampachtige gesteldheid vermeerdert. Vooral is dit toepasselijk op den *Alant* wortel, de *Polygala*, de Gom *Ammoniak* en de Kina, bijzonder toch op deze laatste. Men doet wèl, in den beginne alleen het *Opium* of *Extract. Hyosciami*, met *Sulphur Auratum*, *Kermes Minerale* en *Tartarus Emeticus* met suiker toe te dienen, en eerst nadat de kramp verminderd is, de

andere expectorerende middelen te geven. Tot aanwijzing, hoe men zich van de genoemde middelen bedienen kan, volgen hier eenige voorschriften:

R_p. Rad Sennek.

Flor. Arnic. ā 3 iij.

Infunde c. s. q. aq. fery.

Colat. unc. viij. adde

Vin. Huxh.

Liq. Corn. Cerv. ā 3 j—ß.

Syrup. Simpl. unc. j.

M. D. S.

Om het uur een' lepel vol.

R_p. Sulphur. Aur. Ant. g. v—x.

Camphor. 3 ß—j.

Sachar Alb. 3 iij.

M. F. pulv. Div. in x part. aeq.

D. S.

Om de twee uren een poeder.

R_p. Gummi Ammoniac.

Pulv. Rad. Sennek. ā 3 iij.

— — Squill. gr. v.

Ext. Helen. q. s. utf.

Pill. Pond. gr. iij. obv.

Pulv. Liq.

D. S.

Om de twee uren vier pillen.

℞. *Liq. Corn. Cerv.*
Vin. Huxh. ā 3 i—ij.
Aq. Hyfop. unc. vj.
Syr. Diac. unc. j.
M. D. S.

Om het uur een' lepel vol.

℞. *Kerm. Mineral.* gr. vi—xij.
Op. Depur. f. Ext. Hyosc. gr. iii—vj.
Sachar. Alb. 3 ij.
M. F. Pulv. div. in xii part. aeq.
D. S.

Alle uren of om de twee uren een poeder.

Bijzondere toevallen, die op de eene of andere wijze de herstelling vertragen, of het leven in gevaar brengen, moeten op dezelfde wijze, als bij de behandeling van andere koortsziekten gezegd is, behandeld en tegengegaan worden, in dier voege echter, dat men daarbij de algemeene aanwijzingen niet uit het oog verlieze, en zoo veel mogelijk de behandeling daarnaar regele.

4^e. *Aanwijzing.* Behandeling der herstellenden.

Bij de genezenen moet vooral daarvoor gezorgd worden, dat men hunne krachten door eene voedzame versterkende diët herstelle; dat zij niet te vroeg tot hunne gewone bezigheden wederkeeren, de morgen- en avondlucht vermijden, en zich tegen het vatten van koude en verkoudheden, door goede, warme kleeding, beveiligen. Als de krachten veel geleden hebben, moet er met de *Kina* en andere versterkende geneesmiddelen nog eenigen tijd vol-

gehouden worden; voor diegenen, welke zeer vermagerd zijn en hoesten, is de IJslandsche Mos, met het zaad der Watervinkel, allerheilzaamst. Ook gebeurt het niet zelden, dat er, na de herstelling, eene vermeerderde slijmafscheiding, die de krachten uitput, terug blijft, welke, niet tegengegaan en weggenomen wordende, in eene slijmtering ont-aardt; hier zijn dan de versterkende en balsmachtinge geneesmiddelen, de *Kina*, de *Myrrhae*, de Peruviaansche bals, de Watervinkel, enz. waar de pols zeer snel blijft, in vereeniging met de *Digitalis Purpurea*, aangewezen en noodig.

C. *Rheumatische koorts.*

(*Febris Rheumatica (Rheumatismus Febrilis)*).

Bepaling. Koorts met hevig stekende en snijdende pijnen in de vleeschachtige deelen, dan eens tot één deel bepaald, dan over alle uitgebreid, en dikwijls van plaats veranderende, zoodat zij het eene deel verlaten en in een ander te voorschijn komen, noemt men eene rheumatische koorts.

Karakter. De rheumatische koorts kan niet als een bijzonder eigenaardig voor zich bestaand koortskarakter aangenomen, maar moet steeds als eene toevallige gesteldheid, die zich met het *rheumatismus* verbindt, beschouwd worden; daar deze laatste dikwijls zonder eenige koorts verloopt, en als een bijzondere ziekte-vorm voor zich bestaat. De rheumatische koorts heeft derhalve ook niet altijd één en hetzelfde karakter.

rakter, maar verschilt naar den aard der koorts, die zich er mede verbindt. Hare eenvoudigste gedaante is die, waarin zij als een gevolg der rheumatische aandoening te voorschijn treedt, welke in dit geval, als een vreemdaardige prikkel, consensueele betrekkingen in het vaat- en zenuwstelsel opwekt; er ontstaat eene eenvoudige prikkelkoorts, geëvenredigd aan de hevigheid der rheumatische aandoening en daarvan afhankelijk. Uit dit oogpunt beschouwd, laat het zich verklaren, dat zij met de eenvoudige zinking- en ligte ontstekingskoorts in vele opzigten overeenstemt, en meerendeels het karakter der *Synocha* heeft. De hevigst snijdende en scheurende rheumatische pijnen gaan dan vooraf, en de koorts komt als een harer gevolgen te voorschijn. Somwijlen heeft zij ook het zenuwachtige, menigvuldiger het gastrische karakter met zich gepaard; meerendeels gaat hier koorts vooraf, of zij ontwikkelt zich gelijktijdig met de rheumatische pijnen, die wederkeerig op de koorts invloed hebben en ze wijzigen.

Wij verdeelen derhalve de rheumatische koortsen in de eenvoudige, met het karakter der *Synocha*, en in de zamengestelde, met het gastrische en zenuwachtige karakter.

De eenvoudige duurt zelden korter dan veertien dagen, en beslist zich door kritisch zweet, ruime pisontlasting, neusbloeding en gierstuitslag, zeldzaam door kwijling.

De zamengestelde duurt langer, van drie tot vier weken, den loop volgende van die koortsen, welker karakter zij aangenomen heeft, zich beslissende

door de genoemde kritische ontlasting en buikloop, of zij gaat, hetgeen hier dikwijls het geval is, in een chronisch *rheumatismus* over. Wanneer de koorts zeer hevig is, en een kwaadaardig karakter aanneemt, kan zij, even als in andere gevallen, doodelijk afloopen. Ook gebeurt het somwijlen, dat de pijnen de uitwendige deelen verlaten en tot edelere deelen worden overgebracht: dit noemt men het terug treden of naar binnen slaan; voornamelijk schijnt het hart genegen te zijn, om de rheumatische gesteldheid van uitwendige deelen over te nemen: het gevaar is alsdan zeer groot; de ziekte eindigt in de meeste gevallen met den dood.

De rheumatische koortsen heerschen in onze dagen meer algemeen, dan wel in vroegere tijden plaats vond. Zij komen epidemisch en sporadisch voor, en de rheumatische gesteldheid heeft zoo wel op de epidemische als staande ziektegesteldheid een' gewigtigen invloed. Bij spoedige weersveranderingen, heete dagen, met daarop volgende koude en vochtige nachten, in het voor- en najaar, bij drooge oostelijke winden, vindt men ze het meest. Voor het overige tast zij allen zonder onderscheid van jaren en geslacht aan. In gezonde, robuste gestellen helt zij meer tot het ontstekingsachtige, bij kinderen tot het slijm- en katarrhale, bij ouden tot het zenuwachtige, tegen het einde van den zomer en in het begin van den herfst tot het galachtige karakter, over.

Loop en
toevallen.

De eenvoudige rheumatische koorts laat zich gevoegelijk in vier tijdperken onderscheiden: het eerste duurt

duurt van zeven tot veertien dagen, en onderscheidt zich door zijne meer ontstekingsaardige toevallen. Het tweede of kritische tijdperk valt tusfchen den zevenden en een en twintigften dag; de ontstekings-toevallen verminderen, de ontlastingen worden ruimer en anders gewijzigd, en de pijnen nemen af. Wanneer de kritische ontlastingen volkomen zijn, gaat dit tijdperk onmiddellijk in het derde, dat der genezing, over; zijn de kritische ontlastingen onvolkomen of blijven zij geheel achterweeg, dan neemt de koorts een zamengefteld karakter aan, vermindert of verdwijnt geheel, maar de pijnen duren voort, de ziekte gaat in het vierde of chronische tijdperk over, en moet als een chronisch *rheumatismus* behandeld worden.

De koorts zelve begint met zware fcheurende en fnijdende pijnen in de fpieren, vooral van den nek, den rug, de fchouders en ledematen, zich dan eens meer algemeen uitbreidende, dan eens meer tot een enkel deel bepaald blijvende. Gelijktijdig, of iets later, ontftaan er koude rillingen, gevoel van koude in den rug, vermoeidheid en zwaarte in de ledematen; de pols wordt vol, hard en fchielijk, de hitte is hevig en brandend, de tong droog, met een wit taai flijm bedekt, de dorst hevig, de lijders worden onrustig en beangst, de buikontlasting is verftopt, of de ontlaste ftoffen zijn hard en brandig, de pis ontlast in kleine hoeveelheden, dikwijls met een brandend gevoel in de pisbuis, is daarbij dik, troebel, heeft eene rood-bruine kleur en geeft een' eigenaardigen fterken reuk van zich; de nachten

Y 3

zijn

zijn zeer onrustig en slapeloos; de ademhaling moeilijk, beangst, met pijn op de borst en droogen hoest, bij zeer hevige pijnen, ijlhoofdigheid en zenuwtoevallen.

In den verderen loop der koorts beginnen de pijnlijke deelen eene roode ontstekingsachtige kleur aan te nemen en te zwellen, meerendeels met verligting der koortstoevallen. De koorts en de pijnen verheffen des avonds, en houden den remitterenden, somwijlen ook den tuschenpoozenden *typus*; de pijnen veranderen dikwijls, met iederen koortsaanval, van plaats, zich dan eens tot dit, dan tot een ander deel bepalende. Ruime nachtzweeten, die zonder verligting blijven, en de krachten uitputten, zijn mede niet zeldzaam. Het afgetapte bloed heeft gewoonlijk eene vaste geel-witte korst, de rheumatische genaamd, die zich daardoor van de ontstekingskorst onderscheidt; somwijlen ontbreekt zij, en het bloedwater is overvloedig.

Deze toevallen en ziekteverschijnselen duren met weinige veranderingen onafgebroken voort; de krachten nemen af, totdat zich de ziekte in de tweede of derde week door kritische ontlastingen beëlist. Deze heeft men te verwachten, wanneer de remissiën en intermissiën duidelijker worden, langer aanhouden, de tong vochtig, de huid met een gelijkmatig, aanhoudend warm zweet overdekt is; op den negenden, elfden en veertienden dag komen er neusbloeding, kwijling, pis met een rood tigchelsteenkleurig zakfel of zoutkristallen, gierstuitslag of buikloop te voorschijn, die, door verligting der

toe-

toevallen, hare kritische geaardheid aanwijken. In de zamengestelde rheumatische koortsen zijn er, nevens de genoemde toevallen, ook nog die aanwezig, welke aan de bijzondere daarmede gepaarde koortskaracters eigendommelijk zijn, en deze kenschetsen. De geheele loop der ziekte is zamengesteld, de kritische ontlastingen en uitgangen door deze gesteldheden gewijzigd en daaraan geëvenredigd.

Alhoewel niet zelden de gezondste en robuste ^{Oorza-}ken. personen door deze koortsen aangetast worden, zijn toch zij, die eene teedere, week en prikkelbare vezel met eene gevoelige, tot zweet genegene huid hebben, en zij, die zich door overmatig warm houden en misbruik van zweetmiddelen, eene groote aandoenlijkheid voor den invloed der weder- en luchtsgesteldheden verworven hebben, meer dan anderen met den aanleg voor dezelve begaafd; ook wil men waargenomen hebben, dat volbloedige, hypochondrische en hysterische personen bij voorkeur aangetast worden.

De toevallige oorzaken moeten voornamelijk in den ons omgevenden dampkring, en de daarin plaats hebbende veranderingen gezocht worden: spoedig afwisselende hitte met koude, vochtige lucht, verkoudheden, togt, die bijzonder op een enkel deel meer en sterker inwerkt, dan op de andere deelen des ligchaams, de epidemische luchtsgesteldheid, onderdrukte ontlastingen, der maandzuivering, der aanbeijen en kraamzuivering; teruggetredene huidziekten, vreemde prikkels door wormen en gal in de eerste wegen, en de vènerische, *scabieuse*, kanker-

achtige en andere ziekelijke gesteldheden zijn als zoo vele oorzaken te beschouwen, die onder daartoe gunstige en medewerkende omstandigheden eene rheumatische koorts kunnen te weeg brengen. De naaste oorzaak is eene ontstekingsaardige, en daarmede het meest overeenkomst hebbende gesteldheid der spier- en zenuwvezel, waarvan de koorts een gevolg is, of, er verbindt zich met zoodanig eene plaatselijke gesteldheid eene koorts van het eene of andere karakter. De ontsteking der meest lijdende deelen is geene zuivere active, maar komt meer met de roosachtige overeen, die zich het meeste door uitzweeten der *Lympha* beflist: het is uit dien hoofde, dat de rheumatische koorts dikwijls nalaat, maar de plaatselijke pijnen voortduren, en het Chronische karakter aannemen. De uitgezweetene, tusfchen de spier- en zenuwvezel uitgestorte stof, fchijnt de oorzaak te zijn, die alsdan de pijnen onderhoudt en zoo langdurig als hardnekkig doet zijn.

Voorzeg-
ging.

De uitgang der rheumatische koorts kan zijn: in gezondheid, den dood of andere ziekten van eene fleepende geaardheid. De hevigheid der rheumatische pijnen en de daarmede gepaarde koorts, de geaardheid van dezelve, gelijktijdig aanwezige ziekelijke gesteldheden, de voortdurende oorzaken, de geneeskundige behandeling en het verkouden der lijdens hebben daarop een' gewigtigen invloed.

Gunstig is de voorzegging, en men mag zich eene fpoedige besliffing in gezondheid beloven, wanneer de pijnen en koorts niet zeer hevig, alleen tot de uitwendige deelen bepaald zijn, de inwendige zich vrij be-

bevinden, niet ronddwalen, maar in de eerst aangedane deelen gefixeerd blijven en deze matig gezwollen en rood zijn, de koorts een' remitterenden *Typhus* houdt, met regelmatige, niet zeer zware verheffingen des avonds. Als er na den zevenden dag de huiduitwaseming en pisafscheiding vermeederen, of andere ontlastingen uit zich-zelve ontstaan en de koorts en de toevallen verligten, en er geene aanwezig zijn, die het consensueele lijden des zenuwgestels te kennen geven.

Ongunstig is de voorzegging, en laat een' doodelijken uitgang vreezen, wanneer de pijnen en koorts zeer hevig, en er van het eerste begin der ziekte af zenuwtoevallen aanwezig zijn, die het deelnemen van dit stelsel in de ziekelijke gesteldheid aanwijzen, of in den loop der koorts daarbij komen, en haar het zenuwachtige karakter geven. Wanneer de pijnen dikwijls van plaats veranderen, en op inwendige edele deelen vallen, de ademhaling zeer benaauwd en pijnlijk, de pols tusfchenpoozende, de ontlastingen onderdrukt, onregelmatig, overvloedig en niet verliggende zijn; ijlhoofdigheid, kramptrekkingen, opspringen der pezen, verlammingen der pijnlijke deelen, mondklem, enz. daarbij komen.

De zoo gewone uitgang in een *chronisch rheumatismus*, met langdurige stamheid, pijn, zwakte en lamheid van een of meerdere ledematen, heeft men het eerste dan te verwachten, wanneer de kritische ontlastingen geheel achterweeg blijven of slechts onvolkomen geweest zijn, de koorts allengskens afneemt en, zoo als men zegt, uitslijt, maar de pijn

nen aanhouden, de lijders zwak zijn en blijven, de lijder eene al te verzwakkende of ondoelmatige geneeswijze gevolgd is, de lijder een' flechten leefregel houdt, zich te dun kleedt en in den loop der koorts zich aan het vatten van koude bloot stelt, vooral in die tijdperken der koorts, waarin de natuur zich met de kritische ontlastingen bezig houdt. Bij vrouwen, bij bejaarden, bij lieden, die reeds meermalen aan rheumatische gebreken geleden hebben, die aan een' prikkelenden, verhittenden leefregel en misbruik van sterken drank gewoon zijn.

Genees-
wijze.

De aanwijzingen, om de gezondheid te herstellen, zijn in deze koorts onderscheiden, volgens de tijdperken, waarin zij zich bevindt, het karakter, dat zij aanneemt, en de toevallen, die er mede gepaard gaan.

Wij stellen hier de navolgende vast:

- 1°. Men trachte de oorzaken weg te nemen, en behandel de koorts volgens haar karakter.
- 2°. Men bedare de hevigste toevallen.
- 3°. Men bevordere de kritische ontlastingen.
- 4°. Men verhoede den overgang in andere ziekten en chronische gebreken.
- 5°. Behandeling der herstellenden.

1c. *Aanwijzing.* Zoo lang de rheumatische koorts alleen in eene consensuëele wederwerking van het vaatstelsel bestaat, opgewekt door de plaatselijke ontstekingsachtige gesteldheid der meest lijdende deelen, mogen wij in de vooronderstelling, dat ontsteking de naaste oorzaak van het *rheumatismus* is, de mogelijkheid aannemen, hare naaste oorzaak te kunnen be-

be

bestrijden en wegnemen, door de antiphlogistische geneeswijze te bezigen.

Wanneer er in het eerste tijdperk der koorts geen toevallen aanwezig zijn, die een bepaald koortskarakter aanwijzen, dat deze behandeling verbiedt; als de pijnen hevig, en de deelen, waarin zij huisvesten, rood, ontstoken, eenigzins gezwollen zijn, de pols hard en vol, de huid en tong droog, de dorst hevig en de pis loogkleurig is, opene men eene ader, en tappe eene aan de hevigheid der koorts geëvenredigde hoeveelheid bloeds af. Meerendeels moet de aderlating eenige malen herhaald worden; de harde en volle pols, de ontstekingskorst, die het weggelaten bloed bedekt, de hevigheid der pijnen, de drooge, zeer warme huid, doch voornamelijk het weder verheffen der toevallen eenige uren na de voorafgegane aderlating, die eerst verminderd waren, zijn de minst bedriegelijke, welke de herhaling der bloedontlastingen aanwijzen. Nemen de krachten na de aderlating af, gevoelt zich de lijder afgemat, wordt de pols week, is de ontstekingskorst van weinig belang, dan komen zij niet meer te pas, maar zijn schadelijk, doordien zij den overgang in het chronische *rheumatismus* bevorderen. Behalve de algemeene bloedontlastingen zijn de plaatselijke mede zeer heilzaam; bijzonder, wanneer de pijnlijke deelen ontstoken en gezwollen, en men de algemeene bloedontlastingen vreest, hetzij dan wegens de individueele gesteldheid der lijders; in deze gevallen zet men eenige bloedzuigers zoo dicht mogelijk aan de meest lijdende deelen. Naast de bloedontlastingen komt

komt het meest het falpeter in aanmerking, waaraan men, als het ware, eene specifieke werking tegen de rheumatische gesteldheid heeft willen toekennen. Waarschijnlijk werkt het hier op dezelfde ons onbekende wijze, waardoor het tegen alle ontstekingen een der meest vermogende geneesmiddelen oplevert. Zoo lang zich de rheumatische koorts in eene ontstekingsaardige gesteldheid bevindt, zoo lang behoort dit middel, en wel in ruime giften van twee tot zes drachmen, in een' flijmachtigen drank opgelost, met vlierconferf in de 24 uren toegediend te worden.

Rp. Nitrat. Potasf. 3 ij—vj.

Rob. Samb. unc. j.

Decoct. Hordei lib. j.

D. S.

Om de twee uren een kopje vol.

Vele Geneesheeren hebben het gebruik van het falpeter in deze koortsen overdreven, waartegen wel mag gewaarschouwd worden. De hier bepaalde hoeveelheid is, in de meeste gevallen, toereikende; waar zij het niet is, om de ontstekingtoevallen te bedaren, mag men veilig stellen, dat de bloedontlastingen verzuimd en niet ruim genoeg geweest zijn, welke dan ook door de grootste giften van dit middel niet kunnen vergoed worden. Wanneer de maag het falpeter niet wel verdraagt, iets dat niet zelden gebeurt, en er buikloop ontstaat, is deszelfs gebruik niet langer te dulden. De buiksontlasting behoort wel onderhouden te worden, maar
mag

mag niet overvloedig zijn; want in dit geval bewerken zij een' al te grooten toevloed van vochten naar de darmbuis, en verhinderen het kritische zweet, waarmede zich deze koortsen gewoonlijk beflissen. Beter is het derhalve, den buik door verkoelende, zacht laxerende klisteren open te houden, alle laxerende geneesmiddelen te vermijden en het salpeter, zoo wel als alle andere middelenzouten, in geene grootere giften, en niet langer toe te dienen, dan zij zonder de genoemde uitwerkingen op de darmbuis verdragen worden.

Bij het gebruik dezer middelen moet ook de antiphlogistifche leefregel door de lijders in acht genomen worden, alleen met dit onderscheid, dat men de koude vermijde, en den lijder, vooral de meest lijdende deelen, behoorlijk warm houde, door ze in wollen stoffen, flanel of gewast linnen in te wikkelen.

Als op deze wijze de ontstekingsachtige gesteldheid geheel weggenomen, de eenvoudige rheumatische koorts in het tweede tijdperk, dat der kritische ontlastingen, overgegaan is, of zich een bijzonder koorstkarakter ontwikkeld heeft, dan moet er met de antiphlogistifche geneeswijze opgehouden, en, volgens de aanwezige aanwijzingen, de behandeling verder voortgezet worden.

De gastrifche complicatie, de meest gewone in deze koorts, vordert vooral een onbeschroomd gebruik der braakmiddelen. Gedurende eenige dagen kunnen zij veilig om den anderen dag herhaald worden, ook dan, wanneer er geene toevallen meer
aan-

aanwezig zijn, die ophooping in de maag aanwijken, want zij werken niet alleen zoo bij uitstek heilzaam in deze koortsen, door de bewerkte ontlastingen, maar bijzonder ook door de uitwaseming te bevorderen, de krampachtige gesteldheid weg te nemen, en door aan de wederwerking in het zenuwgestel eene andere wijziging te geven. Steeds zij men echter daarop verdacht, dat alvorens zij toegediend worden, de ontstekingsaardige gesteldheid, als zij actief is, door de antiphlogistische behandeling behoort weggenomen of gematigd te zijn.

Het zenuwachtige karakter vereischt de behandeling der gewone zenuwkoortsen, volgens hare bijzondere geaardheden en toevallen. De verzwakkende of antiphlogistische geneeswijze moet alsdan zoo veel mogelijk vermeden en in tijds versterkende, opwekkende, bijzonder op de huid werkende geneesmiddelen gebezigd worden. Van ruime giften, Kamfer, Spiesglasbereidingen, vlug loogzout houdende middelen, *Arnica* en Spaansche vliegenpleisters op de lijdende deelen, om het terugtreden of naar binnen slaan van het *rheumatismus* te verhoeden, heeft men het meeste voor de lijders te verwachten.

2^e. *Aanwijzing*. De hevigste toevallen, die eene bijzondere behandeling vorderen, ten einde dezelve te bedaren, en het gevaar, dat zij insluiten, af te wenden, zijn: stuiptrekkingen, slapeloosheid, ijshoofdigheid of andere, die het bijzondere lijden der edele deelen en ingewanden aanwijken. Volgens de oorzaken, waarvan deze toevallen de gevolgen zijn, wordt de behandeling geregeld; want zij kunnen hun-

hunnen oorsprong uit de hevigheid der pijnen of uit het terugtreden van het *rheumatismus* ontleenen.

In beide gevallen moet er vooraf bepaald worden, of ontsteking of kramp in de aangedane deelen, de onregelmatige en hevige wederwerking der werktuiging te weeg brengen, om de behandeling met vrucht te ondernemen. Meestendeels is er in het begin ontsteking, later kramp aanwezig.

Bloedontlastingen, door aderlatingen en bloedzuigers, salpeter en middenzouten, ter voldoening aan de eerste aanwijzing, toereikende aangewend, zullen het noodeloos maken, om ze later wegens de bijzondere toevallen te bezigen; alleen dáár, waar men den lijder op eene al te verhittende en prikkelende wijze behandeld heeft, zal de ontsteking dien hoogten trap bereiken, dat de hevigheid der pijnen zelve of de daaruit voortvloeiende toevallen eene bijzondere behandeling vorderen.

De krampachtige gesteldheid van het zenuwgestel en der spieren is dikwijls het gevolg, wanneer men de lijders door de antiphlogistische behandeling te zeer verzwakt heeft, of wanneer zij zich op nieuw aan het vatten van koude blootgesteld hebben. De bedarende verdoovende geneesmiddelen, uit *Opium* met *Ipecacuanha*, de *Hyosciamus*, de *Camphor* zijn dan aangewezen, en kunnen veilig gegeven worden. Eene grein *Opium* met twee greinen *Ipecacuanha*, en waar de ziekte reeds meer eene slepende gedaante aangenomen en een uitzweeten der *lympha* plaats heeft, met twee greinen zoete kwik, twee of drie malen 's daags, doen dan de uitmun-

muntenkste werking; zoo lang de koorts zeer hevig is, en de hersenen sterk aangedaan zijn, vordert het gebruik des Opiums omzigtigheid; men moet de genoemde gift tot de helft of het vierde deel vermindert toedienen, dezelve herhalen, waar het wel bekomt, maar geheel ter zijde stellen, als de koorts en het lijden der hersenen hierdoor vermeederen. Uwendig bezige men op de lijdende deelen inwrijvingen met *Linimentum Volatile* en *Laudanum Liquidum*. Sydenh. late warme halsbaden gebruiken, en bedekke de pijnlijke deelen met gewast linnen of flanel.

Zijn de lijders reeds zeer verzwakt, geene toevallen aanwezig, die ontsteking laten vermoeden, en maakt de koorts duidelijke remisfiën of intermisfiën, dan geve men bij de genoemde middelen de Kina met *Arnica* bloemen of wortel, en zacht zweetdrijvende middelen verbonden:

R. Pulv. Cort. Per. Grosf. unc. j ss.

Coq. c. f. q. aq. Comm,

Ut. f. Decoct. sub. fin. coct.

infunde

Flor. Arnicae Vel. radic. 3 iij—vj.

Colat. unc. xij. adde

Rob. Samb. unc. j ss.

M. D. S.

Om het uur een half kopje.

Het terugtreden van het *rheumatismus* de oorzaak der gevaardreigende toevallen zijnde, moeten deze toevallen volgens hunne bijzondere geaardheid behandeld worden. Daarnevens wende men al die uit-

uit- en inwendige middelen aan, die doorde ervaring bewezen hebben, dat zij in staat zijn, de rheumatische gesteldheid in de uitwendige eerst aangedane deelen weder op te wekken, en zoo van de inwendige naar de uitwendige deelen af te leiden. Tot dat einde geve men ruime giften *Camphor*, *Moschus*, *Tinctura Succini*, *Liquor Corn. Cervi*, enz., late van tijd tot tijd een warm bad nemen, en houde de lijders meer dan gewoon warm in het bed. Het deel, dat het eerst door *rheumatismus* aangedaan was, late men wrijven met Spaansche vliegentinctuur, en borstelen, totdat het rood worde en gloeije, legge er eene Mostaardpap of Spaansche vliegenpleister op. De buiksontlasting worde door prikkelende lavementen onderhouden. Braakmiddelen, bij herhaling gegeven, hebben onder zulke omstandigheden eene zeer goede uitwerking gehad en het *rheumatismus* tot de uitwendige deelen doen wederkeeren.

Als, gedurende het gebruik dezer middelen, de toevallen bedaren, hetzij doordien zij het *rheumatismus* tot de uitwendige deelen terug gevoerd, of omdat zij kritische ontlastingen te weeg gebragt hebben, kan men zich met een' gunstigen uitslag vleijen. Blijven de gebezigde hulpmiddelen zonder de gewenschte uitwerking, zoodat de toevallen onverminderd voortduren, dan ontkomen de lijders bijna nimmer aan den dood.

3°. *Aanwijzing*. Men bevordere de kritische ontlastingen.

Hoogst zeldzaam zijn de gevallen, waarin men, door aan de eerste aanwijzing te voldoen, gelukkig

genoeg slaagt, om de rheumatische koorts volkomen te genezen; gewoonlijk beslist zij zich eerst, nadat de onstekingaardige gesteldheid geheel is weggenomen, door kritisch zweet en pis, zoodat het een zeer wezenlijk deel der geneeskundige behandeling is, deze ontlastingen te bevorderen. Zoo ras er geene aanwijzingen voor de antiphlogistische methode meer aanwezig zijn, geve men derhalve zweetdrijvende geneesmiddelen, als *Vlier*, *Spiritus Mindereri*, *Pulvis sudoriferans (Pulvis Doveri)*, *Vinnm Huxhami*, kleine giften Braakwijnsteen met *Opium*. Men houde de lijders matig warm en late hen veel drinken: een matig zweet, gedurende eenige dagen onderhouden, brengt de koorts doorgaans tot scheiding; echter moet men niet denken, dat de herstelling alleen van het zweet afhangt; overmatig zweet put de krachten uit, en heeft ligtelijk den overgang in een chronisch *rheumatismus* ten gevolge.

4e. *Aanwijzing*. Men vermijde den overgang in chronische ziekte.

Eene rheumatische koorts, van haar begin af doelmatig en overeenkomstig de aanwijzende toevallen en ziekteverschijnselen behandeld, zal zelden eene chronische geëardheid aannemen; waar het tegendeel plaats heeft, zal zulks zeer dikwijls het gevolg zijn. Voornamelijk komt het daarop aan, dat noch de antiphlogistische, noch zweetdrijvende methode overdreven, noch de versterkende, prikkelende, al te vroegtijdig aangewend worden. De rheumatische koortsen duren doorgaans iets langer, dan andere, wanneer ook de toevallen en verschijnselen

len geringere afwijkingen in de bewerktuiging schijnen aan te wijzen, dan in koortsen van eene andere geëardheid. Men zij dit in de behandeling indachtig: bedaard den loop der ziekte gadeslaan, de natuur te gemoet komen en ondersteunen, waar het noodig is, geleidt in vele gevallen van deze koortsen veiliger tot het doel, dan wanneer men steeds eene active geneeswijze volgt, wanende daarmee de koorts te kunnen dwingen en de genezing te bespoedigen.

Intusfchen moeten de krachtige koortsdrijvende geneesmiddelen, waar het noodig is, niet verzuimd worden; wanneer de krachten sterk afnemen, de koorts zich verheft, het tijdperk, waarin de kritische ontlastingen gewoonlijk plaats vinden, zonder verligting voor den lijder voorbijgegaan is, en waar de ontlastingen, volgens haren aanleg kritisch, in colliquativische ontaard zijn, zijn de *Kina*, de *Arnica*, de *Valeriaan*, *Opium*, *Wijn*, *Camphor*, enz. aangewezen, in verband eener opwekkende prikkelende behandeling van de meest lijdende deelen. Gaat desnietteenstaande de koorts in eene slepende zenuw- of hectische, of het *rheumatismus*, na het ophouden der koorts, in eene chronische over, dan moet de behandeling diensvolgens geregeld en ingerigt zijn.

Bij lieden, waar, met de rheumatische gesteldheid, eene venerische, scrophuleuse of scabieuze fcherpte aanwezig is, heeft men het meest den overgang in slepende koortsen en naziekten te vree-

zen, waarom ook daarop reeds, van den beginne af, in de behandeling acht gegeven moet worden.

5°. *Aanwijzing.* Behandeling der herstelden.

Nadat de koorts en de pijnen geheel geweken zijn, is het vooral noodig, dat zich de lijders nog eenen geruimen tijd warm houden, de avond- en morgenlucht vermijden, zich met wollen stoffen kleeden, voor overmatige bewegingen hoeden, en wijders alle ziekmakende schadelijkheden op alle mogelijke wijzen van zich afwenden; want, de *reconvalescenten* zijn zeer tot *recidiven* genegen, die, waar zij plaats grijpen, doorgaans op chronische, zeer langdurige *rheumatismi* uitloopen.

D. Uitterende koorts.

(*Febris Hectica*).

Bepaling. Eene zeer langdurige, schijnbaar niet hevige koorts, waarmede het ligchaam sterk vermagerd en uitteert, die niet alleen hoogst gevaarlijk is, maar meestendeels doodelijk afloopt, noemt men eene hectische of teringkoorts.

Karakter. De uitterende koortsen behooren tot de asthenische of *Typhus*-soorten, met verminderde werkdadigheid in de verrigtingen van het *reproductive*- of voedingsstelsel, met vermeerderde wederwerking van het slagaderlijke vaatstelsel; vele geneeskundige schrijvers willen deze koortsen niet afzonderlijk beschrijven, maar onder de slepende zenuwkoortsen, de slijmkoortsen en de *phthisis* begrepen hebben.

Zij

Zij houden den aanhoudenden *intermitterenden Typhus*, de verheffingen hebben meerendeels na het eten en des avonds plaats, in den beginne regelmatig, in de meer gevorderde tijdperken zijn de remisfiën kort en onduidelijk, met menigvuldige verheffingen op verschillende uren van den dag en nacht, zonder orde en regelmatigheid.

Zij komen alleen sporadisch voor, en heerschen nimmer epidemisch.

De uitterende koortsen zijn zeer langdurig, weken, maanden en jaren verlopen er, voor dat zij zich beflissen; zelden heeft de overgang in gezondheid plaats: waar zulks geschiedt, moet het in de eerste tijdperken zijn; wanneer de lijdens reeds zeer vermagerd zijn, laat zich bijna nimmer iets anders dan een' doodelyken uitgang verwachten. De overgang in gezondheid heeft, zonder kritische ontlastingen, meestendeels met het uitbotten van een' chronischen huiduitslag, die niet verdreven mag worden, en voor kritisch te houden is, plaats. De dood volgt onder de verschijnselen eener volkomene uitputting van alle krachten.

Haar begin neemt zij somwijlen als eene heete aanhoudende koorts, die eerst later het karakter der teringkoorts ontwikkelt, of zij begint onduidelijk, onder schijnbaar weinig of nietsbeduidende toevallen; de lijder waant zich nog lang gezond, wanneer de oplettende en ervarenene Geneesheer zijnen toestand reeds voor zeer bedenkelijk houdt. Het eerste ontwikkelingstijdperk gaat meestendeels ongemerkt voorbij, en voor de kunstbehandeling verlo-

ren; eerst wanneer de toevallen eenen zekeren trap bereikt hebben, de ziekteverschijnselen duidelijk zijn, houdt zich de lijder voor ongesteld, en zoekt geneeskundige hulp.

Loop en
toevallen.

De toevalen, die men het eerste waarneemt, welke men derhalve die der beginnende koorts noemt, hoezeer dan reeds het eerste ontwikkelingstijdperk voor verstreken te houden is, zijn: gevoel van matheid, lusteloosheid en slaperigheid; na het middagmaal, algemeene hitte, in het aangezicht het sterkste; de wangen worden in een' bepaalden omtrek helder vermiljoenkleurig rood; de pols is daarbij schielijker dan naar gewoonte; de lijders zijn dorstig, eenige uren ongeschikt voor bezigheden; eerst tegen den avond gevoelen zij zich opgeruimd, en in staat, om hunne bezigheden voort te zetten of te hervatten. Na het avondeten keeren dezelfde toevallen terug; en de nachten zijn onrustig; de slaap is weinig, door droomen afgebroken, niet verkwikkend. Deze toestand langer of korter geduurd hebbende, wordt de hitte heviger, niet aanhoudend, maar vliegend, namelijk aan geene vaste uren gebonden, verheft zich na het eten en des avonds, is brandend op het gevoel, aan de wangen, in de handpalmen en voetzolen het sterkst; in het begin der ziekte gaat zij zelden in zweet over, maar de huid blijft droog en is eenigzins ruw; de pols is klein, hard en zeer ras, des morgens langzamer, dan na het eten en des avonds; de ademhaling is kort en schielijk, hijgende bij de geringste krachtoefening en beweging; drooge hoest, drooge mond en keel, aanhoudende dorst,

roode, zuivere tong, witte, glinsterende, half doorschijnende tanden, zeer roode, maar drooge lippen, en lange opgekromde nagels, aan den wortel eenigzins opgezwollen; tamelijk goede eetlust en spijsvertering; eerst harde, verstopte buiksontlasting; later uitputtende buikloop; spaarzame hooggekleurde pis, met een gekleurd vliesje, waarop men oogjes vet waarneemt, en een wit slijmachting of etterachtig, somwijlen bruin of rood, zakfel. Het ligchaam vermageret hoe langer zoo meer, de gemoedsgesteldheid verandert, de lijders worden verdrietig, geraaken ligt in toorn, alles is hun hinderlijk, drift en ontevredenheid beheerschen hen geheel; de nachten zijn zeer onrustig; bij het ontwaken gevoelen zij zich niet verkwikt, maar nog meer afgemat; later komen uitputtende nachtzweeten en buikloop daarbij; het ligchaam vermageret bij den dag, het aangezicht wordt ontsteld, de oogen zijn hol, en schijnen grooter dan te voren, de geringste bewegingen vermoeijen tot flauwworden toe, en gaan met een sterk zweet gepaard; de voeten en handen zwellen zuchtig op, de haren vallen uit, de gemoedsgesteldheid neemt eene andere rigting, de lijder is tevreden, opgebeurd, lijdzaam, en zijne hoop op herstel neemt even zeer toe, als zijne krachten, door de steeds vermeederende uitputtende ontlastingen, afnemen. De krachteloosheid tot het uiterste gekomen zijnde, gaat in slaapzucht over, en de lijder ontwaakt niet weder; de meeste sterven op deze zachte wijze, die men met het uitgaan eener kaars vergelijkt. Somwijlen volgt de dood onder de laat-

ste pogingen der uitblusschende levenskrachten, onder ijlhoofdigheid, onrust en pogingen om op te staan; zij dwingen dan de omstanders, hen uit het bed te helpen, en geven, gedurende de pogingen, die zij of anderen daartoe aanwenden, den geest.

orzaken. De menigvuldige oorzaken, die eene uitterende koorts kunnen voortbrengen, en ook wezenlijk in zekere gevallen voortgebracht hebben, maken het zoo niet zeker, ten minste toch hoogstwaarschijnlijk, dat er aan deze koorts een toestand van voorgeschiktheid voorafgaat, waardoor de eene mensch meer dan de andere daartoe voorgeschikt wordt; want niet altijd brengen dezelfde toevallige oorzaken eene uitterende koorts te weeg; die op andere voorwerpen inwerkende, ook wanneer zij in eene veel geringere mate aanwezig zijn, dezelve met al hare toevallen en ziekteverschijnselen in de grootste uitgebreidheid, ontwikkelen. Waar deze aanleg bestaat, geeft hij zich gewoonlijk door het uiterlijke voorkomen en den geheelen *habitus* te kennen. In bijzondere gevallen heeft dit geene plaats, en het zijn de gezondste personen, die hare slagtoffers worden; maar, in deze gevallen zijn de toevallige oorzaken zeer duidelijk en in het oog loopende, en werken op eene zoo vernielende wijze op de bewerktuiging, dat hare algeheele sloping als een onvermijdelijk gevolg voor oogen ligt.

De geprikkelde toestand van het slagaderlijke vaatstelsel, de vermeerderde werking der opflurpende vaten, de verminderde voeding van het geheele lichaam, zijn die toevallen, welke gewoonlijk aan de
koorts

koorts voorafgaan, en haar eerste tijdperk uitmaken; in den beginne zijn zij zoo niets beduidend, dat zij in het geheel niet in aanmerking genomen worden, en het zoo wel voor den lijder als voor den geneesheer ondoenlijk blijft, het juiste tijdstip te bepalen, waar de ziekte eenen aavang genomen heeft. Uit deze eerste ziekteverschijnselen laat zich, onder zekere bepalingen, afleiden en vaststellen, welke toestand der bewerktuiging aan den aanleg voor deze koorts beantwoordt. Personen, met een zeer prikkelbaar vaatstelsel, gevoelige, hoogst aandoenlijke zenuwen voor ziels- en zinnelijke prikkels, zeer aandoenlijke afscheidende werktuigen, waardoor vele voedende deelen verloren gaan, de voeding zelve, door de buitensporige wederwerking van het zenuw- en vaatstelsel belemmerd en vermindert wordt, zijn boven andere voorgeschikt, om er door aangetast te worden.

Dat deze aanleg zoo wel aangeboren als verworven zijn kan, leert de dagelijksche geschiedenis van deze koortsen onbetwistbaar. Eene regelmatigte leefwijze, met vermindering van alle buitensporigheden, wendt hij velen het gevaar af, en komt de ziekte voor; eene uitspattende leefwijze, daarentegen, doet de voorgeschiktheid toenemen en voortduren, en ten laatste in de teringskoorts zelve overgaan.

Bij personen, die met dezen aanleg geboren zijn, geeft hij zich gewoonlijk door een rank ligchaam, doorschijnende huid, blozende kleur, smalle, ingedrukte borst, langen hals, witte, glinsterende, half doorschijnende tanden, rasen pols, ruime afscheidin-

gen door de gewone wegen, schielijke ademhaling, magerheid, zeer aandoenlijke gemoedsgesteldheid en jeugdigen ouderdom te kennen.

Is de aanleg of voorgeschiktheid niet aangeboren, maar verworven, dan ontbreken die kenteekenen, welke een gebrek in de eerste vorming aanwijzen. De tot in eenen zekeren ouderdom volkomen gezonde voorwerpen ondergaan, door bekende oorzaken, eene in het oog loopende verandering: de bloedomloop wordt sneller, de ademhaling schielijker, de lijders gevoelen hunne krachten afnemen, zonder zich anders ziek te gevoelen, vermageren, veranderen van gemoedsaard, enz. Langer of korter blijven zij in dezen toestand, tot dat zich de koorts door bijkomende toevallige oorzaken ontwikkelt, of verwijdering der voorbeschikkende gesteldheid de vorige gezondheid doet terugkeeren.

evallige
zaken.

De bijna in het oneindige gaande veelvuldigheid en onderscheidenheid der oorzaken, die, blijkens de ervaringen in de geboekte waarnemingen der Geneesheeren te vinden, de uitterende koorts kunnen voortbrengen, maakt het noodig, dezelve, volgens hare waarschijnlijke inwerking op de bewerktuiging, tot eenige hoofdafdeelingen te brengen, en anderdeels onmogelijk, alle bijzonder op te geven; de meest algemeene zullen derhalve hier alleen eene plaats vinden.

Volgens de zinnelijk waar te nemen wijze, hoe de toevallige oorzaken haren schadelijken invloed oefenen, laten zij zich tot vier hoofdafdeelingen terug brengen:

I°. „ Wel-

12. „Welke de spijsvertering, chyl en bloedmaking
„belemmeren en vertragen:”

Als aanhoudend gebruik van slechte, onver-
teerbare, weinig voedsel bevattende spijzen, ge-
brek aan spijzen en onregelmatig diët, op-
hoopingen in de eerste wegen, wormen en an-
dere vreemdaardige prikkels. Zeer verzwakte,
door plaatselijke gebreken aangedane spijsverte-
rings-werktuigen, ziekelijke afscheidingen van
de vochten tot de spijsvertering noodig, van de
gal, alvleeschsap, enz. verstoppingen en ver-
hardingen in de chyl opslurpende vaten; veret-
teringen, ontaarding, aaneengroeijingen, stee-
nen en andere gebreken van het darmscheel, waar-
door de melkvaten ter doorlating van de chyl onge-
schikt worden. Soortgelijke aandoeningen en ont-
aarding van den chylbak en de borstbuis, druk-
king van dezelve; wonden, gezwollen, beensplin-
ters, vreemde, van buiten in het ligchaam geko-
mene zelfstandigheden, die de overvoering van
de chyl in het bloed belemmeren of geheel be-
letten. Gebrekkige bloedmaking, door zwakte
van het bloed en opslurpende vaatstelsel en der
zenuwen; gestoorde verrigtingen der longen en
andere aan de bloedmaking deel hebbende inge-
wanden; onregelmatige omloop en verdeeling
van het bloed; gebrekkige menging van zijne
bestanddeelen onderling, als een gevolg der ver-
anderde afscheidingen en mangel aan die stof-
fen, welke tot de voeding de meest noodzake-
lijke zijn; en alle *cachexiën*.

20. „Die

2°. „Die de prikkelbaarheid en gevoeligheid buiten hare gewone grenzen verhoogen.”

Hieronder behooren voornamelijk een te weinig prikkelende leefregel, bij lieden, die gewoon waren (zoo als men zegt) sterk te leven, als mangel aan goede vleeschspijzen, aan wijn, bier en kruiderijen, bij anders daaraan gewende personen. Groot verlies van bloed en andere overmatige ontlastingen, voorak door kunst bewerkte, misbruik van ontlastmiddelen, zelfbesmetting, enz. Gebrek aan alle andere levensprikkels, werkeloosheid naar ziel en lichaam, mangel aan zinnelijke aandoeningen, koude, langdurige koortsen en andere ongesteldheden, die eene ziekelijke prikkelbaarheid en gevoeligheid naar zich slepen, zonder dat men altijd de juiste wijze, hoe zij dezelve verhoogen, verklaren kan. Vele der toevallige oorzaken oefenen ontwijfelbaar in diervoege haren schadelijken invloed, zij brengen eerst eene voorgeschiktheid, en later, door hare voortdurende inwerking als toevallige oorzaken, de koorts zelve voort.

3°. „Die als vreemdaardige prikkels, welke moeilijk, of in het geheel niet kunnen weggenomen worden, schadelijk inwerken.”

Onvolkomene kritische ontlastingen in heete ziekten, waardoor stoffen terug blijven, die ontlast hadden moeten worden; aanhoudende gemoedsaandoeningen, verdriet, angst, kommer, zorgen, te leurgestelde hoop, onbevredig-

digde liefde, enz. waarvan de oorzaken gewoonlijk buiten het bereik des Geneesheers en van zijne kunst zijn. Teruggedrevene huidziekten, onderdrukte habituële ontlastingen en jicht; kropklier-, venerische- en andere scherpten; van buiten in het ligchaam gebragte prikkels, aanhoudend en langdurig gebruik van planten en minerale vergiften, bereidingen uit het Kwik, Rottekruid en *Cobalt*; eenige eigenaardige giften, als *Aqua Tophana*, en fijne Italiaansche giftbereidingen, de geheime uit planten bereide giften der negerflaven, die alle op eene zeer langzame, maar zekere wijze, binnen een bijna te berekenen tijdverloop, door uitterende koortsen dooden.

4°. „Die de voedende stoffen aan het ligchaam onttrekken en de voeding belemmeren.”

Als verzwerigen, beenbederf, vermeerderde afscheidingen, die aan het ligchaam vele voedende deelen onttrekken; vermeerderde ontlastingen van het speeksel, melk, zaad, slijm, lidvocht, weivocht, enz.; aanhoudende en overmatige ziels- en ligchamelijke vermoeijenissen, groote gezwellen, een te sterke en schielijke groei des ligchaams, verstoppingen en verhardingen in de ingewanden, klieren en het lymphatiek vaatstelsel, aaneengroeijingen en andere plaatselijke aandoeningen, onevenredigheden in de onderscheidene deelen en werktuigen des ligchaams tegen elkander, werktuigelijke en scheikundige beleedingen in gedaante en menging, waar-

door zij tot hunne verrigtingen ongeschikt worden en de voeding belemmeren.

**Naaste
oorzaak?**

Vele vooronderstellingen en hypothesen heeft men te allen tijde opgesteld, om de naaste oorzaak der uitterende koorts te verklaren. Dan eens heeft men den aanleg, die haar ontstaan voorbereidt, dan eens de toevallige oorzaken, die haar ontwikkelen, dan weder de eene of andere harer uitwerkfelen en verschijnfelen daarvoor gehouden, uit enkele gevallen algemeene gevolgtrekkingen afgeleid, en dat, wat een gevolg der ziekte was, voor hare naaste oorzaak genomen. Voornamelijk trof dit de bijzondere plaatselijke aandoeningen, waarmede men deze koorts zich gewoonlijk ziet paren; dan weder zocht men dezelve in de vloeibare, dan in de vaste deelen, of in de schadelijke inwerkingen van materiële koortsprikkels. In de tijden, waarin de Humoral-pathologie het modelstelsel in de geneeskunst geweest is, nam men het eerste gevoelen aan; naarmate dit stelsel door een tegenovergesteld aangerand en verbannen werd, zag zich het laatste tot het heerschende verheven.

Zonder ons hier in eene breede optelling der onderscheidene gevoelens en stelsels, of met derzelver wederlegging in te laten, zullen wij ons alleen tot de aanwijzing bepalen van dien toestand der bewerktuiging, welken wij standvastig bij deze koorts vinden plaats te hebben, dien wij hier als naaste oorzaak beschouwen, zonder te kunnen bepalen, in welke stoffelijke betrekkingen en veranderingen zijne oorzaak moet gezocht worden.

De-

Deze van den gezonden toestand afwijkende gesteldheden zijn: *algemeene verhoogde prikkelbaarheid*, vooral in het vaatstelsel, en *te groote gevoeligheid*, waarvan eene te sterke wederwerking van het bewerktuigde ligchaam op de gewone tot instandhouding des levens noodige prikkels het gevolg is; de geringste zinnelijke en gemoedsaandoeningen, beweging, spijs en drank, eene meer prikkelende lucht, werken als onevenredige sterke prikkels, brengen en houden het vaatstelsel in eene voortdurende te hevige wederwerking, waarin de geheele bewerktuiging, wegens den grooten invloed van het vaatstelsel op alle hare deelen, spoedig moet deel nemen. Het hart en de slagaderen trekken zich met groote snelheid, maar verminderde intensieve sterkte, zamen; de opslurpende vaten nemen te veel op, en kunnen het opgenomene niet genoegzaam toebereiden; de afscheidende werktuigen scheiden te veel en onregelmatig af; het opgeslurpte niet behoorlijk voorbereid en bewerkt zijnde, geschiedt de bloedmaking gebrekkig; de onregelmatige afscheidingen hebben onevenredigheden in de zamenstellende deelen van het bloed ten gevolge, waardoor hetzelfde voor de zeer prikkelbare vaten een vreemde en ongeschikte prikkel wordt, en dezelve tot eene versnelde beweging onophoudelijk aanspoort.

Het onvermijdelijke gevolg van deze verschillende uitwerkselen eener te groote prikkelbaarheid en gevoeligheid, zijn gebrek aan voedende stof en daardoor verminderde voeding; maar niet, gelijk anderen gewild hebben, is de algemeene vermagering
van

van het ligchaam de naaste oorzaak van de uitterende koorts.

Deze beschouwing der naaste oorzaak van de uitterende koortsziekten, hoezeer geenszins boven alle tegenwerpingen verheven, levert toch, mijns bedunkens, dit voordeel op, dat zij eene verklaring toelaat, hoe zoo zeer verschillende en afwijkende toevallige oorzaken steeds een en hetzelfde uitwerkfel kunnen hebben, en hoe deze koorts dan eens meer als eene oorspronkelijke, dan weder meer als eene toevallige of symptomatische voorkomt.

Gebreken in de spijsvertering, chyl en bloedmaking, gebrek aan de noodige levensprikkelers, verlies van bloed of andere tot de voeding regstreeks of verwijderd noodige sappen in eene eenigzins groote hoeveelheid, scherpten, vreemdaardige prikkels, veretteringen, verstoppingen en andere werktuigelijke gebreken, die menigwerf de uitterende koortsen voortbrengen of daarmede gepaard gaan, laten zich, volgens natuur- en ziektekundige grondbeginselen, die algemeen voor waar erkend zijn, zonder eenigen dwang verklaren, en met onze meening in overeenstemming brengen, daar hunne inwerking de prikkelbaarheid en gevoeligheid verhoogt en de menging van het bloed verandert.

De uitterende koorts, die een gevolg is van hevige en aanhoudende hartstogten, laat zich mischien wel het gemakkelijkst verklaren, wanneer wij voor bewezen vaststellen, dat de afscheiding van het zenuwvocht door de hersenen en de zenuwen plaats hebben. De hartstogten werken als prikkels op het her-

herfengeftel , waardoor de affcheiding van het zenuwvocht in eene grootere hoeveelheid plaats heeft. Tot onderhouding der levenslange beweging van het hart en het vaatftelfel, is de invloed des zenuwvochts onontbeerlijk en heeft onafgebroken plaats. De zenuwen, die zich in de fpiervezelen van het hart en de vaten verbreiden, doen, gelijk een electrieke geleider, die met eene steeds werkende electrifeermachine in verband is, de zenuwvloeiſtof uitvloeijen. Het zenuwvocht is de natuurlijke prikkel voor alle willekeurige en onwillekeurige bewegingen, in de werktuigen en deelen met levenskracht begaafd. Daar nu, door eene vermeerderde affcheiding van het zenuwvocht in de herfenen, een' ſterkeren toevloed door de zenuwen naar die deelen, welke aan den wil niet onderworpen zijn, noodwendig het gevolg zijn moet, zoo laat zich ligt inzien, dat op deze wijze, door het invloeiende zenuwvocht, het hart en vaatftelfel te zeer geprikkeld worden, in eene te ſterke wederwerking geraken, waarvan tering en flopning der geheele bewerktuiging het onvermijdelijk gevolg is.

Gewoonlijk verdeelt men de uitterende koortſen Verdeeling. in oorſpronkelijke (*primariae*), waar de koorts het gevolg van een algemeen en gelijkmatig lijden der geheele bewerktuiging is. In toevallige of afgeleide (*ſymptomaticae, ſecundariae*), waar zij het gevolg van het bijzondere lijden van enkele deelen of ſtelfels zijn, die, alvorens zich de uitterende koorts ontwikkelde, ziekelijk geſteld waren; of waar eene andere ziekte voorafging, die de toevallige oorzaak

I. DEEL. A a van

van eene uitterende koorts geworden is. Voor de nadere kennis der uitterende koorts kunnen deze of dergelijke verdeelingen , men moge dezelve al of niet aannemen , van weinig nut zijn , daar hare naaste oorzaak steeds dezelfde zijn moet en is , maar alleen langs onderscheidene wegen voortgebracht wordt. Anders is het er mede gelegen , wanneer men dezelve uit een practisch oogpunt beschouwt ; veel , dikwijls alles komt er dan op aan , of zij in den straks genomenen zin oorspronkelijk of toevallig is. In het eerste geval kan de Geneesheer alleen door hulpmiddelen , die regtstreeks op de naaste oorzaak werken , iets tegen de koorts ondernemen ; terwijl daar , waar het tweede geval plaats heeft , de gunstige uitslag der geneeskundige behandeling afhangt van de genezing dier ziekte , welke de koorts voortgebracht heeft en onderhoudt.

Voorzegging De voorzegging is in de uitterende koortsziekte steeds ongunstig : in de eerste tijdperken zijn zij somwijlen geneesbaar ; hoe langer zij geduurd hebben , zoo veel te grooter is het gevaar , en de gevallen eener volkomene genezing zeldzamer ; de oorspronkelijke is gevaarlijker dan de toevallige , en meestendeels eindigt zij in den dood ; de toevallige is meer of minder gevaarlijk , naarmate het gemakkelijk , moeilijk of onmogelijk is , de ziekelijke gesteldheden der bijzondere stelsels en deelen , waarvan zij het gevolg is , te genezen.

Steeds toenemende vermagering , bij goeden eetlust en tamelijke spijsvertering , uitputtende ontlastingen , groote holle oogen , vuile , finerige , gele
kleur,

kleur, sneller wordende pols, groote hitte, hevige dorst, het uitvallen der haren, zijn toevallen, die het grootste gevaar en den naderenden dood voorspellen. Bij de toevallige teringkoorts fluiten groote werktuigelijke gebreken, veretteringen in de edele ingewanden, of zeer groote verzweringen in minder belangrijke deelen, aanhoudende buitensporige ontlastingen, waardoor vele voedende deelen verloren gaan, b. v. in den honigaardigen pislloed, het grootste gevaar in.

Goed is het, wanneer de snelheid der pols vermindert, de hitte, dorst en de overmatige ontlastingen, vooral der nachtzweeten, afnemen; de eetlust matig, de spijsvertering goed, de lijder vleeziger wordt, de krachten toenemen, de bekende toevallige oorzaken opgeruimd en de onderscheidene verrigtingen tot hare gewone evenredigheden onderling terugkeeren.

Steeds zij men echter bedacht, dat de uitterende koortsen nimmer zonder gevaar zijn, dat er slechts weinige lijders van genezen worden, en dat er zeer dikwijls, in den loop dezer ziekten, tusschentijdperken voorkomen, waarin alles eene gunstige uitkomst schijnt te voorspellen, die door eene spoedige hevig voortgaande verslimmering, welke in den dood eindigt, gevolgd wordt. Nimmer belove men derhalve stellig genezing, en late zich tot geene al te gunstige voorzegging verleiden, zoo lang niet de voortdurende beterschap reeds eenigen tijd volgehouden heeft, regelmatig en gelijkmatig voort te gaan.

Genezing. Wanneer men de menigvuldigheid der toevallige oorzaken, die eene uitterende koorts kunnen te weeg brengen; het bijzondere lijden van enkele deelen en stelsels, die aangedaan kunnen zijn; de naaste oorzaak, zoo als wij die ontwikkeld hebben, en het bijzondere van deze koorts, dat zij dikwijls oorspronkelijk, maar nog veel meer toevallig voorkomt, naar waarde in overweging neemt, zal men ligtelijk inzien, dat de geneeskundige behandeling van deze koorts, om doelmatig te zijn, veelvuldige wijzigingen, veranderingen en zelfs schijnbare tegenstrijdigheden noodwendig vordert.

De aanwijzingen, die men te volgen heeft, en waaraan voldaan moet worden, zijn even onderscheiden, als het de voortbrengende oorzaken en bijzondere gesteldheden zijn. Voornamelijk echter komt het, bij eene beredeneerde behandeling, daarop aan, dat men :

- 1°. Aan de gemaakte verdeling in oorspronkelijke en toevallige uitterende koortsen vasthoude, en de behandeling daarnaar regele.
- 2°. Dat men, bij de oorspronkelijke, het geneesplan, voornamelijk tegen de naaste oorzaak en de laatste uitwerkselen, die al de schadelijke invloeden voortgebracht hebben, inrigte.
- 3°. Dat men alle vreemde aardige prikkels, die een geprikkelden toestand in het hart en vaatstelsel onderhouden, door eene verhoogde wederwerking de werktuiging slopen en de voedende deelen nutteloos verspillen, zoo veel en zoo spoedig verwijdere.

4°. Dat

4. Dat men de bijzondere uitwerkselen der toeval-
lige oorzaken, en die aandoenigen der bijzon-
dere deelen en stelsels, waarvan de uitterende
koorts het gevolg is, opruime en bestrijde.

5. Dat men door een' doeltreffenden leefregel zorg
drage, dat het organisme toereikende van voed-
fel voorzien en ondersteund worde, ten einde
de levenskrachten, en de daarvan afhankelijke
genezende krachten der Natuur, in staat te hou-
den, om hare heilzame pogingen behoorlijk te
ontwikkelen; dat is, den zieken in den gezon-
den toestand herscheppen.

1^e. *Aanwijzing.* „Men trachte te ontdekken, of
„de uitterende koorts oorspronkelijk of toevallig
„zij.”

Den geheelen loop der ziekte naauwkeurig onder-
zocht, de voorafgegane omstandigheden en schade-
lijkheden, die als oorzaken kunnen gewerkt hebben,
kennende, en het voorafgegane met de tegenwoor-
dige toevallen vergelijkende, zal het zelden moeilijk
zijn, het onderhavige verschil te beslechten; alleen
merk ik hierbij nog aan, dat er bij de toevallige
uitterende koorts eene zekere onevenredigheid in de
ziekelijke aandoeningen plaats heeft, in dier voege :
dat de aanwezige toevallen een grooter lijden van
het eene deel boven het andere aanwijzen, de af-
scheidende en ontlastende werktuigen, meer dan bij
de oorspronkelijke, van den gezondheids-standaard
afwijken, vooral in den beginne, reeds voor dat zich
de ziekte volkomen ontwikkeld heeft; wanneer ,

daarenboven overvloedige nachtzweeten, etterachtig zetsel in de pis, ongekleurde buiksonstlastingen, met half of in het geheel niet verteerde spijsen gemengd, met zeer rasfen pols, bedorvene spijsvertering, bloed, slijm en etterachtige ontlastingen door gewone en buitengewone wegen, opgezwollene verharde klieren, enz., aanwezig zijn, is de toevalligheid der uitterende koorts bijna zeker.

De oorspronkelijke, daarentegen, kenschetst zich, door hare hardnekkigheid, gelijkmatige trapswijze verslimmering, sterken eetlust, tamelijke spijsvertering, weinig veranderde ontlastingen, zeer rasfen pols, groote aandoenlijkheid van het zenuwgestel, vermagering en verval van krachten, afwezigheid van alle die toevallen, welke een plaatselijk lijden van eenig stelsel of deel aanwijzen.

Door een naauwkeurig onderzoek van alles, wat op den lijder en zijne ziekte betrekking heeft, wordt aan deze aanwijzing, die men ook de voorbereidende zoude kunnen noemen, voldaan; zij leert ons, waarop wij voornamelijk in de behandeling te letten hebben, en hoe men handelen moet, om op de doelmatigste wijze aan de overige aanwijzingen ter genezing te voldoen.

2^e. *Aanwijzing.* „In de oorspronkelijke uitteren- „de koorts regele men de behandeling in dier „voege: dat zij de naaste oorzaak en de laatste „uitwerkselen der schadelijke invloeden bestrijde.”

In acht nemende, wat wij over de naaste oorzaak van deze koorts gezegd hebben, zal er in het vol-
doen

doen aan deze aanwijzing op drie zaken te letten zijn: of liever deze aanwijzing heeft drie onderafdeelingen:

1°. Men vermindere de verhoogde prikkelbaarheid.

2°. Men trachte de gevoeligheid lager te stemmen.

3°. Men zoeken de voeding te bevorderen, ten einde het evenwigt tusfchen het verbruik en den aanvoer van voedende ftof onderhouden en herfteld worde.

a. „Men vermindere de verhoogde prikkelbaarheid.”

Een der weinige maar wezenlijke voordeelen der zoo hoog opgevijzelde nieuwe ontdekkingen en voortgangen der geneeskunst fchijnt mij dáárin gelegen, dat zij ons geneesmiddelen hebben leeren kennen, die regtftreeks, niet door prikkeling en daardoor bewerkte uitputting, de prikkelbaarheid verminderen, en zonder, ten minfte in matige giften wederwerkingen in de gevoelige vezel op te wekken. Hoezeer wij nu wel niet weten, op wat wijze zij dit bewerken, is het voor den practifchen Geneesheer toch genoeg, te weten, dat er zoodanige middelen beftaan, waarvan de nuttigheid proefondervindelijk bewezen is, en in bepaalde gevallen met de heilzaamfte gevolgen gebruikt worden. Tot deze foort van geneesmiddelen behooren voornamelijk de kerslauwrier, de roode vingerhoed, het *Aconitum*, de *Hyosciamus*, de *Belladonna* en het *Seimen Phellandrii aquatici*; andere tot deze foort behoorende gaan wij met ftilzwijgen voorbij, daar de genoemde diegenen zijn, waarvan men zich met

voordeel [in deze ziekte bedient, als de pols zeer fchielijk, de huid droog en heet, de wangen eene vermilioenkleur in eenen bepaalden omtrek hebben, de handpalmen en voetzolen brandend heet zijn, de spijsvertering goed is, met één woord, wanneer alle verrigtingen met eene zekere snelheid en levendigheid, zonder intensive fterkte plaats hebben, zonder dat er een ftoffelijke prikkel aanwezig is, die ze voortbrengt en onderhoudt, zijn de genoemde middelen aangewezen.

Volgens eigene waarnemingen behoort aan de *Digitalis Purpurea*, in verband met *Opium* en *Hyosciamus*, de eerste plaats; de tweede aan het *Semen Phellandrii aquatici*; de nuttigheid der andere wil ik daarom juist niet beperken, want ook die heb ik met het beste gevolg door anderen zien aanwenden, en zelf gebezigd; de *Digitalis* moet in den beginne in geene te groote giften toegediend worden, daar zij anders walging, braken, duizeligheid en vermeerderde ontlastingen te weeg brengt. Ook moet men ze niet te fchielijk achtereenvolgende, maar flechts twee of drie malen in de 24 uren geven; men kan met een vierde of half grein beginnen en daarmede allengskens tot 3 of 4 greinen voor iedere gift klimmen; zij kan in poeder, pillen, opgietsel, of aftreksel met wijngeest, gebruikt worden; het laafte komt wegens den prikkelenden en verfchillenden wijngeest het minfte in deze ziekte te pas. Het krachtigfte werkt het verfch bereide poeder; zijn de ontlastingen overvloedig, of is er eene
kramp.

krampachtige gesteldheid aanwezig, dan voege men er het *Opium* of *Hyosciamus* bij, maar vooral in het begin der ziekte niet dan in kleine hoeveelheden.

℞. *Puly. Digit. Purp. rec.* gr. iv—xij.

Sacchar alb. ʒ ij.

M. F. puly. Div. in xij part. aeq.

D. S.

ʒs Morgens en ʒs avonds een poeder.

De werking der *Digitalis* openbaart zich gewoonlijk eerst na verloop van eenige dagen, door het verminderend getal der polsslagen. De pols, die in deze koortsen niet zelden 140 slagen in de minuut maakt, wordt langzamer, dan eens vroeger, dan eens later. Door sterke giften van dit middel kan het getal der polsslagen in korten tijd tot op 40 of 50 verminderd worden; zeldzaam ziet men echter daaruit veel goeds voor den lijder voortvloeijen; het is beter, waar de vermindering der polsslagen zeer spoedig volgt, de giften te verkleinen, of eenige dagen geheel ter zijde te stellen, want eene langzame vermindering der polsslagen geeft eene betere en meer duurzame uitkomst; men blijft met dit middel zoo lang volhouden, tot dat de polsslagen tot het natuurlijke getal teruggebracht zijn, en vermeerdert de giften, als de pols weder sneller wordt.

Indien de *Digitalis* de bedoelde uitwerking niet heeft, maar op eene andere wijze de bewerktuiging

aandoet, die den toestand des lijders verslimmert, behoort met haar gebruik opgehouden, en de *Aqua Lauro Cerasi Destillata*, het *Aconitum* of de *Belladonna* in hare plaats gesteld te worden; deze middelen vorderen insgelijks, dat zij met groote omzigtigheid, in kleine giften, die men allengskens vermeedert, toegediend worden. De *Aqua Lauro Cerasi* geve men dagelijks twee of drie malen van 2 tot 10 droppels; dezelve versch en goed bereid zijnde, moet men ten hoogste tot 20 droppels klimmen; doch niet eerder, dan wanneer zij in kleinere giften eenigen tijd vruchteloos gebruikt is en bij zeer trage en ongevoelige gestellen; onvoorzigtig aangewend, kan deze gift als een zwaar vergift werken, en door geheele uitblusfching der prikkelbaarheid den lijder dooden.

Het *Aconitum* en *Stramonium* geeft men in *Extract* van een half tot vier greinen, dagelijks drie of vier malen; de *Belladonna* in poeder van een tot vier greinen, des morgens en avonds; want versch bereid, werkt dit middel ook in kleine giften fomwijlen zeer hevig, bijzonder op de keel, het hoofd en de zinwerktuigen; zoo ras derhalve de lijders over droogte in de keel en mond, duizeligheid, flikkeringen voor de oogen en ruischen in de ooren klagen, moet men er mede ophouden, of de giften kleiner en in grootere tusschenruimte toedienen.

Het *Semen Phelland. Aquat.* breng ik hier onder dezelfde klasfe van geneesmiddelen, wegens de voortreffelijke uitwerking, die het zoo dikwijls in deze
ziek-

ziekte heeft, hoezeer hetzelfde niet alleen tegen de oorspronkelijke, maar ook tegen de toevallige hecristische koorts en inwendige verzweringen een onzer beste geneesmiddelen oplevert.

Men bedient er zich van in de gedaante van poeder of aftreksel; het eerste geeft men van vijf greinen tot eene scrupel twee of vier malen 'sdaags, met water of siroop; in aftreksel eener drachme tot eene halve once, alleen of in verband van het eene of andere der genoemde middelen.

Ook de minerale zuren, vooral het vitrioolzuur en die bereiding, waarvan hetzelfde het hoofdbestanddeel uitmaakt, het zuur van HALLER en MYNSIGHT, hebben het vermogen, om de snelheid van den bloedsomloop te verminderen, en daardoor de genezing der uitterende koortsen, zoo niet geheel te voldingen, echter zeer te bevorderen, en in het geheel den toestand des lijders te verbeteren. De Ouden meenden, dat zij de opgeloste vochten, vooral het bloed, verdikten, daardoor de overvloedige ontlasting matigden en heilzaam voor de bewerktuiging waren. Veel aannemelijker is het, dat zij, even als de andere hier voren genoemde middelen, de prikkelbaarheid des vaatgestels verminderen, en tevens den samenhang der vezelen, met de daarvan afhankelijke veerkracht, vermeederen of versterkend werken.

b. „ Men vermindere de al te groote gevoeligheid.”

De meeste der straks genoemde geneesmiddelen behooren tevens tot de klasfe der verdoovende (*Nar-*

cotica), zoodat zij niet alleen de prikkelbaarheid, maar ook de gevoeligheid verminderen. Indien zij echter aan dit doel in de opgegevene hoeveelheid niet voldoen, dan kunnen de giften vergroot, of tot iedere een vierde of half grein van het waterachtige *Opium-Extract*, het *Opium* zelf of het *Extract. Hyosciami* bijgedaan worden. Aan het *Opium* wordt in dit geval door vele Geneesheeren de voorrang boven alle andere verdoovende geneesmiddelen toegekend, en zij raden eene groote gift, van een tot twee greinen op ééns gegeven, als veel beter aan het oogmerk voldoende, boven kleine en herhaalde, aan. Jonge kunstoeffenaars zullen intuschen zeer wel doen, meer omzigtig met kleine giften, die men van tijd tot tijd vermeederen kan, te beginnen, dan op ééns eene te groote hoeveelheid te geven.

c. „Men bevordere de voeding.”

Door aan de vereischten van *a* en *b* te voldoen, wordt de genezing in deze zoo hardnekkige ziekte, somwijlen mogelijk, echter hoogst zeldzaam alleen verkregen; gewoonlijk moet tevens aan deze laatste aanwijzing voldaan en moeten de toe te dienen geneesmiddelen zóó gekozen worden, dat zij aan de drie hier afzonderlijk voorgestelde aanwijzingen te gelijk voldoen.

De algemeene regelen, daarbij in acht te nemen, zijn voornamelijk, dat men alle overbodige ontlastingen tot haren natuurlijken staat terugbreng, of waar zulks niet geschieden kan, toch zoo veel mogelijk in bedwang houde; dat de versterkende en

voedende geneesmiddelen, die men bezigt, ligt verterbaar, niet verhittende noch prikkelende zijn, en eene groote hoeveelheid voedingsstof in een' kleinen omvang bevatten; dat er geene ophooping in de eerste wegen aanwezig, of waar zij zijn mogten, eerst opgeruimd worden, en de lijders het gebruikte zonder hinder verdragen en verteren.

De versterkende en voedende geneesmiddelen zijn hier op hunne plaats, en kunnen nimmer zonder nadeel verzuimd worden; waar de koortstoevallen aanhouden, de krachten sterk verminderen en de lijders zeer vermageren. Men geve de Kina in afkookfel of aftrekfel in ruime giften, of in poeder, waar zij verdragen wordt in geene te kleine hoeveelheid, van eene tot twee oncen in de 24 uren, gedurende een' geruimen tijd volhoudende; de IJslandsche Mos, in afkookfel, gelei, of ook wel het poeder gebragt in een *Electuarium*, vereenigd met Kina en het zaad van de water-Venkel. Waar men voeden wil, is de Mos een van de voortreffelijkste geneesmiddelen, haar bitter is niet onaangenaam voor den smaak en wekt de spijsverterende krachten op; de meeste menschen kunnen ze gebruiken, vele gewennen er spoedig zoodanig aan, dat zij in plaats van thee of andere dranken daarvan gebruik maken. Als een huismiddel is zij bijna overal algemeen ingevoerd en wordt naar waarde geschat. Bovendien verdient zij nog bijzonder de oplettendheid der Geneesheeren, als een der goedkoopste geneesmiddelen, vooral in de practijk bij de mindere volks-

volksklassen, waar gebrek aan het noodige voedsel een der moeilijkste hinderpalen is, die men uit den weg te ruimen heeft, om de genezing mogelijk te maken, en waar men door een ruim gebruik van dit middel alleen aan de onderscheidené aanwijzingen kan voldoen.

Waar de *Kina* aangewezen is, en verdragen wordt, kunnen ook andere versterkende en vooral bittere geneesmiddelen van nut zijn, en hare plaats vervangen; echter zal toch steeds de eerste plaats door de *Kina* bezet blijven.

De leefregel moet, waar de versterkende geneesmiddelen aangewezen zijn, voedend en versterkend wezen; wij onthouden ons hier van eene breedvoerige behandeling, daar in de wijze, *hoe* aan de vijfde aanwijzing te voldoen is, het algemeene en bijzondere over den leefregel in deze koortsen, zijne plaats vinden zal.

3^e. *Aanwijzing*. „ Men verwijdere de vreemde, „ aardige prikkels, die eene vermeerderde wederwer- „ king in het hart en vaatgestel te weeg gebragt hebben en onderhouden.”

In zeer vele gevallen ligt de oorzaak der uitterende koortsen in een' vreemden prikkel, en zij is geheel toevallig, hare geneesbaarheid afhankelijk van de mogelijkheid of onmogelijkheid, om deze prikkels te verwijderen. Somwijlen zijn zij ligt te ontdekken en kunnen opgeruimd worden; in vele gevallen blijven zij aan den Geneesheer onbekend, of zijn van dien aard, dat zij niet meer te verwijderen of

ge-

geheel boven het bereik der geneeskunst zijn. Langzaam werkende vergiften, aanhoudende gemoedsaandoeningen, leveren hiertoe voorbeelden op.

De menigvuldigheid der prikkels, die eene uitterende koorts kunnen voortbrengen, maakt, dat wij ze hier niet afzonderlijk, maar alleen in het algemeen kunnen aanwijzen.

Ophooping van vreemde stoffen in de maag en darmbuis, zoo wel van buiten in dezelve gebragt, uit ziekelijke afscheidingen of onverteerbare spijsen voortgekomen, stukjes geld, metaal, spelden, naalden, korenaren, enz. kunnen door hunne onafgebroken voortdurende prikkeling eene uitterende koorts voortbrengen, die niet anders dan door verwijdering dezer stoffelijke oorzaken te genezen is. Om dezelve te ontlasten, geve men een braakmiddel, en herhale hetzelfde zoo dikwijls, tot dat de teekenen der gastrische ophooping van het aanzijn van vreemde lichamen in de maag aanwijzende, verdwenen zijn. Somwijlen is het goed, dat men aan de braakmiddelen, de oplosfende geneesmiddelen *Terra Foliatata Tartari* met bittere *Extracten* laat voorafgaan, bijzonder wanneer er eene slijmachtige gesteldheid aanwezig is. Laxeermiddelen zijn bijna in alle gevallen nadeelig, en derhalve te vermijden.

Zijn wormen in de eerste wegen de oorzaak der uitterende koorts, iets, dat bij kinderen dikwijls gebeurt, dan moeten die middelen, reeds bij de wormkoorts aanbevolen en in ruime mate toegediend worden, verbonden met bittere en versterkende ;

de; de ijzerhoudige middenzouten en de *Kina* zijn de meestvermogendste onder alle andere.

Vreemde lichamen in de luchtpijp, de borst en buikholte, welke door hunne prikkeling eene uitterende koorts doen ontstaan en onderhouden, moeten op de spoedigste en doelmatigste wijze, langs den kortsten weg, ontlast worden, en de koorts, nadat zij weggenomen zijn, voortdurende als eene oorspronkelijke behandeld worden.

Is de uitterende koorts een gevolg van gebruikte vergiften, en is derzelver zamenstelling bekend, dan moeten de lijders als vergiftigde behandeld worden: men ondersteune door voedende en versterkende geneesmiddelen en leefregel de krachten; onderhoude bij den lijder eene opgeruimde gemoedsgesteldheid en hoop op herstel: zoo ook in die gevallen, waar teleurgestelde hoop, liefde en eerzucht, vrees, kommer of een andere aanhoudende hartstogt eene uitterende koorts onderhoudt; verstrooiingen, bewegingen in de vrije lucht, gepast levensgenot en een goede leefregel zullen hier het meeste moeten doen.

4^e. *Aanwijzing*. „Men trachte de bijzondere „uitwerkingen der toevallige oorzaken en aandoe- „ningen der bijzondere deelen en stelsels, waarvan „de uitterende koorts het onmiddelijk gevolg is, „op te ruimen en te bestrijden.”

Zwakte der spijsverteringswerktuigen is aan de chylmaking hinderlijk, en kan, waar zij lang aanhoudt, eene uitterende koorts naar zich slepen. Bittere en versterkende geneesmiddelen, aromatieke wijn-
ach-

achtige aftreksels, staalbereidingen, gekruide voedzame kost, matige beweging en opgebeurde gemoedsgefteldheid leveren hier de hoofdzakelijkfte middelen ter genezing. Als eene vermeerderde flijmaffcheiding in de luchtpijp, de longen, de *urin*-affcheidende werktuigen, de geflachtsdeelen of langs andere wegen, door groot verlies van vochten, de krachten aanhoudend uitput, dan komen de zamentrekkende verfterkende geneesmiddelen, de harsachtige gomfoorten, de loogzouten en vooral het middel van GRIFFISH te pafte, dat op deze wijze is zamengefteld:

Rx. *Myrrhae* dr. j.

Solve terendo in mortario cum

Aq. Alexiter. simpl. unc. viß.

— *Spirituos.* dr. vj—unc. j.

Deinde adde:

Sal. Absinth. dr. ß.

Sal. Martis gr. xij.

Syr. Simpl. dr. ij.

Md. S.

In vier deelen te verdeelen en daarvan 's daags drie maal, des morgens, 'smiddags en 'savonds een deel te nemen.

De heilzame uitwerkfelen van dit middel, daar, waar andere, en zelfs de kina, werkeloos bleven, wordt door vele Geneesheeren getuigd. Met de *myrrhae* kan men, mits van 18—20 greinen voor iedere

I. DEEL. B b gift,

gift, en ook met de andere zamenstellende middelen, trapswijze klimmen; naarmate de toestand des lijders verbeterd, worden de giften kleiner genomen, en er allengs geheel mede opgehouden.

Hebben overmatige bloedvloeijingen of aderlatingen, de uitterende koorts voortgebracht, dan verschaffen de minerale zuren, het aluin en de bittere versterkende zamentrekkende geneesmiddelen de meeste hulp.

Onderdrukte bloedontlastingen, die natuurlijk, of door gewoonte ter onderhouding der gezondheid, noodzakelijk geworden zijn, moeten hersteld en weder in gang gebragt worden. Versterkende voedende geneesmiddelen en leefregelen zijn, in de meeste gevallen, de krachtigste hulpmiddelen, om dit doel te bereiken.

Als de uitterende koorts haren oorsprong uit overvloedige afscheidingen ontleent, moet men haar op de geschikste wijze met zamentrekkende middelen, of volgens de bijzondere oorzaken, behandelen.

Teruggetredene huidziekten trachte men op nieuw te doen uitbotten, de teruggedrevene jicht naar de uitwendige eerst aangedaan geweest zijnde deelen uit te lokken, door warme baden, roodmakende oplegfels, wrijvingen en door het inwendig gebruik van spiesglas of andere op de huid werkende middelen.

Eene te schielijke en te sterke groei des ligchaams vordert voedende en versterkende geneesmiddelen, rust, met vermindering van allen vermoeijenden arbeid. Bij overvloedige zogaffcheiding moet het zingen terstond verboden worden.

Ver-

Verstopningen en verhardingen der ingewanden en klieren zijn met oplosfende prikkelende middelen te behandelen.

Bijzondere fcherpten, de venerifche, fcerophuleufe, rachitifche en fcorbutifche, gaan gewoonlijk, waar zij eene algemeene ziekelijke gefteeldheid der bewerktuiging voortgebragt hebben, met eene hectifche koorts gepaard. De behandeling moet hier vooral tegen deze ziekten gerigt zijn, daar, deze opgeruimd zijnde, de koorts gewoonlijk ophoudt; maar meerendeels zullen naast deze ook de voedende en verfterkende middelen noodig zijn.

Het tot hiertoe gezegde zal genoegzaam zijn, om ieder op de verfchillende wijzigingen, die de behandeling der uitterende koortfen, volgens hare zoo verfchillende oorzaken, kan noodig maken, oplettend te maken. Eene breedvoerige behandeling der aanwijzigingen, die bij de eene of andere in acht zijn te nemen, konde hier ons doel niet zijn, daar dezelve als op zich zelve beftaande ziekten moeten behandeld worden, en alsdan ter zijner plaatfe daarvan het noodige zal gezegd worden. Alleen voeg ik hier nog deze aanmerking bij: dat men zelden, door de bijzondere oorzaken te verwijderen, flaagt, de eenmaal ontwikkelde hectifche koorts met al hare gevolgen te doen ophouden, maar dat men zich meerendeels in de noodzakelijkheid gebragt vindt, na het opruimen der oorzaken, de koorts op die wijze en met die middelen te behandelen, welke wij als de meest gefchikte tegen de oorfpronkelijke hectifche

aangeraden hebben, als: *kina*, *digitalis*, *semenphelandrii* etc.

5. *Aanwijzing*. Men zorge, door een' doelmatigen leefregel, de bewerktuiging met toereikend en goed voedsel te voorzien.

Hoe gewigtig ook de leefregel in alle koortsziekten zijn moge, in geene is hij het zeker meer, dan in de uitterende. Weinig moeite zoude het in hebben, door eene reeks van onwederlegbare daadzaken te bewijzen, dat vele lijders hun leven meer daaraan, dan aan de geneeskundige behandeling te danken hebben; ja, dat dezelve in vele gevallen de kunst te bestrijden heeft, en de ziekte het kwaad vergoeden moet, dat beide aan den lijder berokkenen.

De diëet moet voedend en versterkend, maar niet prikkelend zijn; de ligt verteerbare voedsels moeten met smaak genoten en wél verdragen worden. Meelachtige zaden en stoffen, als gepelde gerst, rijst, fago en falep, goed uitgebakken tarwenbrood, wortelgroenten, melk, vleeschnat, vleeschgelei, vleesch van jonge dieren, en eijeren komen voornamelijk en bijna zonder onderscheid te pasfe. Kruiderijen, verhittende prikkelende spijsen en dranken, laxerende groenten en vruchten zijn doorgaans schadelijk.

Als de spijsvertering goed is, late men den lijder des morgens nuchteren gepelde gerst, dik in water gekookt, met een weinig melk en suiker, nuttigen; een uur later met beschuut of goed uitgebakken wittebrood, dat noch versch, noch warm zijn mag, met
een

een glas water en melk ontbijten; des middags geven rijst, scorconeroos, gele wortelen, vleeschnat, en, waar het verdragen wordt, vleesch van jonge dieren; des avonds melkspijzen met sago, haver-gort, eijeren, enz. Tot drank ligt, niet te sterk gehopt, en goed uitgegest bier; een enkel glas wijn kan aan personen, daaraan gewoon, toegestaan worden; aan de meeste lijdens veroorzaakt de wijn hitte, vermeerdert de polsflagen, heeft congestiën naar het hoofd en de borst ten gevolge, en is uit dien hoofde doorgaans schadelijk. Bijzonder nuttig zijn eenige glazen versch gemolkene ezelinnen-, geiten- of koemelk; de eerste worden beter dan de laatste verdragen, en verdienen de voorkeur; zij verschaffen een gezond goed voedsel, dat voor de meeste lijdens aangenaam is. De melk overmatig gebruikt, kan, door de maag te verzwakken en den eetlust te benemen, nadeelig worden.

In plaats van de melk kan men dagelijks eenige kopjes krachtig vleeschnat geven; aan de afkookfels van het vleesch der schildpadden en adders moet, volgens de verzekeringen der beroemdste Geneesheeren, den voorrang boven het vleeschnat van onze gewone huisdieren gegeven worden. De maag zeer zwak zijnde en weinig voedsel verdragende, zijn de geleijen, uit hartshoren en mager vleesch bereid, allerheilzaamst.

Naarmate de koortsachtige bewegingen afnemen en de krachten verbeteren, vergrooten men de hoeveelheid der voedsels, en late allengs meer vaste spijs-

spijzen genieten, mits zij goed verdragen worden en niet verhitten. Laten het de krachten toe, dan is het goed, dat zich de lijders bij helder en droog weder, zeer warm zijnde, in de schaduw, dagelijks matig bewegen, te voet of in eenen wagen; vermoeijende bewegingen zijn als hoogst nadeelig te vermijden, zoo ook de morgen- en avondlucht.

Wanneer de lijders des nachts sterk zweeten, behooren zij op haren matrassen en niet zwaar gedekt te slapen; het beddegoed moet dagelijks gelucht, en des morgens moeten de bezweete kleederen en het linnen met schoon wel gedroogd en gewarmd goed verwisseld worden. In het algemeen moet zich de lijder noch te dik noch te warm, maar vooral ook niet te luchtig kleeden; eene kleeding, die eene gelijkmatige warmte onmiddelijk op de huid onderhoudt, is de doelmatigste: wollen of flanellen hemdrokken, op de bloote huid gedragen, voldoen bijzonder wel aan dit oogmerk.

Warme baden, van tijd tot tijd gebruikt, zijn zeer dienstig, om de huid te reinigen, de hitte en droogte te verminderen en de huiduitwaseming te bevorderen; waar andere ziekten en huiduitslag voorafgegaan zijn, helpen zij mede de genezing der uitterende koorts bespoedigen; bij neiging tot of reeds aanwezig uitpuittend nachtzweet, zijn zij schadelijk.

De verblijfplaats des lijders moet ruim, luchtig, en des winters matig verwarmd zijn; door herhaalde verzekering van eene spoedige en zekere genezing zoeken men hem in eene gunstige gemoedsstem.

stemming te brengen en te houden : wanneer deze ook al de genezing niet bewerkt , dan verligt zij toch zijnen toestand en zijn lijden , en maakt hem het leven dragelijk ; de Geneesheer voldoet dus aan zijnen pligt als mensch , wanneer hij ook het geneeskundige doel mist.

Overigens moet de leefregel naar de bijzondere omstandigheden , waarin de lijder verkeert , naar zijnen smaak , de bijkomende toevallen , de gewoonte enz. geregeld worden.

D.

De Kraamkoorts.

(Febris puerperrarum.)

Eene koorts , die aanhoudt , kort na de verlossing ontwikkeld wordt , met hevige pijnen en opzwellings van de buik gepaard gaat , en waarbij de afscheiding der melk in de borsten geheel achter weeg blijft of plótseling onderdrukt wordt , noemt men : eene kraamkoorts. Bepalingen.

De kraamkoorts is eene zeer gevaarlijke , hevige , aanhoudende ziekte , met onregelmatige somwijlen zeer onduidelijke aflatens (*remissiones*). Zij tast kraamvrouwen aan , zoowel na de geboorte van voldragene als niet voldragene vruchten. Zij begint doorgaans met zware koude rillingen en pijnen in de buik , dikwijls reeds voor de geboorte geheel vol- Karakter.

B b 4 eind,

eind is, of kort na haren afloop, zelden na den 10den dag, het menigvuldigst tusfchen den 3 en 5den. Haar duur is zeer onbepaald; vele lijderefsen fterven voor den 10den dag, doch ook later zijn fterfgevallen niet zeldzaam. De genezing volgt eerst laat, en gaat zeer langzaam voort; weinige worden voor den afloop der vierde week volkomen herfteld, dikwijls verloop en eenige maanden. Zij is zeer genegen in flep en de naziekten te ontaarden, welke, als uitterende en flep en de zenuwkoortsen, doodelijk afloopen. De kraamkoorts komt fporadifch in groote fteden en de hoogere volksftanden meer, dan te platte lande en bij de van natuur fterkere volksklaffe voor.

Epidemifch heerscht zij in de Hospitalen voor kraamvrouwen, waar zij in groote getallen opgehoopt zijn, in volkrijke fteden, en fomtijds ook op het land, en neemt ten laafte eene befmettelijke geaardheid, vooral in de Hospitalen, aan.

Deze koorts doorloopt onderscheiden tijdperken: in het eerfte is zij bijna altijd van eene ontftekingaardige en gaftriefche gefteeldheid; in het tweede zuiver gaftriefch; in het derde, wanneer zij dit tijdperk bereikt, neemt zij een rot- of zenuwachtig karakter aan, waarbij de gaftriefche gefteeldheid voortduurt; in het vierde gaat zij in eene andere meest flep en de ziekte over, en verandert van gedaante.

Zelden neemt men bij de herftellende zuivere kritiefche ontlastingen waar; meerendeels volgt de genezing gedurende vrijwillig ontfane galachtige brakingen en lang aanhoudenden buikloop, langzaam en trapswijze; de krachten herftellen zich allengs.

Kort

Kort voor, met, of onmiddellijk na de verlossing ^{Loop der toevallen.} komen de eerste toevallen te voorschijn, het meeste tusschen het einde van den tweeden en het begin van den vijfden dag, gelijktijdig met de gewone zogkoorts, waarmede zij dan ook in den beginne verwisfeld en voor minder beteekenend gehouden wordt, dan zij inderdaad is, — eene fout, die, waar zij begaan wordt, nimmer zonder de nadeeligste gevolgen blijft. De eerste toevallen zijn zware koude met rillingen, met een gevoel als of koud water langs den rug en de ledematen afgegoten wordt; gelijktijdig of kort daarna, meer of minder heftige pijnen in de buik, die dikwijls van plaats verwisfelen; in den omtrek van den navel blijven zij intusschen het meeste bepaald; somwijlen strekken zij zich over de borst, den rug tot in de schouders uit, of zijn in een dezer deelen het hevigst. Op de koude volgt zware hitte, met drooge huid; de hevige koorts is niet meer te miskennen. De pols is klein, zamengetrokken en snel, gelijk men haar bij ontstekingen der buisingewanden gewoonlijk vindt; de tong droog, meerendeels beslagen; er is onaangename smaak en groote dorst; de *urin* is natuurlijk, de buikontlasting verstopt. Deze toestand duurt gewoonlijk van zes tot acht uren, wanneer de toevallen verminderen, de pols langzamer wordt, en zeer duidelijk afstaat. Gedurende de aflaten (*remissiones*) gevoelen zich de lijderessen zeer kwalijk, zijn afgemat en verdrietig. De borsten worden slap, waar zij reeds opgezeten waren, of zwellen in het geheel niet; de oksel-

klieren worden in het geheel niet aangedaan, en de gewone pijnen, die met de beginnende zogaffcheiding gepaard gaan, houden geheel op. Er komt geen zog in de borsten; de kraamzuivering houdt reeds met het begin der koorts op, of wordt kort daarna onderdrukt. In ligte en van den gewonen regel afwijkende gevallen, heeft men wel eens gezien, dat het zog in de borsten bleef, en deszelfs affcheiding, zoo- wel als de kraamzuivering, onbelemmerd haren gewonen en natuurlijken loop volgde.

Korter of langer na de eerste remisfie, keeren al de toevallen terug; de koorts wordt heviger; de pijnen in de buik nemen toe, breiden zich meer uit; de buik zwelt fterk op, en wordt zeer pijnlijk bij de geringfte aanraking. In de meeste gevallen, die ik van deze ziekte waargenomen heb, klaagden de lijderesfen over ftekende pijnen in de liezen en het dikke van de beenen, die opzwellen en zeer pijnlijk worden; het eene been is dan altijd meer dan het andere aangedaan; de pijnen en zwelling verdwijnen in het eene, en komen in het andere weder te voorschijn. Dit beurtelings toe- en afnemen der toevallen blijft drie of vier dagen aanhouden; de remisfiën zijn korter, de verheffingen zwaarder en de koorts neemt fteeds toe. De pislozing wordt moeilijk; perfingen, buikloop en brakingen, die eene zwarte, groene geelachtige ftof in groote hoeveelheid ontlasten, komen daarbij. In zware gevallen zijn die toevallen, welke ontstekingen der herfenen en borstingewanden aanwijzen, niet zelden,

als

als raaskallende ijlhoofdigheid, doffe drukkende hoofdpijn, vreemde gezigten, flaapzucht, ftuiptrekkingen, koude handen en voeten, hik, opfpringen der pezen, flauwten, koud klam zweet, ondragelijk ftinkende ontlastingen, ingevallen bleek geel aangezicht enz.; onder deze toevallen geven de zieken den geest, dat dikwijls reeds in de eerfte dagen, fomtijds in de eerfte 24 uren, gefchiedt.

Onder minder ongunftige omftandigheden gaat de ziekte in het tweede tijdperk over; de ontstekings-toevallen, de pijnen in de buik nemen af; de pols wordt week, klein, maar zeer fchielijk; de gastrifche toevallen komen nu duidelijk te voorfchijn. Brakingen en buikloop duren voort, of grijpen plaats, waar zij nog niet aanwezig waren; de tong is vochtig, met een dik wit of geelachtig beflag overdekt, de fmaak bitter en onaangenaam, de huid heet en droog; de buik en dijen zwellen nog meer op; de oogen ftaan flauw; het aangezicht valt in en is geelachtig bleek, zelfs de lippen verliezen haar rood. De koorts maakt korte en onduidelijke aflaten; de nachten worden zeer onrustig en flapeloos doorgebracht; de fteeds zwakker wordende lijderesfen geven met die toevallen en verfchijnselen, welke gewoonlijk den dood voorafgaan en hem vergezellen, den geest. Dit tijdperk duurt van vier tot twaalf dagen, zelden langer.

Tegen het einde van dit tijdperk nemen de gastrifche toevallen af; de brakingen en buikloop ontlasten eene witte melkachtige ftof; alles, wat de lijde-

res-

resfen van spijs gebruiken, gaat onverteerd weder af. De plaatselijke aandoeningen in de buik en dijen houden aan, en de koorts neemt nu met de gewone verschijnselen het karakter van eene rot- of zenuwkoorts aan. Als de ziekte deze gedaanteverwisseling ondergaat, dan volgt de rot- of zenuwkoorts haren gewonen loop, is zeer kwaadaardig, en het gevaar wordt door de reeds plaatshebbende verzwaking en de plaatselijke aandoeningen, nog vergroot.

Als de lijderes de ziekte gelukkig doorworstelt, herstelt zij volkomen en de gevolgen der eerste koorts verdwijnen allengs, of de genezing is onvolkomen; de lijderes wordt van de rot- of zenuwkoorts hersteld, maar de desorganifatiën in de buikholte hebben slepende naziekten, verhardingen, aaneengroeijingen, uitstortingen, verzweringen en verstervingen, uitputtend nachtzweet, waterzucht en huidziekten ten gevolge.

In de lijken van de aan deze koorts overledenen vindt men de buikholte en het celswijzeweeffsel der dijen meer of min met een wit melkachtig vocht gevuld; het buikvlies en alle deelen, die er mede omkleed zijn, de baarmoeder, de buizen van FALLOPIUS, de eijernesten, de pisblaas en de endeldarm met eene witte vezellige, kaasachtige stof bedekt.

Indien de lijderesfen in de eerste vier en twintig uren de slagtoffers dezer koorts worden, dan vindt men de genoemde deelen, de maag, de darmbuis, fomwijlen zelfs de ingewanden der borstholte, door ontsteking aangetast. Bij die, welke in de latere
tijd-

tijdperken overlijden, zijn verhardingen, aaneengroeiingen en vernaauwingen in de darmbuis, etterzakken of verzweringsen, die zich reeds eenen weg naar buiten geopend hebben, gewone verschijnselen.

De bijzondere en eigenaardige gesteldheid, waarin Oorzaken. zich zwangere vrouwen bevinden, door de veranderingen, die in hare geheele bewerktuiging plaats hebben, de ophooping van vochten in de buikholte, de ontstekingsaardige of daaraan gelijk zijnde verandering in de bloedmenigte, de geprikkelde toestand van het vaatstelsel, de aandoenlijkheid van het zenuwgestel, brengen reeds vóór de verlosfing eene voorgeschiedenis tot deze koorts te weeg, die door ophooping in de eerste wegen, eenen verhittenden, zeer voedenden leefregel, overmatig spijsgebruik, hartstogten, tot aan het einde der zwangerheid volgehouden en bijslaap, naauwe knellende kleeding, vooral keurslijven, de buitensporige levenswijze van de vrouwen der rijken, zwaren arbeid en kommervolle levenswijze der armen, verstopte buikontlasting, zittende levenswijze, belette uitwaseming, en eene bijzondere luchtgesteldheid, zóódanig kan vergroot worden, dat de verlosfing alleen, met de daarbij plaats hebbende veranderingen, als hare natuurlijke gevolgen, genoegzaam is, om de kraamkoorts voort te brengen.

Gewoonlijk worden buiten de genoemde nog andere schadelijke invloeden gevorderd, die wij hier als hare toevallige oorzaken zullen opgeven, om, waar de aanleg bestaat, de kraamkoorts te ontwikkelen. Alle schadelijkheden, welke eene ontsteking Toevallige oorzaken.
in

in andere deelen doen ontstaan, kunnen ook eene kraamkoorts veroorzaken, daar zij in haar eerste tijdperk steeds met eene ontsteking van het buikvlies en der daarmede omkleede deelen gepaard gaat. Hier komt dan vooral in aanmerking: de behandeling der vrouwen, gedurende de verlosfing, eene ruwe behandeling der geslachtsdeelen, vooral het te dikwijls en aanhoudende onderflaan der barende, — eene fout, die door vroedvrouwen en jonge, min geoefende vroedmeesters veelal begaan wordt; langdurige zware verlosfingen, doordien de vrucht zeer groot, of het bekken te klein is, misbruik van instrumenten en zeer geweldadige verlosfingen, ruwe behandeling bij het losmaken en ontlasten der nageboorte, of haar terug blijven bijeen onvoorzigtig ontblooten der geslachtsdeelen, ontijdig gebruik van zeer koude omslagen, misbruik van adstringerende middelen, vooral bij volbloedige, waar eene matige bloedontlasting na de verlosfing, zeer heilzaam is, om de met bloed opgevulde vaten van de onderbuik en inwendige geslachtsdeelen te ledigen. Ten tweede: onmatig gebruik van spijs en drank na de verlosfing, zware onverteerbare en verhittende spijsen, overmatig warm houden der kraamvrouwen, vroegtijdig gebruik van wijn of wijnkandeel, bier, enz., prikkelende en verhittende geneesmiddelen, het te sterk aanhalen der fluitdoek, waardoor de buksingewanden gekneld worden, sterke en plotselijke gemoedsaandoeningen, toorn, schrik, angst, enz., onderdrukking der kraamverzuivering, en belette afscheiding van het zog in de borsten: deze

schijnt

schijnt intusschen meer tot de gevolgen, dan wel tot de oorzaken dezer ziekte te behooren; echter kan het verzuimde zogen tot zogverplaatsingen aanleiding geven, die de kraamkoorts ten gevolge hebben. Ten derde: eene eigenaardige smetstof, welker ontstaan en voortplanting, vooral daar, waar vele kraamvrouwen bij elkander zijn, in de Hospitalen, en eene vochtige lucht zeer begunstigd wordt. Niemand, wien de Epidemiën, die in onderscheiden Hospitalen voor kraamvrouwen te *Londen*, te *Weenen*, *Kassel* en te *Parys* geheerscht hebben, bekend zijn, zal het *contagium* der kraamkoorts ontkennen; te minder nog, daar het proefondervindelijk bewezen is, dat door een doelmatig gebruik der gewone zuiveringsmiddelen, het afkrabben en op nieuw witten der muren, het leggen van nieuwe vloeren en door de zoutzure berookingen de besmetting kan vernietigd worden.

De onderscheiden tijdperken, welke de kraamkoorts Naaste oorzaak doorloopt, en de meest in het oogloopende veranderingen in de bewerktuiging, welke men standvastig met deze koorts verbonden vindt, hebben tot de meest uiteenloopende gevoelens en de tegenstrijdigste veronderstellingen over het wezenlijk bestaan dezer koorts onder de Geneesheeren aanleiding gegeven, en zijn nog verre af van beslist te zijn.

Mijns bedunkens kan men vaststellen, — waarmede het gevoelen der voortreffelijkste geneesheeren overeenstemt, — dat de kraamkoorts zich door eigenaardige, haar steeds vergezellende toevallen en verschijnselen zoo duidelijk kenfchetst, en van alle andere koortsvormen

on-

onderscheidt, dat men haar als eenen eigene op zich zelven bestaanden ziektevorm in een practisch Handboek mag opnemen.

De geboekte verhalen van Epidemiën en bijzondere gevallen van deze koorts, door de geloofwaardigste Geneesheeren verhaald, zijn overvloedig voldoende te achten, zoo wel om het gevoelen van die Geneesheeren, welke de kraamkoorts als eenen bijzonderen en eigenaardigen ziektevorm betwisten, en haar steeds voor eene der gewoone koortsvormingen willen aangemerkt hebben, als van hen, die haar voor eene gewone ontsteking van het buiksvlies, voor eene zuivere gastrische koorts, of voor eene zogverplaatfing houden, te wederleggen.

Daar het hier de plaats niet zijn kan, ons in eene breedvoerige toetsing en wederlegging der verschillende gevoelens, omtrent het eigenlijke wezen dezer koorts, in te laten, houd ik het aangestipte voor genoeg, om den lezer op de deswege bestaande verschillen oplettend gemaakt te hebben.

Alvorens tot de nadere ontwikkeling der naaste oorzaak over te gaan, kan ik mij nog van eene aanmerking niet onthouden, namelijk: dat de meeste Schrijvers over deze ziekte steeds de laast waarneembare uitwerkselen van haar voor de naaste oorzaak gehouden hebben, en niet genoeg in het oog hielden, dat het de uitwerkselen der naaste oorzaak waren. Het meest in het oog loopende toeval werd dan ook daarvoor gehouden, en vandaar de verschillende gevoelens en oneindige twisten.

Wan-

Wanneer men alles, wat bij deze koorts plaats heeft, met de noodige oplettendheid en onpartijdigheid in overweging neemt, dan blijkt het duidelijk, dat alle kraamvrouwen eene voorgeschiktheid tot deze ziekte bezitten, die in de eigenaardige gesteldheid, door de verlossing voortgebragt, en in bijkomende omstandigheden gegrond is. Hoe zou het zich anders laten verklaren, dat Epidemiën van deze koorts alleen kraamvrouwen aantasten, daar men toch weet, dat kraamvrouwen van andere rot- en zenuwkoortsen minder, althans niet meer, dan andere personen worden aangetast? Tijdens dat er geene andere koortsen heerschten, heb ik de kraamkoorts vrij algemeen gezien; doch nimmer werden andere vrouwen of personen, in welk een gemeenzaam verkeer zij met de zieke vrouwen ook stonden, door eene koorts aangetast, die met de kraamkoorts de uiterste overeenkomst had. Evenmin weet ik mij te herinneren, gelezen te hebben, dat daar, waar zij Epidemisch, in de Hospitalen, heerschte, ook andere personen er door werden aangetast.

De geheele reeks van toevallen, zoo als zij zich ontwikkelen, op elkander volgen, en in hunne geaardheid kennelijk maken, wijst aan, dat de kraamkoorts, gelijk vele andere, met eene ontstekingsaardige gesteldheid gepaarde, ziekten, verschillende tijdperken maakt, waarin hare geaardheid niet altijd dezelfde blijft, maar van karakter verwisfelt. Het eerste tijdperk levert steeds de gewone toevallen van ontstekingen der buiksingewanden op; maar is het te verwon-

deren, dat eene ontsteking van het buikvlies en der daarmede onkleede deelen spoedig haar fthenisch met het typhus-karakter verwisfelt, daar men weet, dat de ontstekingen in vliesachtige deelen en weeffels zelden eene zuivere phlegmone, maar meereendeels rooschtig of Lymphatiek zijn, en zich door uitzweeten der wei beflissen? Bovendien verkeeren de meeste kraamvrouwen, door verlies van bloed en andere betrekkingen, in omstandigheden, die hoogst zeldzaam eene zuivere ontstekingachtige gesteldheid toelaten.

In de valsche borstvlies- en longontsteking en bij de meeste acute huidziekten, heeft hetzelfde plaats: het eerste tijdperk is ontstekingaardig, en de volgende de tegenovergestelde van het eerste.

In het tweede tijdperk der kraamkoorts worden de toevallen der Gastrische gesteldheid het duidelijkste ontwikkeld en treden de ziekelijke afscheidingen te voorschijn; die, blijkens de lijkopening, op de inwendige oppervlakte van het buikvlies plaats hebben, als gevolg der aanwezige ontsteking, die zich in de meeste gevallen niet alleen tot dat gedeelte van hetzelfde bepaalt, dat de inwendige oppervlakte der buikholte omkleedt maar ook over dat gedeelte uitbreidt, hetwelk de ingewanden omgeeft, en van waar zich de ontsteking, door het geheele weeffel der ingewanden, uitstrekt; stoorenissen in de verrigtingen der organen en vooral der afscheidingen, zijn hiervan de nimmer uitblijvende gevolgen. Uit deze veranderde afscheidingen nu
moet

moet de voornaauwste oorzaak der Gastrische ophoopingingen ontleend worden. Zij zijn dus gevolgen, maar niet de oorzaak der ziekte. Hierbij kan nu reeds de koorts het karakter van Typhus, als rot- of zenuwkoorts, aannemen, zoo als wij dit in het tijdperk der verettering bij de kinderziekte, wonden, en ook bij andere ziekten waarnemen.

Meerendeels ontwikkelt zich het bepaalde koortskarakter na afloop van het tweede tijdperk, tusfchen den derden en zevenden dag der ziekte. Wanneer de koorts in de twee eerste tijdperken zeer hevig is, loopen zij in een korter tijdsbestek af, en deze gedaanteverwifeling heeft fpoediger plaats. De ontstekingstoevallen zijn nu geheel geweken, de Gastrische verminderd, maar die der rot- of zenuwkoorts volkomen ontwikkeld. Het tijdsgewricht waarin deze verandering plaats heeft en voortduurt, maakt het derde tijdperk dezer koorts, mits dat zij een onmiddelijk gevolg zijn der veranderingen en aandoeningen, welke de eerste tijdperken in de bewerktuiging voortgebracht hebben. Eene zuivere rot- of zenuwkoorts, die bij kraamvrouwen voorkomt, zonder dat de bovengenoemde eigenaardige toevallen en verfchijnfelen der kraamkoorts daarnevens aanwezig zijn, verdienen nimmer dezen naam. Hadden de Geneesheeren fteeds in het oog gehouden, dat de kraamkoorts het Typhus-karakter kan aannemen, ja, dat kraamvrouwen ook door heerfchende Typhus-foorten, zonder voorafgegane kraamkoorts, kunnen aangetast worden, men zou waarfchijnlijk zulke tegenftrijdige gevoelens,

lens, omtrent het zijn of niet zijn dezer koorts, als eenen afzonderlijken ziektevorm, in de Schriften der Geneesheeren vergeefs zoeken.

De veranderingen, welke gedurende het eerste en tweede tijdperk der kraamkoorts plaats vinden, zijn van dien aard, dat zij alleen toereikende zijn, om eene zenuw- of rotkoorts ten gevolge te hebben. De wijd uitgebreide roosachtige ontsteking in de buikholte kan niet nalaten, eenen zeer gewigtigen invloed op de belangrijke zenuwvlechten, aldaar gelegen, uit te oefenen, en aandoeningen te verwekken, waarin het geheele zenuwstelsel deel neemt. Ook op de chyl bereidende vaten en klieren en het geheele opslurpende vaatstelsel heeft zij invloed; daarbij: de ziekelijke afscheidingen, welke spoedig in de ontstokene deelen plaats vinden; de zoo buitengemeen versnelde beweging van het bloed; de ruime en dikwijls overmatige ontlastingen, die het ligchaam van vele vochten berooven; de in hunne zamenstellende deelen zoo veranderde afgescheiden vochten werken niet alleen als zeer schadelijke prikkels, maar zijn tevens als zeer bedorvene stoffen te beschouwen, waarvan meer of min door de opslurpende vaten opgenomen en met het bloed vermengd wordt; zij worden dit nog meer, wanneer de Gastrische ophooping niet alleen uit de ziekelijk afgescheide vochten, maar te gelijk ook uit overblijffelen van spijsen en andere van buiten in de darmbuis gebragte stoffen, hunnen oorsprong ontleenen. Als de ontsteking in verettering
af

verfterving eindigt, en de etter zich niet behoorlijk, of in het geheel niet, kan ontlasten, dan zal zij door hare prikkeling, zoowel als gedeeltelijke opflurping, en bij verfterving door de plaatfelijke rotting, gelijk in vele andere gevallen, tot het ontftaan eener rot- of zenuwkoorts medewerken. De fleepende naziekten, die dikwijls op de kraamkoorts volgen, maken haar vierde tijdperk. Zij komen te voorschijn; wanneer al de andere toevallen bedaard zijn, en de koorts grootendeels heeft opgehouden. Hare oorzaken zijn almede gelegen in de veranderingen, die de bewerking, door de voorafgegane ontfteking, geleden heeft, als aaneengroeijingen der ontstoken geweest zijnde deelen, door de uitgestorte wei, verhardingen in de ingewanden, verzweringen, verhoogde prikkelbaarheid en gevoeligheid der darmbuis.

De aaneengeschakelde reeks der kenschetsfende verschijnselen en toevallen nader in overweging nemende, om daaruit de naaste oorzaak te verklaren, fchijnt het mij toe, te moeten aannemen, dat al de meest in het ooglopende toevallen, voor zooverre zij geneeskundig opgefpoord en onderzocht zijn, aanwijzen, dat het eene toeval fteeds het uitvloeifel van het andere is. De ontfteking van het buikvlies is het ftandvastige verschijnsel, dat wij bij deze koorts het eerste en meest ontwikkeld waarnemen, en welker aanzijn meerendeels alleen reeds genoeg is, om over het het aanwezig zijn eener kraamkoorts te befliffen; de Gastrifche gefteeldheid is her gewrocht van deze; van fchalm tot fchalm laat zich nu verder ieder toe-

val en verschijnsel, het eene uit het andere, afleiden. Maar nu vragen wij: wat is de oorzaak van de ontstekings van het buikvlies; waarom heeft zij alleen bij kraamvrouwen, en wel dan eens zoo algemeen plaats, dat bijna iedere kraamvrouw er door aangetast wordt, terwijl men ze op eenen anderen tijd in het geheel niet waarneemt? In de beantwoording van deze vragen ligt de ontwikkeling der naaste oorzaak opgesloten. Alvorens verder te gaan, zal het noodig zijn, ons nog bezig te houden met die veranderingen, welke noodwendig in het ligchaam eener kraamvrouw moeten plaats hebben.

De vermeerderde toevloed van vochten naar de baarmoeder en derzelver omarbeiding en verbruik moet onmiddellijk na de verlossing verminderen, en na het ophouden der kraamzuivering, waarvan de natuur zich schijnt te bedienen, om een deel der overvloedige vochten te ontlasten, ten einde eene plotselinge onevenredigheid te verhoeden, geheel op te houden. De hieruit voortvloeiende opvulling der vaten heeft eene ligte koorts, de zoogenoemde zogkoorts, voor of op den derden dag na de verlossing, ten gevolge. De coufensuële betrekkingen tusfchen de baarmoeder en de borften brengen eenen vermeerderden toevloed van vochten naar deze te weeg, en wekken er eene ontstekingsachtige gesteldheid op, waardoor zij, volgens hare bestemming, in zogafcheidende werktuigen veranderen. Naarmate deze nieuwe afscheiding toeneemt, neemt de koorts af, en
het

het evenwigt is hersteld: wordt daarentegen de natuur in deze hare achtervolgende verrigtingen gestoord, ontstaat de zogkoorts vroeger, dan de opgewekte levensprocessen in de baarmoeder, door de zwangerheid, opgehouden hebben, en tot de borsten zijn overgegaan, dan blijft de vermeerderde toevloed van vochten naar de buik en inwendige geslachtsdeelen voortduren; de in omvang zoo aanmerkelijk verminderde baarmoeder hare samengetrokken en vernaauwde vaten bieden aan de aandringende vochten eenen onverwinbaren tegenstand, en noodzaken dezelve, in die vaten te dringen, waarmede zij zich in monden, die reeds verwijd, en in een weeffel gelegen zijn, dat aan hare overmatige opvulling en uitzetting geen tegenstand biedt. In het buikvlies en zijne velengfelen vindt men een zoodanig weeffel, en zijne vaten staan in een onmiddellijk verband mer die der baarmoeder; de overvloed van vochten, de steeds afnemende werkdadigheid der baarmoeder, hare niet opwekking in de borsten heeft eene ontstekingsaardige gesteldheid en vermeerderde wederwerking in het buikvlies ten gevolge, die zich spoedig aan al zijne verlengfelen, uitbreidingen, en zelfs der ingewanden, die het omkleedt, mededeelt. De eenige natuurlijke verrigting van het buikvlies is de afscheiding of uitwaseming van eenen waterachtigen damp, die door ontsteking kan vermeederen en in geaardheid veranderd worden. Hierin moet de oorzaak gezocht worden, waarom dikwijls binnen een zeer kort tijdsverloop eene zoo groote hoeveel-

heid vocht kan afgescheiden worden, dat in menging zóó zeer van zijne gewone samenstelling afwijkt, dat men het voor zog aanzag, en de naaste oorzaak der kraamkoorts in eene zogverplaatsing wilde gelegen hebben.

Dit gevoelen, al verder op alles, wat hier plaats heeft, toepasfende, laat het zich gemakkelijk genoeg verklaren, hoe, gelijktijdig met de aanwezige kraamkoorts, de kraamzuivering eer vermeerderd dan verminderd kan blijven voortvloeijen. De aanhoudende toevloed van vochten naar de buikholte zal steeds eene grootere hoeveelheid bloeds door de baarmoeder doen omloopen, dan daar, waar de vermeerderde werkdadigheid van de baarmoeder tot de borsten is overgegaan. Deze vermeerderde toevloed zal noodwendig eene ruimere affcheiding der kraamzuivering ten gevolge hebben, eerst dan ophoudende, nadat de ziekelijke affcheiding in het buikvlies eenen zeer hoogen trap bereid heeft. In die gevallen, waar de zelfftandigheid der baarmoeder deel neemt in de ontfteking, zal men daarentegen vinden, dat de kraamzuivering, zoolang het ontftekings tijdperk duurt, geheel ophoudt, eerst dan weder te voorfchijn komende, als deze bedaart of geheel geweken is. Als de borsten de vermeerderde werkdadigheid der baarmoeder in haar geheel overnemen, zwellen de okfelklieren, de omtrek der borsten, en zelfs de opperarm mede op, en nemen deel in de ontftekingachtige gefteldheid, in de borsten opgewekt; waar nu deze werkdadigheid, in plaats van tot de borsten, naar

het

het buikvlies is overgegaan, kan het niet vreemd zijn, dat zich de ontsteking aan de liesklieren en het celswijzeweeffel der dijen mededeelt. De tegenwerping, dat niet in alle kraamkoortsen de zogaffcheiding geheel in de borsten onderdrukt is, stem ik volmondig toe, daar ook mijne ervaringen daarmede overeenstemmen; maar geënzins, dat daarmede de gegevene verklaring zoude wederlegd zijn. Nimmer zal in de kraamkoorts de zogaffcheiding naar behooren plaats hebben; men zal haar meer of minder onderdrukt, en de hevigheid der ziekte daaraan gevenredigd vinden; raken de borsten in het geheel niet ontstoken; grijpt geen vermeerderde toevloed van vochten daarin plaats, en scheiden zij volstrekt niets af, dan is de kraamkoorts ook het hevigst en gevaarlijkst; nemen zij voor een gedeelte de opgewekte levensprocessen der baarmoeder over, en heeft eene gedeeltelijke zogaffcheiding plaats, dan is de kraamkoorts ligter en minder gevaarlijk; zelfs ziet men in de meeste gevallen het gevaar en de buikvliesontsteking afnemen, naarmate de zogaffcheiding onbelemmerd wordt. In dit geval is de vermeerderde werkdadigheid slechts gedeeltelijk van de baarmoeder naar de borsten en gedeeltelijk tot het buikvlies overgegaan. Waarom zou in deze koorts niet even zeer een gedeeltelijke overgang der werkdadigheid van het eene werktuig tot twee andere kunnen plaats vinden, daar men iets voortgelijks ziet gebeuren, wanneer gewone affcheidingen onderdrukt worden, andere hare verrigtingen overnemen en vergoeden? B. v. als de

afscheiding der gal in de lever, die der *urin* in de nieren, of de ontlasting door steenen en toebinden der uitvoeringsbuizen belet wordt, nemen bijna alle andere afscheidende werktuigen en het geheele reproductieve stelsel, ieder voor zich, een gedeelte der onderdrukte afscheiding en belette ontlasting over; de gele kleur van de huid, de veranderde menging van alle afgescheidene vochten en de pislucht, die zelfs de onwerkbare huiduitwaseming verspreidt, zijn hier ontegenzeggelijke bewijzen.

Uit alles, wat ons tot hiertoe gezegd is, trekken wij dit besluit: „ De voorbeschikkende oorzaak der „ kraamkoorts is in de natuurlijke gesteldheid der „ kraamvrouwen, door de voorafgegane zwangerheid, „ in de consensuële betrekking tuschen de borsten „ en de baarmoeder, in de noodwendigheid, dat de „ verminderde levensprocessen in de baarmoeder na de „ verlosing, door opwekking in een ander deel, tot „ behoud der gezondheid, moeten vervangen worden, waartoe de natuur de borsten, om een dubbel „ doel te bereiken, bestemd heeft, gelegen.”

„ Toevallige oorzaken zijn al die vreemdaardige „ prikkels en schadelijkheden, welke de opwekking „ van een verhoogd levensproces in de borsten „ *tegen* en *in* de buikholte vermogen op te wekken.”

„ De naaste oorzaak is, het in de borsten niet tot „ stand gekomene verhoogde levensproces, en zijne „ afleiding naar de buikholte.”

Voorzegging. Het gevaar, dat de kraamkoorts insluit, is in al hare tijdperken zeer groot; doch het is het grootste

in het eerste, dat der ontsteking, en in het derde tijdperk, dat der rot- of zennwachtige gesteldheid. In het eerste neemt men de gewone uitgangen der ontsteking, oplossing, verzwering, verettering, versterking en het uitzweeten der wei, waar, het menigvuldigst deze laatste; want de ontsteking is zelden zuiver actief, maar doorgaans van de lymphatische geaardheid. Het gevaar is gëevenredigd aan de grootere of mindere gevaarlijkheid, welke deze onderscheiden uitgangen insluiten. De oplossing mag men hopen, wanneer de koorts niet zeer hevig, de ontstekingstoevollen, de pijn en zwelling van de buik matig zijn, de kraamverzuivering niet gestoord, of waar zij onderdrukt was, weder in gang komt, de borsten opzetten en zog afscheiden; wanneer een verliggende buikloop, een gelijkmatig algemeen zweet, ruime afscheiding van een drabbige *urin* met een wit bezinkfel, terwijl de toevallen nalaten tot stand komen; eene wederkeerende gezondheid is daarvan het gevolg.

De uitgang in verettering is een der zeldzaamste in deze koorts; wat men dikwijls voor etter nam, was niets, dan uitgestorte wei, die de oppervlakte der ontstokene deelen bedekt, en met waren etter veel overeenkomst heeft. Dat zij plaats kan hebben, is door waarnemingen bewezen. De beroemde FRANK verhaalt onder andere twee gevallen, waarin zich de etter eenen weg door den navel naar buiten gebaad had. Als de ontsteking zeer hevig, de koorts het karakter eener zuivere ontstekingskoorts

koorts heeft , de aderlatingen verzuimd en de lijdereſſen met prikkelende geneesmiddelen zijn behandeld geworden , dan heeft men dezen uitgang te vreezen ; gewoonlijk heeft hij ſlepende naziekten ten gevolge , die de zieken , nog na weken en maanden , in het graf ſlepen , of het tijdperk der herſtelling zeer langdurig maken.

De uitgang in verſterving heeft zeer dikwijls plaats ; waarvan de oorzaak in de geaardheid der ontſteking en in de geſteldheid der buikingewanden na de verloſing te zoeken is. De toevallen , welke de verſterving aanwijzen , zijn : ontſteld , ingevallen , geelbleek aangezigt , plotſelijk ophouden der pijnen , een gevoel van koude in de buik , kleine tuſſchenpoozende pols , kleverig- koud zweet , zwarte , zeer ſtinkende , koude onwillekeurige buikſontlaſtingen , ſlaapzucht , ijlhoofdigheid en ſtuiptrekkingen. Deze rampspoedige beſliſſing is te wachten , wanneer de pijn en ontſtekingstoevallen zeer zwaar , in de eerſte uren na de verloſing , vooral als deze zeer moeijelijk en langdurig geweest is , te voorgeſchijn komen , en aderlatingen verzuimd werden. Als de verſterving eene groote uitgebreidheid erlangt , ſterven de lijdereſſen binnen de eerſte 24 uren ; bepaalt zij zich ſlechts tot enkele kleine en oppervlakkige gedeelten van het eene of andere deel , dan geeft zij tot rot- of zenuwkoortſen aanleiding , of gaat in ſlepende naziekten over , welke meerendeels doodelijk afloopen.

Wanneer de zwelliſſing der buik en de ontſtekingstoevallen niet zeer hevig zijn , de pols ſchielik en week blijft ,

blijft, dan grijpen gewoonlijk ziekelijke afscheidingen en het uitzweeten der wei plaats. De toevallen, welke haar aanwijzen, zijn: drooge huid, verminderde pis-affcheing, witte melkachtige *urin* en buikontlastingen, flappe borsten, toenemende zwelling van de buik, met weinig pijn, bleek aangezigt, onleschbare dorst, het zuur in de maag, allengs wederkeerende eetlust: als de uitstorting niet zeer groot is, en de koorts afneemt, worden de zieken gewoonlijk, doch langzaam, hersteld. Groote uitstortingen, met zware aanhoudende koortsen, looplen bijna altijd doodelijk af, doordien de uitgestorte stoffen als een nieuwe prikkel ontstekingen veroorzaken, die in versterkingen, rot- of zenuwkoortsen overgaan, en langdurige naziekten ten gevolge hebben.

In het tweede of Gastrische tijdperk is het gevaar geëvenredig aan de bijzondere gesteldheden, welke daarmede verbonden zijn; hoe zuiverder zij zich ontwikkelt, en onvermengd met ontsteking rot- of zenuw toevallen voorkomt, zooveel te geringer is het gevaar; daarentegen, zooveel te grooter, hoe meer de eene of andere dezer gesteldheden gelijktijdig aanwezig is.

Geheel zonder gevaar echter is het Gastrische tijdperk niet, ook voor zich zelf, zonder andere daarbij komende, verzwarende toevallen kan het door braken en buikloop, die de levenskrachten uitputten, met den dood eindigen; maar in de meeste gevallen kan hier, door eene doeltreffende en beredeneerde geneeswijze, het gevaar afgewend, en het leven gered

red worden. Het is goed, en men kan eenen gunstigen uitflag voorspellen, als het braken en de buikloop met verligting der toevallen, welke het plaatselijke lijden van de buik aanwijzen, gepaard gaan; als de zwelling van de buik afneemt, de tong en huid vochtig en de pols langzamer en voller wordt. Maar het gevaar is zeer groot, wanneer het tegendeel gebeurt; want aanhoudende brakingen, met grooten, dorst, hik, koud zweet, koude handen en voeten, toenemende zwelling van de buik bij talrijke buikontlastingen, die eene zwarte, zeer stinkende stof voortbrengen, brandende hitte, zeer snelle pols en ijelhoofdigheid voorspellen eenen naderenden dood.

Wanneer de koorts het karakter eener rot- of zenuwkoorts heeft aangenomen, regelt zich de voorzegging naar de geaardheid dezer koortsen, en de plaatselijke gesteldheden der buikholte; over het geheel genomen is het gevaar hier zeer groot; het grootste, waar de kraamkoorts door besmetting ontstaan is, de nageboorte terug blijft en tot rotting overgaat, de *uterus* en de scheede bij de verlossing beleedigingen ondergingen, bij vrouwen, die reeds gedurende de zwangerheid ziekelijk gesteld waren, en door onaangename gemoedsaandoeningen voortdurend gekweld werden. Bij de slepende naziekten, die uit de kraamkoorts overig blijven, moet de meerdere of mindere gevaarlijkheid uit den aard dezer ziekten zelve, maar voornamelijk uit den aard der veranderingen, die in de bewerktuiging aanwezig zijn, als hare oorzaken beoordeeld worden.

In

In navolging van den beroemden FRANK en RICHTER Geneeswijze. verdeelen wij de behandeling der kraamkoorts in de voorbehoedende (*cura prophylactica*) en de geneeskundige (*cura therapeutica*). De eerste betreft de behandeling der zwangere voor, en die der kraamvrouwen na de verlossing, alvorens de kraamkoorts ontwikkeld is. Haar doel is, den invloed der voorbeschikkende oorzaken onschadelijk te maken, en de voorgeschiedtheid toe te nemen. In het algemeen komt zij te pas bij zwangeren, die eene zittende levenswijze houden, eenen zeer voedenden, zwaren en verhittenden leefregel volgen, bij zeer volbloedige, die met congestiën naar de buikholte bezet zijn; bij kraamvrouwen, tijdens dat de kraamkoortsen Epidemisch heerschen, en in de Hospitalen voor kraamvrouwen; in het bijzonder bij vrouwen, die reeds gedurende de zwangerheid ziekelijk waren, bij zeer aandoenlijke hartstogtelijke gestellen, na moeilijke verlossingen, beleedigingen der geslachtsdeelen, en terugblijvende nageboorten. Algemeene regelen, die men deswege te volgen heeft, zijn: men trachte de ontstekingsachtige gesteldheid en congestiën naar de buikholte te verhoeden, men kome Gastrische ophoopingingen voor, of ruime dezelve op, waar zij reeds aanwezig zijn, vermijde alles, waardoor de borsten voor hare natuurlijke verrigtingen ongeschikt, en daarin belemmerd worden, en ten laatste, men verhoede alles, dat de smetstof niet verbreid worde.

Aan gezonde, volbloedige, robuste zwangere vrouwen,

wen, opene men eenen ader van 8 tot 12 oncen, en late haar eenen antiphlostischen leefregel in acht nemen; de keuze der spijsen bepale zich tot het plantenrijk, met weinig of geen vleesch, die der dranken tot waterachtige, die niet te warm mogen zijn; wijn, bier en andere verhittende en prikkelende dranken zijn schadelijk; eene matige beweging in de vrije lucht is voor de meeste dienstig; eene stilzittende levenswijze, in naauw beslotene, zeer warme vertrekken, waarin men de lucht niet behoorlijk kan ververschen, is zeer nadeelig.

Gastrische ophoopingten komt men voor door matige beweging, ligt verteerbare, voedende spijsen, waterachtige, matig prikkelende dranken, vooral Seltzer- en Fachingerwater, met een weinig goeden wijn, door eene behoorlijke buikontlasting te onderhouden, met lavementen en zacht laxerende geneesmiddelen, uit rabarber met magnesia, wijnsteen, Engelsch zout, of andere middenzouten. Zijn er teekenen van Gastrische ophoopingten aanwezig, dan geve men de genoemde laxeermiddelen in ruimere giften, en onderhoude daarmede eenige ontlastingen dagelijks. Men verbiede het dragen van naauwe, de borsten sterk drukkende kleederen, vooral de tegenwoordig in de mode zijnde korsetten, die de borsten in de hoogte persen, om eenen volleren boezem ten toon te stellen, eene zeer dunne kleeding, het bloot dragen der borsten, het opleggen van brandewijn en loodbereidingen, om der borsten vastheid te geven, en een maagdelijk voorkomen

te bewaren, die de geschiktheid der borsten voor hare natuurlijke bestemming vernietigen, en aan zwangeren en kraamvrouwen veel kwaads berokkenen. Eene niet knellende, de borsten wel bedekkende kleeding, matige wrijvingen, met vermindering vooral van de genoemde schadelijkheden, zullen veel bijdragen, om de zogaffcheiding na de verlossing gemakkelijk te maken en te bevorderen.

Om de besmetting in tijden van Epidemiën voor te komen, rade men der zwangeren, onder geschikte voorwendselen, het bezoeken van zieke kraamvrouwen af, houde haar in eene gunstige en opgeruimde gemoedsgesteldheid, vermijde alles, wat angst en vrees voor de verlossing kan aanjagen, en verzwijs vooral het gevaar, dat de kraamkoorts insluit, dat zij heerscht, en zich door besmetting voortplant. De leefregel zij daarbij in diervoegte ingerigt, dat van die zijde alle schadelijkheden vermeden worden; hiertoe behooren ligt verteerbare spijsen, waterachtige dranken, matige beweging, ruime, luchtige woning, goede ligging, drooge, niet te warme, maar ook niet te koude lucht in de woon- en slaapvertrekken.

Wonen zwangere in huizen, te zamen met kraamvrouwen, door de kraamkoorts aangetast, dan moeten hare vertrekken zooverre mogelijk, van de zieke kamers verwijderd zijn; men make berookingen, met de zeezoutzure dampen, en verversche dikwijls de lucht. Bij Epidemiën verzuime men nimmer deze berookingen, vooral niet in naauwe straten en in Hospitalen, waarin zich kraamvrouwen bevinden.

Vertrekken, waarin kraamkoorts lijdereſen kortelijks of eenigen tijd geleden verpleegd zijn, moeten niet eerder door zwangere en kraamvrouwen betrokken worden, dan nadat zij behoorlijk gezuiverd zijn. Eenmaal befmette gebouwen konde men naauwelijks door het afkrabben en op nieuw witten der muren, het leggen van nieuwe zolders, berookingen en alle andere zuiveringsmiddelen van de daarin aanwezige ſmetſtof bevrijden, en ze tot geſchikte verpleging plaatſen voor kraamvrouwen weder bruikbaar maken.

Bij kraamvrouwen zijn dezelfde regelen als bij zwangere in acht te nemen, en men drage zorg, alle toevallige ſchadelijkheden te vermijden. Aan volbloedige, die gedurende de verlosſing weinig bloed verloren hebben, eene harde en volle pols hebben, en over vliegende pijnen in den buik klagen, is eene tamelijke aderlating zeer nuttig. Men houde de kraamvrouw matig warm; ſterk broeijen is zeer ſchadelijk; verbiede alle bemoeijingen met huisfelijke en andere bezigheden, onderhoude eene opgeruimde gemoedsgeſteldheid, en zorge door lavementen met *arcanum duplicatum*, of de *ricinus*-olie die vooral bij de Engelfchen veel in gebruik is, voor dagelijkse buikontlaſting, bevordere zooveel mogelijk, den toevloed van vochten naar de borſten en de zogafſcheiding door opleggen van drooge warme doeken, zachte wrijvingen met de handen, het zogen der borſten, waarmede reeds eenige uren na de verlosſing door het aanleggen van het kind, of een zuigſter,

ster, moet begonnen, en dagelijks drie of vier malen moet volgehouden worden. Aan allen, wier pligt het medebrengt, kraamvrouwen met geneeskundige hulp bij te staan, kan ik niet genoeg het vroege zogen der borsten aanraden; de uitkomst zal hun genoeg van de groote nuttigheid overtuigen; wijders moet men voor behoorlijke rust, reinheid en goed voedsel de noodige zorg dragen.

Zonder te treden in de menigvuldige geschillen Geneeskundige behandelingen over de Geneeskundige behandeling der kraamkoorts, die met drift en partijdigheid betwist, verworpen en weder aangenomen zijn, naarmaten het eene of andere stelsel in de Geneeskunst tot het heerschende verheven werd, of beroemde mannen de eene of andere behandeling voor de eenige ware erkenden en verdedigden; wii ik alleen aanmerken, dat de onderscheidene tijdperken, die de kraamkoorts doorloopt, eene zeer verschillend gewijzigde behandeling vorderen, en dat daarin wel de voornaamste oorzaak is te zoeken, waarom de eene Geneesheer deze ziekte als eene ontsteking, de andere als eene Gastrische en de derde als eene zenuw- of rotkoorts wilde behandeld hebben, doch waarnevens alle de eene meer dan de andere, de plaatselijke gesteldheid der buikholte in het oog gehouden en bijzonder wilde behandeld hebben. Ook kan men aannemen, dat die Geneesheereu, welke zich meermalen in de gelegenheid bevonden hebben, de kraamkoorts waar te nemen en te behandelen, op verre na zoo zeer niet verschillen als dit het geval is met diegene, welke daartoe slechts

zaam gelegenheid gehad hebben: deze laten zich veelal door de vreemdheid en tegenstrijdigheid der toevallen, den loop der ziekte, of gedreven door de zucht, om alles in hun stelsel in te dwingen, en iets nieuws te zeggen, tot tegenstrijdige behandelingen verleiden. Nimmer heeft de geneeskunst daarvan eenig voordeel gehad, maar doorgaans groot nadeel geleden, doordien zich vele door de nieuwigheid der begrippen en stellingen lieten mede slepen, en van dwaling tot dwaling vervielen.

De aanwijzingen, welke in de behandeling der kraamkoorts te volgen zijn, laten zich uit de eigenaardige gesteldheid der toevallen en de tijdperken, die zij doorloopt, afleiden. Zij zijn:

1. De aanwijzing voor de antiphlogistische behandeling, in het eerste tijdperk;
2. Voor de antigastrische in het tweede;
3. Voor de behandeling van het rot- of zenuwachtige koortskarakter, in het derde;
4. De behandeling der bijzondere naziekten;
5. Voor de plaatselijke behandeling der meestlijdende deelen, en wat daartoe betrekkelijk is;
6. Behandeling der herstellende.

1^o. *Aanwijzing.* De antiphlogistische behandeling is in het eerste tijdperk der kraamkoorts, wegens de ontsteking in den onderbuik en den daardoor plaats hebbenden, vermeerderden aandrang van vochten altijd aangewezen, mits dat zich de koorts ook wezenlijk nog in het eerste tijdperk bevindt. Als zij zeer hevig is, duurt dit tijdperk naauwelijks 24 uren, waar-

waarin de ontstekingswerende geneeswijze op 'het krachtigste en onbeschrroomdst moet gebezigd worden. In de volgende 24 uren heeft alles reeds zoodanig eenen keer genomen, dat men zelden meer noodig heeft, tot de aderlatingen zijne toevlugt te nemen, of dat eene andere behandeling aangewezen is. Dikwijls is reeds van den eerste beginne af de ontstekings-aardige met de gastrische gesteldheid gepaard, en men voldoet door antiphlogistische, purgeermiddelen, met plaatselijke bloedontlastingen, op de zekerste en meest voldoende wijze aan beide die aanwijzigen.

Bij jonge, volbloedige, sterke kraamvrouwen, als men in den eersten aanval reeds bij de lijderessen geroepen wordt, de pols hard en de pijn in den buik zeer hevig is, moet de aderlating nimmer verzuimd worden. Volgens de getuigenis van velen, vooral van de meeste Engelsche Geneesheeren, is eene tijdig gedane, ruime aderlating het eenigste middel, waardoor de koorts in hare voortgaande ontwikkeling kan tegengewerkt, en het leven der zieken gered worden. De aderlating moet ruim en aan de hevigheid der toevallen en bijzondere gesteldheden der lijderessen geevenredigd zijn. Gewoonlijk brengt de aderlating eene aanmerkelijke en oogenblikkelijke vermindering in de toevallen te weeg, en de zieke wordt door de daarbij inwendig gebezigde antiphlogistische behandeling hersteld. Waar de ziekte dezen gunstigen keer niet neemt, en de toevallen zich na de eerste aderlating wederom verheffen, kan zij acht of tien uren na de eerste herhaald worden; doch nim-

mer zonder dat er duidelijke en dringende aanwijzingen voor aanwezig zijn. Het nadeel, dat eene niet aangewezen aderlating in deze koorts berokkent, is niet minder groot, dan het voordeel, dat eene wel ter pasfe gedane aanbrengt. Noodelooze bloedontlastingen vermeerderen de uitstorting der wei in de buikholte en bevorderen den overgang in rot- en zenuwkoortsen.

In plaats van eene tweede lating, bedient men zich met veel nut, van bloedzuigers, vooral als de pijnen stekend en meer tot eene plaats bepaald, dan over de geheele buikholte uitgebreid zijn; van 6 tot 12, zelfs tot 20 van deze infekten, kunnen in de nabijheid der meest pijnlijke plaatsen aangelegd worden; de bloedontlasting, die er mede bewerkt wordt, is voor de krachten minder nadeelig, dan de aderlating; zij kunnen derhalve ook bij herhaling en later dan de eerste aangewend worden.

Gelijktijdig geve men de ontstekingswerende geneesmiddelen, amandelmelk met salpeter, manna, tamarinde en middenzouten, de laatste vooral, wanneer de buiksonstlasting traag, verstopt is, en er geene braken aanwezig zijn; vindt dit toeval plaats, zonder dat het een gevolg is van vreemde aardige stoffen of onverteerbare spijsen in de maag, en blijft de buik verstopt, dan zijn lavementen, witte olie en middenzouten heilzaam; om het braken te stillen, geeft men het drankje van RIVERIUS, laat weinig op eens, maar dikwijls, drinken, de dranken moeten verdunnend, en niet prikkelend zijn; eene flappe li-
mo-

monade, gerstenwater met oxymel, of foortgelijke zijn de meestgeschikte.

2^e. *Aanwijzing*. De Gastrische gesteldheid kan in deze koorts zuiver ontwikkeld zijn, en op zichzelf bestaan; of zij is gelijktijdig met de ontstekingsaardige rot- of zenuwachtige gesteldheid aanwezig.

In het eerste geval zijn braak- en laxeermiddelen aangewezen, waarvan de groote nuttigheid, vooral van de eerste, door de ervaringen der Fransche Geneesheeren, bijzonder van DULET en DOUBLET, bewezen is. Als er aanwijzingen voor een braakmiddel aanwezig zijn, moet het onbescroomd gegeven en zóó dikwijls het de omstandigheden vorderen, herhaald worden. De Franschen bedienen zich bij voorkeur van de braakwortel, van 15 tot 20 greinen, op eens of in twee giften toegediend. In het eerste begin der koorts zijn de braakmiddelen, nadat de noodige bloedsontlastingen voorafgegaan zijn, zeer nuttig; bij aanhoudende, vrijwillige braken, walging, hik, sterke zwelling van de buik en zenuwtoevallen, zijn zij nadeeling. Bij trage en verstopte buiksonstlasting, vooral in den beginne der koorts, zijn laxeermiddelen met manna, tamarinde, middenzouten, fenelbladen, ricinus- en amandel-olie aangewezen; de neiging tot smeltenden buikloop in de meer gevorderde tijdperken dezer ziekte, maakt een met voorzichtigheid bepaald gebruik dezer middelen noodig; de giften moeten niet al te groot zijn, doch zoo, dat zij dagelijks drie of vier ontlastingen bewerken; zelden zal men daardoor schaden, maar aan de zieke eenen

wezenlijken dienst bewijzen, met ze tot dat getal, gedurende den geheele loop der ziekte, te onderhouden. De drastische laxermiddelen federt eenige jaren door Engelsche Geneesheeren, na het bloed ruim ontlast te hebben, zoo aanbevolen, verdienen eerst nader beproefd, hunne nuttigheid stilliger bewezen te worden, alvorens zij in deze ziekte vele aanbeveling verdienen.

De Gastrische met de ontstekingswaardige gesteldheid verbonden zijnde, behooren de bloedontlastingen aan de braak- en laxermiddelen vooraf te gaan, mits dat zij dan ook terstond daarna gebezigd worden. Wanneer zij met de ontwikkelde zenuw en rotachtige gesteldheid gepaard gaan, verbindt men de prikkelende, versterkende, rottingswerende, met laxeerende middelen, of onderhoude een genoegzame buikontlasting door lavementen. Zij zijn te vermijden, wanneer braken of buikloop aanwezig zijn, die eene zwartachtige zeer stinkenden stof ontlasten. Alsdan komt het voornamelijk dáárop aan, dat men door geen onvoorzigtig gebruik van stoppende geneesmiddelen deze ontlastingen onderdrukke, waar zij niet overmatige zijn; men houde ze des noodts met slijmachtige en aromatische middelen, in bedwang, als zij overvloedig zijn en de krachten sterk aantasten.

3^e *Aanwijzing.* Heeft de kraamkoorts hare eerste tijdperken afgeloopen, en het zenuwachtige karakter aangenomen, dan moet zij als eene zenuwkoorts behandeld worden. De prikkelbaarheid is in de

de meeste gevallen zeer verhoogd, de pols buitengewoon ras, en de hette zeer groot; de verrigtingen van het zenuwgestel der hersenen en uitwendige zinnen is in geene behoorlijke evenredigheid tot elkander, en aan veelvuldige afwijkingen onderhevig; raaskallende ijlhoofdigheid wordt een zeer gewoon toeval. De verhoogde prikkelbaarheid en gevoeligheid maakt hare behandeling nog moeilijker, als zij het bovendien reeds in de gewoone zenuwkoortsen is; de aangewezen geneesmiddelen worden slecht of in het geheel niet verdragen, dewijl de toevallen op het dringendste hulp vorderen. Een zwak aftreksel der valerianawortel en arnicabloem, zeer kleine giften kamfer, muskus en castoreum, van tijd tot tijd eenen enkelen lepel goeden wijn, is gewoonlijk alles, wat, zonder den toestand der zieke te verslimmeren, verdragen wordt. De Narcotische middelen, vooral het opium en de hyosciamus, vorderen groote omzichtigheid, en zijn gewoonlijk nadeelig. In eenige gevallen, waarin de uitkomst allezins gewenscht was, beperkte ik de geneeskundige behandeling binnen zeer naauwe grenzen; dagelijks drie tot viermalen een half of heele grein *digitalis purpurea*, om de snelheid der pols te matigen, eenige lepels wijn, broodwater tot drank, mosterdpappen of spaanse vliegenpleisters aan de voeten, waren alles, wat, gedurende verscheidene dagen, gebruikt werd; waar het noodig was, liet ik de buikontlasting door klijstern onderhouden. De huid zeer droog en heet zijnde, of waar een smeltend zweet plaats greep, gaf ik de *tinctua*

digitalis purpureae, met het zuur van HALLER, in gelijke hoeveelheden van 5 tot 15 droppels, drie of viermaal daags, met koud water of wijn, de prikkelende oplegfels en vliegenpleisters blijven alsdan achterwege. De spoedig volgende verligting der toevallen en trapswijs voortgaande beterschap, bij deze eenvoudige, weinig doende geneeswijze, doet mij dezelve steeds met eene zekere vooringenomenheid beschouwen; de goede gevolgen die ik er van gezien heb, nopen mij, dezelve ruimschoots aan te bevelen. De uitkomsten zullen ten minste gelukkiger zijn dan die der meer werkdadige behandelingen voor als nog geweest zijn. De natuur zelve schijnt ons dezen weg aan te wijzen; vele lijderesfen hebben in het zenuwachtige tijdperk eenen onverwinbaren tegenzin in alle geneesmiddelen, blijven dagen zonder iets anders dan waterachtige dranken te gebruiken, en herstellen de hulpmiddelen, zonder welke, volgens het gevoelen dier Geneesheeren, te zeer aan het stelselmatige verknocht, geene zieke van eene zenuwkootts kan genezen worden.

Overmatige brakingen, die in dit tijdperk den toestand der zieken verslimmeren, zijn dikwijls een gevolg van den voorbarig gestopten buikloop, welke bedaren, zoo ras, door klijfteren, de ontlastingen hersteld zijn. Zijn zij het gevolg eener verhoogde prikkelbaarheid en gevoeligheid van de maag, dan kan men de *potio Riverii*, of het *oxydum Bismuthi* in kleine giften toedienen, aan dit laatste geve ik den

voor-

voorrang boven de eerste, vooral, wanneer de buikontlastingen overvloedig zijn. Zeer hevige smeltende buikloop trachte men te temperen, maar nimmer geheel te onderdrukken: slijmachtige dranken met kaneel, zijn alsdan nuttig aangewezen; zijn zij niet toereikende, en komt het leven in gevaar, dan mogen kleine giften opium van een zesde tot één vierde grein beproeft worden. Zamentrekken de geneesmiddelen en de narcotische in groote giften zijn, bijna zonder uitzondering, nadeelig, ja doodelijk.

Het rotachtige karakter is in de kraamkoortsen doorgaans met het zenuwachtige gepaard; en het gevolg der teruggeblevene, tot rotting overgegane nageboorté: plaatselijke verftervingen in de lijdende deelen van den onderbuik, Gastrische stoffen, die verzuimd zijn te ontlasten, en eene bijzondere Epidemische gesteldheid; de behandeling is in het algemeen die der rotkoortsen; maar ook hier worden de geneesmiddelen tegen deze koorts aangewezen, even als in de zenuwachtige gesteldheid, of in het geheel niet, of slechts in zeer kleine giften verdragen; vooral op de kina is dit toepasselijk, die bijna nimmer verdragen wordt.

Van de minerale zuren, vooral van het zuur van HALLER, en kleine giften van eenen edelen wijn, kan men nog het meeste verwachten; waar nog stoffelijk oorzaken, die de rotkoorts hebben helpen ontwikkelen, aanwezig zijn, moeten zij op de spoedigste en gemakkelijkste wijze verwijderd worden. Voor het overige vindt het gezegde bij de zenuwachtige gesteldheid ook hier zijne toepassing.

5^e. Aan.

4e. *Aanwijzing.* De naziekten, welke zich uit de kraamkoorts ontwikkelen, zijn even menigvuldig, als zij verschillend van aard zijn. Alleen de meest gewone zullen wij hier kortelijks aanhalen, daar hare geneeskundige behandeling, volgens hare bijzondere eigenaardigheden, moet ingerigt zijn, en zij, (als bepaalde ziektevormen, op eene andere plaats moeten beschreven worden.

Deze naziekten zijn *of* algemeen *of* plaatselijk. In het eerste geval blijft uit de kraamkoorts eene verhoogde prikkelbaarheid en gevoeligheid terug, die ten laatste in eene volkomene uitteerende koorts ontaardt. Een voedende leefregel, versterkende en zoodanige geneesmiddelen, welke de verhoogde prikkelbaarheid en gevoeligheid, zonder te prikkelen, verminderen, en reeds breeder bij de behandeling der hectische koortsen opgegeven zijn, komen alsdan te pas.

Smeltende ontlastingen, een zeer gewoon toeval na deze koortsen, moeten door versterkende, zaaiwentrekkende geneesmiddelen tegen gegaan en in bedwang gehouden worden.

Plaatselijke gebreken in de bewerktuiging, door de koorts voorgebragt, als oorzaken van slepende naziekten, bepalen zich meest tot de buikholte. Heeft zich in het eerste tijdperk der ziekte de ontsteking, of later het uitzweeten der wei over de ingewanden der borstholte en ontkleedselen uitgebreid, dan deelen zij ook in deze plaatselijke aandoeningen. Somwijlen kunnen zij ook haren grond in het lijden van andere nabijgelegene deelen hebben, vooral in gevallen, die met

met zogverplaatfingen gepaard gingen. De hiertoe behorende ziekteverschijnselen zijn: neiging tot buikloop en braken, slechte spijsvertering, kolijkpijnen opzwellling van de buik en onderste ledematen; aamborstigheid vochttophoopingen in de borstholte; moeilijke ligging op den rug, of op de eene of andere zijde, pijnen bij het verleggen of bij zekere bewegingen, verminderde pisaffcheiding en onderdrukte maandstonden, of ook wel overmatige bloedontlastingen uit de baarmoeder en schede, die van tijd tot tijd regelmatig of onregelmatig weder keeren; de kleur van zoodanige lijders is zeer bleek, geelachtig de pols blijft snel, de krachten komen weinig en zeer langzaam aan.

De geneeskundige behandeling regelt zich volgens de aanwezige ziekelijke gesteldheden in de holligheden en ingewanden, waarvan deze naziekten het gevolg zijn. Door versterkende geneesmiddelen en een voedende diëet worden de krachten ondersteund, de onderdrukte ontlastingen, vooral de pisaffcheiding, door *digitalis* en zeeajuin hersteld en bevorderd, de overvloedige ontlastingen in bedwang gehouden, de te groote aandoenlijkheid, zoowel van den prikkelbaren als gevoeligen vezel, door narcotische bedarende geneesmiddelen en de minerale zuren verminderd; ophoopingen van vochten in de holligheden en het celwijze weeffel, door de opslurping te bevorderen, opgeruimd; de pisdrijvende en kwikmiddelen zijn tot dat oogmerk de meest doelmatige; inwendig geeft men de zoete kwik van twee tot drie greinen, dagelijks een-

eenige malen; inwrijvingen met *ung. Neapol.* zijn insgelijks zeer nuttig. Bij verzwerigen of andere opgehoopte vochten, die eenen weg naar buiten zoeken, moet men, op alle mogelijke wijze en door insnijdingen, deze ontlastingen zoeken te bevorderen.

5^e. *Aanwijzing*. De plaatselijke behandeling der oorspronkelijk en bijzonder lijdende, of van de daarmede in consensuële betrekking staande deelen, maakt in de kraamkoorts een zeer belangrijk deel der geheele behandeling, in al de onderscheidene tijdperken, die zij doorloopt.

Algemeene regelen, die zich voor de plaatselijke behandeling laten vaststellen, zijn uit de eigenaardige gesteldheden en veranderingen der lijdende deelen uit het tijdperk, waarin zij voorkomen, en uit het karakter der koorts, af te leiden.

- 1^o. Men verminderde de vermeerderde wederwerking en ophooping van vochten in de buikholte, gedurende het tijdperk der ontsteking;
- 2^o. Men zoekte de ziekelijk gewijzigde wederwerking, die meest in de tijdperken, welke op de ontsteking volgen, plaats heeft, en zich door ziekelijke afscheidingen openbaart; tot haren gezonden toestand terug te brengen;
- 3^o. Men wekke de wederwerking in andere deelen op, vooral in die, waarin zij onderdrukt en verminderd is; in de baarmoeder, door de kraamzuivering weder in gang te brengen; in de borsten door zuigen en in die deelen, waar de natuur hare pogingen henen wendt, wanneer

neer zulks zonder nadeel geschieden kan; in de darmbuis door de ontlastingen aan te zetten, in het celledweeffel, als naar de onderste ledematen reeds eene vermeerderde toevloed van van vochten plaats heeft, door wrijvingen;

4°. Men houde het karakter der koorts in het oog, en regele daarnaar de keus der geneesmiddelen.

a. Ten einde de vermeerderde wederwerking en ophooping van vochten in de buikholte te verminderen, komen vooral de plaatselijke bloedontlastingen, door bloedzuigers te pas. Zelfs daar, waar de ontsteking meer het roosachtig, lymphatik karakter heeft, moet men, tijdig tot de lijderesfe geroepen zijnde, deze plaatselijke bloedontlastingen nimmer verzuimen; zoolang er nog gene toevallen aanwezig zijn, die de plaatshebbende uitstorting der wei, of den overgang in koud vuur aanwijzen, zijn zij vlijtig en zóó dikwerf te herhalen, als zich de toevallen verheffen. Gelijktijdig onderhouden men de buikontlasting, door laxeerende klisteren, vooral als zij traag en verstopt is, schoon ook geene der algemeene aanwijzingen dezelve vorderen mogten. Uitwendig bedekke men den geheele buik met warme, verzachtende pappen en stovingen, uit havergort en verzachtende kruiden bereidt; de afkookfelen van de laatste dienen ook tot verzachtende lavementen die vooral dan nuttig zijn, wanneer de buik krampachtig is en de ontlasting met pijnlijke perfsingen gepaard gaat.

Hee-

Heele en halve warme baden, om de huiduitwaseming te bevorderen, door de wederwerking in de huid op te wekken, zijn, ter pas en met oordeel aangewend, veel vermogende hulpmiddelen in deze koorts.

b. Heeft niettegenstaande de aangewende poging, om de oplossing der ontsteking te bewerken, zich deze door het uitzweeten der wei beslist, dat is: heeft eene nieuwe ziekelijk gewijzigd afscheiding plaats gegrepen, dan moet men trachten dezelve te doen ophouden, en het reeds afgescheidene, door de opslurping, te verwijderen. Aan deze aanwijzing voldoen voornamelijk de kwikbereidingen, waarschijnlijk doordien zij, in genoegzame hoeveelheid toegediend, de afscheidingen in de darmbuis en tot de spijsvertering behorende ingewanden vermeederen, en daardoor de afscheidingen door de ontstokene vaten verminderen en de opslurping bevorderen; de zoete kwik van twee tot vier greinen dagelijks twee tot driemaal, en inwrijvingen van de buik met kwikzalf, zijn tot dat einde dienstig. Als de ontlastingen overmatig zijn, of eene duidelijk gekenschetse krampachtige gesteldheid aanwezig is, kunnen kleine giften opium en Hyosciamusextrakt met de kwik verbonden worden. Maar ook alleen tot deze enkele gevallen zou ik het gebruik der Narcotische geneesmiddelen beperken; hoezeer dezelve door eenige andere Geneesheeren zeer ruim aangeprezen worden.

Uitwendig zijn verzachtende pappen, uit vlier en kamilbloemen, met scheerling en Hyosciamus kruid, op de buik gelegd, aangewezen. Spaansche vliegenpleis-

pleisters, die de geheele onderbuik bedekken, zijn meerendeels van eene zeer goede uitwerking zoo ook roodmakende en blaartrekkende middelen, vooral wanneer de laatste, gedurende eenige dagen, in ettering gehouden worden. Wanneer men redenen heeft, de werking van den vliegenpleister te vreezen, en er omstandigheden bestaan, die haar gebruik verbieden, dan late men prikkelende zalven en sineersels, uit geest van amoniak zout, spaansche vliegen-tinctuur, vloeibare heulfap met olijven of amandel olien, inwrijven. Bij sterke zwelling van de buik zijn groote, drooge koppen, op den buik gezet, dikwijls zeer nuttig.

c. De tegenwerken of de antagonistische geneeswijze die de wederwerking van de lijdende deelen af- en naar andere deelen heen leidt en opwekt, is in deze koorts, waar alles, op eene veranderde werkdadigheid berust, van veel belang. Gedeeltelijk wordt door de voldoening aan de reeds behandelde aanwijzingen het noodige in het werk gesteld. Als de kraamzuivering onderdrukt is, zijn inspuitingen in de schede en baarmoeder, uit aftrekselen van weekmakende, zacht prikkelende middelen dienstig; aan het aftreksel van het scheerling-kruid wordt door de Duitse Geneesheeren den voorrang gegeven. Aan de uitwendige geslachtsdeelen zette men twee tot vier bloedzuigers, en make daarna verzachtende omslagen en stovingen.

In de borsten beproeve men, door drooge koppen, zachte wrijvingen, herhaald zuigen en matig prikkel.

I. DEEL. E e len-

lende pappen en omslagen den toevloed van vochten te vermeerderen, en de zogaffcheiding te bevorderen.

Als de onderste ledematen opzwellen of reeds vroeger gezwollen zijn, met verligting der toevallen van de buikholte, onthoude men zich van alle zalven, smeersels, pappen en natte omslagen, en bepale zich alleen tot drooge wrijvingen, zacht borstelen, en het inwikkelen in warme wollen doeken, ten einde, de vermeerderde toevloed van vochten en affcheiding in het celwischweeffel onderhouden en ondersteund worde. Het plotseling flinken der gezwollen onderste ledematen wordt steeds door verslimming van alle aanwezige toevallen, en niet zelden door eenen spoedigen dood gevolgd; terwijl de toenemende zwelling de toevallen verligt. Dikwijls gebeurt het ook, dat eerst de eene dij en het been zwellen, naderhand weder dun worden, en de zwelling tot de andere dij en het been overgaat; meermalen kan een zoodanig afwisselend zwellen en flinken in een tijdverloop van weinige uren en dagen plaats hebben. Meerendeels gaan zware pijnen door het geheele been, gedurende zes tot vier en twintig uren, de zwelling vooraf; waar dit plaats heeft zijn de zacht prikkelende wrijvingen en drooge warme omslagen met voordeel te bezigen. De zieke herstellende, verdwijnt deze zwelling doorgaands van zelf; doet zij dit niet, dan zijn berooken met wierook, en het uitdrijvend verband, met zwachtels van Engelsche flanel nuttig en voldoende.¹

Dat bij de plaatselijke behandeling, even zeer als
bij

bij de algemeene, de keuze der toe te dienen geneesmiddelen; volgens het bijzondere koorts-karakter, moet geregeld worden, behoeft naauwelijks meer erinnering: ik wijs terug tot datgene, wat deswege bij de algemeene behandeling, gezegd is-

d. De behandeling der herstellenden is gelijk aan die, in andere, vooral der zenuwkoortsen, voorgeschreven. Rust naar ziel en ligchaam, matige beweging, bij goed weder in de vrije lucht, warme kleding, voedende diët, dagelijks eenige glazen wijn, en het gebruik van bittere en staalmiddelen, gedurende eenigen tijd volgehouden, want de krachten herstellen zich langzaam.

II.

Tusfchenpoozende koorts.

(Febris intermittens.

Tusfchenpoozende of koude koortsen noemt men *Bepaling*, die, welke, niet gelijk de aanhoudende en aflatende, van het begin tot het einde, in gezondheid of dood onafgebroken voortduren; maar die uit afwisselende koortsaanvallen (*paroxysmi*), met koortsvrije tusfchen-tijden (*intermissio*, *apyrexia*), zamengesteld zijn.

Eene tusfchenpoozende koorts kan dierhalve ook als eene, uit vele op zich zelf staande, telkens af-

loopende, na verloop van eenen bepaalden tijd terug keerende, zamengestelde koortfen beschouwd worden.

Geschiedenis
der tusfchen-
poozende koort-
fen.

De tusfchenpoozende koortfen heerschen in lage, vochtige, moerasfige landen, gewoonlijk Endemisch, Epidemifch en zelfs Contagieus, onder al die uitwendige oorzaken en gesteldheden, die het ontstaan van andere koortfen bevorderen. In hooggelegene drooge landen heerschen zij nimmer Epidemisch; Sporadisch komen zij in alle land- en luchtstreken, maar in velen hoogst zeldzaam voor.

De landeigene (Endemifche) tusfchenpoozende koorts vindt men aan eene en dezelfde plaats, in alle jaargetijden. De Epidemifche heerscht meest in het voor- en najaar, zelden in den winter en zomer, meest aan die oorden, waar zij in alle jaargetijden landeigen en sporadisch voorkomt. Meeren-deels is de Sporadifche tusfchenpoozende koorts in landen, waarin zij zelden voorkomt, van een toevallig bestaan, en gaat met plaatselijke aandoeningen der bewerktuiging gepaard.

In laag gelegene, vochtige en moerasfige landen, aan de zeekusten, waar uitgestrekte gronden bij de Eb boven komen en droogloopen, langs de oevers van meeren en stroomen, die dikwijls buiten hare oevers treden, en overstromingen veroorzaken. In veenlanden, pas drooggemaakte en nieuw ontgonnene droogmakerijen, in den omtrek van nieuw gegraven kanalen, in landen, waar de lucht zelden helder, meerendeels betrokken is, de regendagen talrijker zijn, dan de drooge, de nachten, in vergelijking met

met de dagen, oneevenredig koel en koud, de faizoenen en weêrgefteldheden zeer veranderlijk zijn, heerfchen de tufchenpoozende koortfen bijna altijd, het zij Endemifch of Epidemifch.

Zeldzaam komen zij, daarentegen, voor in bergachtige, hoogliggende, drooge landen, waar de lucht helder en de weêrsveranderingen noch menigvuldig, noch plotfeling zijn.

De Endemifche koorts tast bij voorkeur vreemdelingen, zwakke, ziekelijke perfonen, vrouwen en kinderen, en de zoodanige, welke ten opzigte van woning kleeding en voedsel in ongunstige omftandigheden leven, meer armen dan rijken aan; de Epidemifche zonder onderscheid van jaren, geflacht en ligchaamsfterkte; de laaften ftaan dikwijls het eerfte en meeste aan hare woede bloot. Gewoonlijk hebben de Endemifche en Sporadifche tufchenpoozende koortfen hare voorboden, die een of meer dagen voorafgaan, en door hare meerdere of mindere duideljkheid, op bepaalde uren en tijden van den dag, laten zij de koortsvorm, die volgen zal, met groote waarfchijnlijkheid vooruit bepalen. De Epidemifche begint doorgaans zonder deze voorboden, en tast plotfeling aan; In de voorjaarskoortfen, waar zij van eene ontftekingaardige gefteldheid, en wanneer zij zeer kwaadaardig zijn, vindt men de voorboden hoogst zeldzaam; in de najaarskoortfen, en vooral in die, welke met Gastrifche gefteldheden gepaard zijn, bijna altijd.

De koorts-aanvallen (*paroxysmi*) zijn regelmatig

of onregelmatig; in het eerste geval begint de koorts met koude; op de koude volgt hitte, en de aanval eindigt met zweet. De aanvallen houden eenen regelmatigen loop, en komen bepaald op denzelfden tijd terug. Zij zijn onregelmatig, wanneer de koude hitte of zweet tegen elkander onevenredig zijn, of een dezer tijdperken geheel ontbreekt, en door andere toevallen vervangen wordt, en wanneer de aanval geenen streek houdt, niet op bepaalde en vaste uren, maar regelloos terugkomt.

De Endemische en Sporadische tusschenpoozende koortsen zijn meerendeels zeer langdurig, gaan ligt in slepende naziekten over, en hebben gebreken in de bewerktuiging en ingewanden ten gevolge; waardoor het gevaar, dat zij insluiten, aanmerkelijk vergroot wordt. Ook zijn zij boven andere zeer tot instortingen genegen.

De Epidemische zijn dikwijls goedaardig, somwijlen in den hoogsten graad kwaadaardig; zij beslissen zich schielijker, dan de landeigene, en hebben zeldzamer slepende naziekten ten gevolge.

Over het algemeen genomen, sluiten de tusschenpoozende koortsen, doelmatig behandeld, weinig gevaar in: zij beslissen zich door kritische ontlastingen in gezondheid; ondoelmatig behandeld, worden zij langdurig, gevaarlijk, maken dikwijls instortingen, en gaan ten laatste in andere ziekten over. In weinige ziekten vermag de Geneesheer zóóveel, als in deze, door eene wel gekozene behandeling, die hem
in

in staat stelt, op eene stellige wijze, den [tijd der genezing te voorzeggen.

Ieder der koortsaanvallen (*paroxysmi*), waaruit eene tusfchenpozende koorts is zamengesteld, doorloopt verschillende tijdperken (*stadia*), die ieder voor zich, door bijzondere en in het ooglopende toevallen, van elkander onderscheiden zijn; die in een zeker noodzakelijk verband tot elkander staan, en het eene steeds een gevolg is van het andere.

Loop en toevallen.

Deze tijdperken (*stadia*) zijn vier:

- 1°. Het tijdperk der voorloopers, (*stadium prodromorum*);
- 2°. Het tijdperk der koude (*stadium frigoris*);
- 3°. Het tijdperk der hette (*stadium caloris*);
- 4°. Het tijdperk van het zweet (*stadium sudoris, vel criticum*).

1°. Het tijdperk der voorloopers (*stadium prodromorum*). Het tijdperk der voorloopers is tweeledig: men bedoelt daarmede het kwalijke bevinden, dat aan den eersten koortsaanval en het begin der ziekte vooraf gaat (*prodromi febris*), of die ziekelijke verschijnselen, welke in iederen koortsaanval aan de koude, langer of korter voorafgaan, en deze aankondigen (*prodromi paroxysmi*.)

Prodromi febris. De gewoonlijkste zijn: traagheid en vermoeidheid, lusteloosheid, verdrietige gemoedsgesteldheid of groote opgewektheid en vlugheid van geest; tegenzin in alle bezigheden, groote afgemathheid, bij matige

E c 4

kracht-

krachtoefeningen, sterk zweet na iedere beweging; zware hoofdpijn boven de oogen, pijn in de ledematen, het meeste in de lendenen en deijen; drooge mond, onaangename smaak, misfelijkheid, walging, beflagene tong, stinkende reuk uit den mond, weinig eetlust, dorst; spanning en zwelling van den maagstrekk, met een pijnlijk gevoel en benaauwdheid, oprispingen, opspanning van winden, trage buikontlasting; ruime ontlasting van eene dunne waterachtige *urin*; sterk ruikend zweet; verminderde zog-affcheiding bij zogende vrouwen, het ophouden en achterweegblijven der maandstonden; koude rillingen, die met vliegende hitte afwisselen, groote gevoeligheid tegen koude; onrustige door dromen, afgebrokene slaap, bij kwaadaardige koortsen, aan slaapzucht grenzende slaperigheid, slaauwten en brakingen; dikwijls blijft de pols, tot dat de koortsaanval daar is, natuurlijk, somwijlen klein, schielijk, krampachtig en onregelmatig. De kleur van het aangezicht is gewoonlijk bleek, geelachtig, bij zekere Epidemien, en bijna altijd zodanig in gastrische en najaarskoortsen.

Personen met lidteekens van bekomene wonden, die beenbreuken, of andere gewigtige beledigingen ondergaan hebben, lijden gewoonlijk hevige pijnen in deze deelen; niet tegenstaande deze beledigingen reeds jaren oud zijn. Zij, die meermalen koude koortsen doorge-
staan

staan hebben, en opzwellingen in de buik-
ingewanden, de zoogenaamde koorts koeken,
er uit overig hielden, ontwaren pijn in deze
zwellingen, die tevens grooter worden.

Gewoonlijk zijn slechts eenige van de ge-
noemde toevallen als voorlopers aanwezig;
nimmer zal men alle te gelijk vinden. De
tijd, dien zij aan de koorts voorafgaan, is dan
eens langer, dan korter; van eenige dagen tot
weinige uren. In het eerste geval zijn zij
niet aanhoudende, maar tot eenige uren of
gedeelte van een etmaal bepaald; zij nemen
dan eene zekere regelmatigheid in acht, en
komen dagelijks, om den anderen of derden
dag, op bepaalde uren, te voorschijn. Dit
doende, voorspellen zij den typhus, die de
ontwikkelde koorts houden zal,

Evenmin als de tijd bepaald is, wanneer de
voorlopers verschijnen, en hoelang zij duren,
evenmin is het zeker, dat zij alle koortsen vooraf-
gaan. De bijzondere gesteldheid der lijders, de ge-
aardheid der Epidemie, het karakter der koorts,
de oorzaken, die haar voortbrengen, de jaar-
getijden, het klimaat en de weêrsgesteldheid
hebben daarop eenen gewigtigen invloed,
waarin de oorzaken van hen al of niet aanwe-
zig zijn, gelegen zijn. De gevallen, waarin
men ze gewoonlijk waarneemt, zijn reeds bo-
ven, pag. 437 en 438, genoemd.

Prodromi paroxysmi. Afwisselend gevoel

De 5

van

van hette en koude rillingen, trekken door den rug, pijn in de lenden, drooge mond, misfelijkheid, braken, geeuwen, koude neus, vingeren en toonen, de lippen, de toppen der vingeren en tonen vooral onder de nagels blaauw; het gevoel van koude neemt toe, de lijder begint te beven de tanden klapperen; de voorloperseindigen, en het tweede tijdperk begint.

2°. *Het tijdperk der koude, (stadium frigoris.)*

De koude is, zoowel in haren duur als hare hefigheid, in onderscheidene koortsen, in de achtereenvolgende aanvallen en op onderscheiden tijden in eene en dezelfde koorts, zeer verschillende. Dit tijdperk duurt van weinige minuten tot 3 en 12 uren; in ligte koortsen korter, in kwaadaardige langer en heviger. In regelmatig afloopende koortsen duurt de geheele aanval meerendeels zes uren, en deze zes uren deelen zich in drie gelijke deelen, zoodat de koude, de hette en het zweet ieder twee uren duren. Wanneer de koude langer dan twee uren duurt, wijst zulks reeds onregelmatigheid aan, en geeft bijna altijd iets kwaadaardigs te kennen. De koude gaat dan ligtelijk in eenen toestand van verstijving (*tetanus*) over; het ligchaam wordt onbeweegbaar, de tanden klapperen zoo geweldig, dat zij los raken, of geheel uitgebroken worden, er komen stuiptrekkingen bij, en vele lijders, vooral hoog bejaarde, geven in dezen toestand den geest.

Ook

Ook gebeurt het fomwijlen, dat de koude onregelmatig het eene deel zwaarder, dan het andere aantast, of dat alleen een enkel deel ijskoud en ftijf is, terwijl de andere deelen natuurlijk warm en zelfs heet zijn. Bij vermomde koortfen en in zekere Epidemie ontbreekt ook wel eens de koude geheel.

Met de beginnende koude wordt het aangezicht bleeker; de lijdens geeuwen en rekken zich aanhoudend uit; de huid krimpt in; eene eigenaardige krampachtige gefteeldheid der huidpoven geeft zich door het zoogenoemde boutjesvel (*cutis anferina*,) te kennen; de omvang van het ligchaam vermindert, wel fluitende ringen en armbanden worden los, de ledematen worden koud; nu begint de eigenlijke koude (*algus*,) die in de tufchenpoozende koortfen fteeds fterker dan in de aflatende is. De ledematen beven, en het geheele ligchaam wordt fterk gefchud; de lijdens kunnen zich niet meer ftijl houden, noch verwarmen; de gevoeligheid der huid neemt af, en grenst dikwijls aan gevoelloosheid, zoodat zij, zonder dat de lijder er iets van gevoelt, op alle wijze, kan geprikkeld, geftoken, en gebrand worden; de nitwendige en inwendige zinsverrigtingen zijn veranderd, vermeerderd of verminderd; de lijdens zijn onaandoenlijk voor alle zinnelijke indrukfels en ftomp, of zeer aandoenlijk en opgewekt; zij fpreken haastig, zijn fchranderder,

der, dan in hunne gezonde dagen, zeer driftig en tot toorn genegen.

De pols is klein, zeer fchielijk, onregelmatig bij zeer zware koude koortfen; de ademhaling is koud, moeilijk en benaauwd, door eene drooge kuch afgebroken; de tong is droog, de fmaak onaangenaam, metaalachtig, de dorst groot. Vele lijdens zijn misfelijk, braken met ontlasting van eene geele, flijmachtige ftof. De maagfreek is gespannen, opgezet en pijnlijk bij het aanraken; de pis is helder waterachtig, zonder wolkje of zetfel, hare ontlasting meer of min belemmerd, en fomtijds pijnlijk.

3°. *Het tijdperk der hette (stadium caloris).* De koude neemt langzamerhand af, wifelt eerst met eene vliegende hitte, houdt eindelijk geheel op, en de koortshette neemt haren aanvang: eene algemeene hitte verbreidt zich over het geheele ligchaam, even zoo als te voren met de koude plaats had, fomwijlen gelijkmatig over alle ligchaamsdeelen, fomwijlen onregelmatig, zoodat het eene deel heter en brandender is dan het andere; de huid en het aangezicht worden rood; de omvang van het ligchaam neemt toe, en wordt zelfs eenigermate vermeerderd; de pols wordt vol, hard, regelmatig en iets langzamer, dan in de koude; de huid en mondholte blijven droog; de dorst neemt toe, de ademhaling wordt langzamer en vrijer,

vrijer, doch is altijd nog iets belemmerd; de uitgeademde lucht is zeer heet; de hoest houdt op; de *urin* wordt donker rood, maar blijft zonder wolk of bezinkfel. De meeste lijdens klagen over zware kloppende hoofdpijn, pijn in den rug en ledematen, raken verward in hunne denkbeelden, en ijlen; sommige volbloedige personen worden slaapzuchtig; de gevoeligheid en aandoenlijkheid der zinnwerktuigen vermeerderen; de minste ontblooting verwekt koude rillingen; het oog is zeer gevoelig voor het licht, het oor voor het minste geruis; de inwendige zin deelt met den uitwendigen in dezelfde opgewekte gesteldheid; de denkbeelden volgen zeer schielijk op elkander, wisselen elken oogenblik af, en staan in geen behoorlijk verband onder elkander. Ook de maag neemt deel in de opgewekte gevoeligheid en prikkelbaarheid; misfelijkheid, walging, braken met benaauwdheid en pijn in de maagstreek wijzen dit aan; als zij in de koude reeds aanwezig waren, nemen zij in de hitte toe. Gewoonlijk is de hitte aan de koude geëvenredigd, en duurt van twee tot twaalf uren, zelden korter, dan de koude, dikwijls veel langer, of er volgt op eene matige koude eene zeer groote en brandende hitte; de hitte neemt aauhoudend toe, tot dat zij haren hoogsten trap bereikt heeft, neemt dan weder langzaam af, en gaat in het vierde en laatste tijdperk over.

40. *Het tijdperk van het zweet (stadium sudoris, criticum).* De pols wordt allengs langzamer, voller, week en golvend (*pulsus undosus*). De huid wordt vochtig; een algemeen zweet breekt over de geheele oppervlakte des lichaams uit; de dorst neemt af, de tong wordt vochtig. De ademhaling is natuurlijk, de hoofd- en andere pijnen verdwijnen; de uit- en inwendige zinsverrigtingen keeren tot hare natuurlijke gesteldheid terug; de misfelijkheid, walging, braking en pijnelijke spanning der maagstreek houden op; de lijders vallen in eenen natuurlijken, gerusten slaap, en gevoelen zich, bij het ontwaken, zeer verkwikt; het zweet neemt nu langzaam af, en heeft, bij het ontwaken, geheel opgehouden; de lijder klaagt alleen nog over een gevoel van vermoeidheid en zwakte; de pols blijft gewoonlijk nog eenigen tijd vol en eenigzins schielijk.

Het zweeten duurt van twee tot zes uren, somwijlen, vooral als de lijders reeds lang aan de koorts gegaan, of meermalen instortingen geleden hebben, tot aan het tijdperk der koude van den volgende aanval. Het zweet zelf is kleverig, geelachtig, aan het linnen deze kleur mededeelende, en verspreidt eene eigenaardige zure reuk, waardoor het zich kenmerkend onderscheidt. De *urin*, die onder het zweeten ontlast wordt, schuimt sterk; het schuim blijft eenigen tijd staan: somwijlen heeft zij een met
kleu-

kleuren spelend vlieschje; hare kleur is hoogrood, koud geworden zijnde is zij troebel, krijgt een wolkje, en laateen digt tigchelsteen kleurig beïnkfelvallen. Het zweet, en deze eigenaardige gesteldheid der *urin*, is als hete ware de kritische ontlasting, waardoor zich ieder aanval beslist; echter kunnen ook nog andere kritische ontlastingen gelijktijdig plaats hebben. In de tijdperken der koude en hette is de buikontlasting traag en verstopt; in dat van het zweet vinden eenige ontlastingen plaats. Met het afbrekende zweet komt, niet zelden, een gierst-uitslag over het geheele lighaam te voorschijn, die verdwijnt, zoo ras de aanval geheel is afgelopen, en met iederen nieuwen aanval te voorschijn komt. Na het zweet komen er etterende puistjes aan den neus, op de lippen, in de mondholte, in de pisbuis, of zweren aan de ledematen, vooral aan de beenen, te voorschijn, die zich met roven bedekken. Zelden ziet men deze uitbottingen na den eersten koortsaanval, meerendeels eerst na den afloop van den derden en nog later te voorschijn komen. Men houdt dezelve voor kritisch; en hoezeer men juist niet stellig daaruit het uitblijven der eerstvolgende aanvallen kan voorspellen, zijn zij toch meerendeels voor zeer gunstig te beschouwen, die de ervaring als gewone voorboden van eene spoedige genezing heeft leeren kennen.

Op iederen koortsaanval volgt eene korte
vrije

vrije tusschen tijd van 6 tot 27 uren (*apyrexia, intervallum, intermissio*). Bij eenige is zij zóó volkomen, dat hoegenaamd geene ziekte verschijnselen overig blijven, en de lijders, even als in gezonde dagen, hunne bezigheden waarnemen, doch meerendeels genieten zij slechts eene zeer betrekkelijke gezondheid, en er zijn onderscheiden ziekte verschijnselen aanwezig; zij zijn zeer aandoenlijk, zwak en vermoeid, en voor bezigheden onbekwaam, komen ligt in zweet, slapen onrustig, en zijn zeer gevoelig tegen koude bij veranderingen van temperatuur in het weder. De kleur is bleek, het wit van de oogen geel, de tong beflagen, de mond droog, de smaak onaangenaam, bitter en metaalachtig; de eetlust ontbreekt; de adem heeft eene onaangename reuk, de maagstreek is opgezet pijnlijk, met een gevoel van volheid; de zieke klaagt over licht- hoofdigheid, duizelingen en hoofdpijn; de pols is meer dan gewoon schielijk, klein en zwak, de *urin* blijft troebel en met een tigchelfsteen kleurig bezinkfel; kort na den aanval ontbreken, deze toevallen zelden geheel; in lange koorts vrije tusschen tijden, gebeurt niet dikwijls, en de lijders gevoelen zich, tot kort voor den nieuwen aanval, volkomen gezond.

Hoe duidelijker de genoemde toevallen ontwikkeld zijn en aanhouden, zooveel te zekerder

der laat zich de terugkeer van den aanval voorzeggen; waar dezelve na iederen koorts-aanval minder en onduidelijker worden, en ten laatste geheel verdwijnen, kan men het uitblijven van den volgenden aanval verwachten. Intusfchen moet men in het oog houden, dat de derdendaagsche koortfen gewoonlijk de hardnekkigste en langdurigste zijn, als haar vrije tusfchentijd het meeste aan gezondheid grenst.

Verdeeling der tusfchenpoozende koortfen. Men verdeelt de tusfchenpoozende koortfen volgens zeer verschillende beginfelen:

- 1°. Volgens de wijze, hoe zij heerschen in
 - a. Epidemifche (algemeen heerschende).
 - b. Endemifche (landeigene, inheemsche).
 - c. Sporadifche (enkel voorkomende).
- 2°. Volgens de jaargetijden, waarin zij heerschen:
 - a. Voorjaars koortfen.
 - b. Najaars koortfen.
- 3°. Volgens het gevaar, dat zij influiten:
 - a. In kwaadaardige.
 - b. In goedaardige.
- 3°. Volgens de regelmatigheid, waarmede de aanvallen volgen:
 - a. In regelmatige.
 - b. In onregelmatige.
- 5°. Volgens den tijd van den aanval, en de duur van den koortsvrijen tusfchentijd:
 - a. In daagsche koortfen.

- b.* In anderendaagfche.
 - c.* In derderdaagfche.
 - d.* In vierdendaagfche.
 - e.* In dubbelde daagfche.
 - f.* In dubbelde anderendaagfche.
 - g.* In dubbelde derdendaagfche.
- 6°. Volgens de geaardheid van den aanval:
- a.* In gewone.
 - b.* In halfaanhoudende.
 - c.* In vergezellende.
 - d.* In vermomde.
- 7°. Volgens haar bijzonder karakter:
- a.* In ontstekingaardige.
 - b.* In zenuwachtige.
 - c.* In rotachtige.
 - d.* In gastrifche.

Van de hier opgetelde verdeelingen zijn eenige van weinig, andere van het grootste belang, voor den practifchen Geneesheer. Van de minst belangrijke zullen wij flechts kort het noodige aanftippen, en bij de andere meer breedvoerig zijn.

10. De wijze, hoe de tufchenpoozende koortfen heerfchen, is voor de kunstbehandeling dan alleen belangrijk, als zij met een algemeen karakter gepaard gaat, en men zoowel voor de kennis van het koorts-karakter, hare bijzondere geaardheden, de kunst-behandeling, als den waarfchijnlijken uitgang, uit het reeds waargenomene, op het volgende eenig befluit kan trekken. Overigens kunnen alle tufchenpoo-
- zen-

zende koortfen aan eene landftreek eigen zijn en heerfchen; zij kunnen in een of ander jaargetijde algemeen heerfchen; zij kunnen in iedere landftreek en in alle jaargetijden, enkel voorkomen.

- 2°. De verdeeling in voorjaars koortfen, (*febres vernales*) en in najaars-koortfen (*febres autumnales*) verdient alleen in zoo verre de oplettendheid des Geneesheers, dat de eerfte doorgaans zeer goedaardig zijn, meer tot het ontftekingachtige, dan tot een ander karakter overhellen. Zij blijven na drie, vijf of zeven aanvallen, dikwijls zonder het gebruik van eenig geneesmiddel, achter wegen, en laten zich door midden zouten en bittere geneesmiddelen genezen. Zelden behoeft men ze door kina te onderdrukken, meerendeels doet deze meer kwaad als goed.

De najaars-koortfen, heerfchen van Augustus tot Februarij, het meeste van het begin van Augustus, tot het einde van November - zij zijn doorgaans moeilijker te genezen als voorjaars-koortfen, hardnekkig en menigwerf kwaadaardig. Zelden neemt men bij haar het ontftekingachtige, bijna altijd het gaftriefche-galachtige, fomwijlen het rot- en zenuwachtige karakter waar, zij zijn zeer tot inftortingen genegen, en gaan meer, als alle andere, in langdurige en gevaarlijke naziekten over.

- 3°. Het gevaar dat de tufchenpoozende koortfen

influiten, is bij eenige zeer gering, de aanval begint, doorloopt zijne tijdperken, en eindigt, zoo als wij hem beschreven hebben; in den koortsvrije tusschentijd bevindt zich de lijder wel, en noch in den aanval, noch in den tusschen tijd neemt men gevaardreigende toevallen waar. Na een zeker getal aanvallen blijft de koorts van zelve weg, of laat zich bij eene doelmatige behandeling, spoedig en gemakkelijk genezen. De voorjaarskoortsen behoorren bijna altijd tot deze soort, men noemt ze goedaardige (*febres benignae*). Bij andere is het gevaar zeer groot, zij dooden reeds met den tweeden, derden, en vijfden aanval doorberoerten, slaapzucht en stuipen, of gaan in andere kwaadaardige aanhoudende koortsen over, zijn zeer hardnekkig, weerstaan aan de gewone koorts-middelen af gaan in ongeneesbare naziekten over, deze noemt men kwaadaardige (*febres perniciosae malignae*).

- 4°. De orde en regelmatigheid waarin de koortsaanvallen volgen, is dikwijls zeer bepaald, zoo dat zij op de koortsdagen, op een en hetzelfde uur, of regelmatig eenige uren vroeger of later terugkomen. Of de koortsaanvallen nemen in het geheel geene regelmatige volgreeds in acht, zij komen op onbepaalde dagen en uren, met langere en kortere tusschen tijden, dan met, dan zonder voorloopers, met duidelijke, of onduidelijke ont-
- wik-

wikkelde tijdperken terug. De eerste noemt men regelmatig koortsen (*febres typicae, regulares*) de laatste onregelmatige (*febres intermittentes atypicae, vagae, erraticae, irregulares*).

Wanneer in de regelmatig, de koorts-aanval telkens op hetzelfde uur van den dag komt, noemt men ze eene staande koorts, (*febris intermittens typica fixa*). Komt de aanval steeds op den koortsdag terug, doch zoo, dat hij telkens een of meer uren vroeger komt, dan is zij eene vooruitspringende koorts (*febris intermittens typica antevergens, anteponeus*). Komt de aanval op den koortsdag telkens een of meer uren later als de vorige, dan is zij eene achttuitspringende koorts, (*febris intermittens typica, retardens, postponens*).

50. De verdeeling volgens den tijd, of de lagere of kortere duur des koortsvrijen tusschentijd is eene der belangrijkste, van alle de voorgestelde verdeelingen.

a. De daagsche koorts (*febris quotidiana*) is die welke in de 24 uren eenen aanval en eene koortsvrije tusschentijd heeft. Gewoonlijk maakt zij haare aanvallen des voormiddags, zij komt niet zeer dikwijls voor, en diegene, welke nog voor haar gehouden worden, zijn veelmalen dubbelde anderendaagsche koortsen. Dat zij nimmer zouden voorkomen, ge-

lijk eenige Schrijvers gewild hebben, strijdt met de ervaring der meeste geneesheeren, die in de gelegenheid waren, koude koortsen in landen waar zij Endemisch en Epidemisch heerschen, waar te nemen. Zij heerschen gewoonlijk bij koud en vochtig weder, in het voor- en najaar, en in winters zonder vorst. Kinderen, zwakke en slijmachtige gestellen tast zij bij voorkeur aan. De koude in den aanval is matig maar duurt lang, de pols is minder schiekelijk en vol, de pis niet zoo rood als in de anderendaagsche. Waar niet reeds vooraf eene slijmachtige gesteldheid aanwezig was, ontwikkelt zij zich in de loop der koorts en gaat met slijmachtige ontlastingen gepaard. Zij is veelal langdurig en hardnekkig, en eindigt zelden vroeger dan met den veertienden aanval.

b. De anderendaagsche koorts (Febris tertiana). Heeft om den anderen dag eenen koortsaanval op een en denzelfden tijd, en een eene koortsvrije tusschentijd van 42 uren, den aanval tot 6 uren gerekend. Zij komen gewoonlijk in het middagsuur en des namiddags; zij heerschen meer in het voor- als in het najaar; zijn doorgaans goedaardig, genezen spoedig en gemakkelijk, met den 5, 7, en 9 aanval. Epidemisch heerschende nemen zij somwijlen een kwaadaardig karakter aan. Ook zijn zij meer als andere tot instortingen

genegen. De aanvallen zijn doorgaans hevig maar duren korter als bij andere; de koude is zwaar, de hette brandend, de dorst en hoofdpijn zeer groot. Haar karakter is gemeenlijk zuiver gastrisch, of gaat met dezen toestand gepaard, misfelijkheid, walging, bittere smaak en galachtige brakingen zijn derhalve ook zeer gewone verschijnselen en toevallen.

c. *De derdendaagsche koorts, (Febris quarana).* Na de koortsdag volgen twee vrije tusschendagen, zoodat tusschen de twee aanvallen 60 tot 68 vrije uren zijn. De aanvallen zijn doorgaans zeer standvastig bepaald, zoodat zij dikwijls weken en maanden, geen minuut vroeger of later komen, als de voorgaande; zij komen des avonds en des nachts en duren tot den volgenden morgen, en zijn meer langdurig als hevig, de koude duurt kort, de hette langer, het zweet het langste. In moerasfige landstrecken, bij vochtige lucht, in het najaar en op het einde van voorafgegane tusschenpoozende koorts-Epidemien die eenen anderen *typus* hielden, zijn zij het gewoonlijkst. Menigvuldig ontwikkelen zij zich uit daagsche en anderendaagsche koortsen, als deze te meermale instortingen gemaakt hebben, of ondoelmatig behandeld zijn. Zelden heerscht zij als volkomene Epidemie, ziekelijke personen, kwaadsappige gestellen, en zoodanigen die met gebreken in de ingewanden en verslop-

pingen in de lever behebt zijn, tast zij het meeste aan. Zij doet de bewerktuiging sterker aan, en is haar vijandiger als andere tusschenpoozende koortsen. De lijdens worden spoedig zwak, krijgen een ziekelijk, kwijnend en ontgaan voorkomen, als zij lang duurt, kan zij in langdurige en ongeneesbare naziekten overgaan. Zij beslist zich zelden voor den 14den aanval; in landen, waar de tusschenpoozende koortsen landeigen zijn, vindt men personen die er sedert jaren mede behebt zijn, andere blijven het gedurende hun geheel leven. Zoodanige personen bevinden zich in de koortsvrije tusschentijd volkomen gezond, hebben goede eetlust en spijsverteering, en nemen hunne gewone bezigheden zonder eenig ongemak waar.

Dat eene derdendaagse koorts-gezondheid en een lang leven voorspellen zoude, aan hun, die er in hunne jeugd mede aangetast waren, behoort tot die geneeskundige vooroordeelen, die naauwelijks eene wederlegging verdienen.

De vierdendaagse koorts, (*Febris Quintana*). Van de vier-, vijf- en meerdaagse koortsen, de maandelijksche en jaarlijksche, komen somwijlen, echter hoogst zeldzaam de vierdendaagse voor, de overige behooren meer onder de hersenschimmen als in de geneeskunst te huis.

In alles is de vierden daagsche koorts gelijk aan de derdendaagsche, en onderscheidt zich van deze alleen, dat drie koortsvrije dagen tuschen twee aanvallen in zijn.

Dubbeld noemt men die tuschenpoozenden koortsen, welke in de bepaalde koorts tijden van de daagsche, anderen daagsche en derden daagsche in plaats van eenen twee aanvallen hebben, (*febris duplex*). en de aanvallen, in die regel volgen, dat op iederen dag maar eenen aanval plaats heeft, in dier voege dat altijd de eerste, derde, vijfde, zevende &c. de tweede, vierde, zesde en achtste aan elkanderen gelijk zijn. Verdubbelde, (*duplicata*); als op eenen dag twee aanvallen volgen.

e. *De dubbelde daagsche koorts (febris int. quotidiana duplex, vel duplicata)*. Heeft in de 24 uren twee regelmatig aflopende aanvallen, met eenen koortsvrijen tuschentijd. Zij komt zeer zelden voor, de beroemde FRANK, zag haar slechts eenmaal, andere Geneesheeren hadden gelegenheid haar meermalen te zien, in tijden van Epidemien heb ik ze eenige malen waargenomen, bij lijders met chronische gebreken die reeds koortsaandoening hadden en bij hun waar de tuschenpozende koorts, in eene aanhoudende over ging.

f. *De dubbelde anderen daagsche koorts, (febris tertiana duplex)*. Maakt in de 24 uren eenen aanval, die zich niet gelijk is,

maar in hevigheid, duur, toevallen en den tijd waarin zij komt, op de effen en oneffen dagen, verschilt. De aanval van den eersten dag komt overeen met die van den derden, en die van den tweeden, met dien van den vierden enz., zij heerschen in het voor- en najaar dikwijls Epidemisch, en komen veelvuldiger als de andere dubbelde koortsen voor. Zij worden ligtelijk met de eenvoudige daagsche koorts verwisfeld. In haar begin en einde zijn, of worden zij dikwijls eenvoudige anderendaagsche, die dezer *typus* aandemen. De verdubbelden anderendaagsche koorts, (*febris int. tertiana duplicata*) die om den anderen dag twee aanvallen hebben, zijn volgens het getuigenis der meest ervarenene Geneesheereu door hun niet gezien. Hoezeer men nu wel niet de mogelijkheid van deze koortsvorm kan betwisten, mag men toch vaststellen dat zij ten hoogsten zeldzaam is.

g. De dubbelde derdendaagsche koorts. (*febris int. quartana duplex*.) maakt twee achter een volgende dagen eenen aanval, en de derde dag blijft vrij. De aanvallen van den eersten en vierden dag, en die van den tweeden en vijfden, zijn in sterkte der toevallen en den tijd wanneer zij komen, aan elkanderen gelijk. Deze koorts is in het geheel niet zeldzaam, veel malen heb ik haar in koorts Epidemiën, vooral in het najaar, en
bij

bij lijders, die aan de zeeuwfche koorts gingen, waargenomen. In het algemeen vond ik haar minder hardnekkig, minder nadelig voor de bewerktuiging in de gevolgen, en ligter om te genezen, als de eenvoudige derdendaagsche. De verdubbelde derdendaagsche koorts, (*febris quartana duplicata*). wanneer op den koortsdag twee aanvallen zijn en de twee tusschendagen vrij blijven, en de verdubbelde (*febris quartana triplicata*) zijn, indien zij immer voorkomen, en de daarvan geboekte voorbeelden niet aan misvattingen haar aanwezen te danken hebben, doch zeker de zeldzaamste van allen.

6°. *Verdeeling volgens de geaardheid van den aanval. (Paroxysmus).*

a. *Gewone tusschenpoozende koorts. (febris intermittens ordinaria).* Deze zijn de genoemde goedaardige, welkers aanvallen uit de gewone tijdperken en de daartoe behoorende toevallen zamengesteld zijn, regelmatig opkomen, afloopen, eene koortsvrije tusschentijd, en geene toevallen die iets kwaads voorspellen met zich gepaard hebben. zij zijn de meest gewone van alle tusschenpoozende koortsen, genezen gemakkelijk, volkomen, en laten geene naziekten terug.

b.) *De half aanhoudende tusschenpoozende koortsen. (febris intermittens subcontinua, subintrans, tritacophyra, semiteriana, hemi-*
tri-

tritaeus). Zijn diegene waarin de koortsvrije tijd, tusfchen de aanvallen , zoo kort en onduidelijk is, dat zij zich naauwelijks laat onderscheiden en men in twijfel ftaat , of de onderhevige koorts tot de tusfchenpoozende of aanhoudende , of tot beiden tevens behoort. Met de anderen daagfche koortfen , is dit het meeste het geval , wanneer zij lijders aantasten die alvorens reeds aan eene aflatende koorts leden , en nu bij aanhoudende koortfen om den anderen dag eenen aanval van zwaare koude krijgen , waarna zich de koorts nog meer verheft. Deze koortsvorm is hoogst gevaarlijk ; in tijden dat kwaad-aardige koortfen heerschen , komt zij het meeste voor. De oorzaak waarom men haar zeldzaam beschreven vindt , en haar bestaan in twijfel getrokken wordt , is mijns bedunkens daarin gelegen , dat vele Geneesheeren op den tijd pas dien de koortfen in acht nemen , weinig oplettend zijn , en zulks zelfs bij sommigen onder de beuzelarijen gerekend wordt ; bij de fchriften der oude geneeskundige is zij bekend onder den naam van *Tritacophijra*.

Als de tusfchenpoozende koortfen den fchijn van eene aanhoudende aannemen , doordien zich de aanvallen zoodanig in de lengte rekken , dat de eene aanval in den volgenden overgaat , de lijders aanhoudend koorts hebben , waar de verheffingen regelmatig , met koude en om den anderen dag plaats hebben , dragen zij den naam van *Hemitritaeus*.

Ko-

Komen de aanvallen dagelijks, en telkens eenige uren vroeger, en houden langer aan, zoodat, zij met den derden of vierden aanval, den geheele tusschentijd, die koortsvrij zijn moest aanvallen en in elkanderen overgaan, dan is het een *febris subintrans*. Het zijn gewoonlijk anderendaagsche, de aanval begint met koude, en alvorens dezelve geheel nalaat, neemt zij den regelmatigigen loop der anderen daagsche koorts weder aan.

Wanneer tusschenpoozende koortsen in volkomen aflatende (*remittentes*) overgaan, die zich van de gewone alleen daarin onderscheiden, dat eene tusschenpoozende koorts voorafging, en de verheffingen (*exacerbationes*) en aflaten (*remissiones*) eene groote regelmatigheid inachtnemen, heeten zij half aanhoudende. (*febris subcontinua*.)

Alle de genoemde koortsen zijn veel belangrijker ziekten dan de andere tusschenpoozende koortsen, zij houden het midden tusschen de gewone, en de hoogst gevaarlijke zeer dikwijls doodelijke vergezellende koortsen, waarvan straks nader zal gesproken worden. De zwakte en krachteloosheid die haar als voorloopers voorafgaan, de hoofdpijn, neiging tot ijlhoofdigheid, slaapzucht, de belangrijkheid en menigvuldigheid der overige toevallen, geven genoegzaam het groote gevaar, dat zij influiten, te kennen.

c. De

c. *De vergezellende koortfen. (febres interm. comitatae).* Dragen dezen naam uit-
 hoofde van het eene of andere toeval, dat
 iederen aanval vergezeld, met het afgaan der
 koorts verminderd en in de koortsvrije tus-
 fchentijd geheel nalaat. Gewoonlijk zijn deze
 bijkomende toevallen belangrijker als de koorts
 zelve en wijzen een bijzonder lijden van het
 zenuwftelfel onder de gedaante van eene alge-
 meene of plaatselijke ziekte aan. Het koorts-
 karakter is bijna altijd dat van *typhus*. Zij
 komen meerendeels als Epidemifche en Ende-
 mifche koortfen in moerasfige landen na heete
 zomers, bij hoog bejaarden lieden ook Sparo-
 disch voor. Haar *typus* is gewoonlijk de
 anderendaagfche en derdendaagfche zelden de
 daagfche of dubbelde. De tijd tufchen de
 aanvallen is zelden volkomen koortsvrij; de
 pols blijft fchielijk en klein, of is onregelma-
 tig en tufchenpoozende; de tong en mond
 blijven droog, de dorst, hoofdpijn en onrust
 houden aan, de lijder zijn zeer zwak, afge-
 mat en droevig; dikwijls zijn zij zoo zwak,
 dat zij naauwelijks verftaanbaar kunnen fpre-
 ken. De geringfte beweging veroorzaakt wal-
 ging, misfelijkheid, brakingen en flauwtens,
 zij zweeten fterk, de *urin* blijft waterachtig
 en rauw, de lijders zijn flapeloos of flapzuch-
 tig en gevoelen zich bij het ontwaken, nog af-
 gematter als te voren.

De Schrijvers over de tusfchenpoozende koortfen raadplegende, vindt men voorheelden van bijna alle ziekten en toevallen, welke zich wel eens met tusfchenpoozende koortfen vereenigden, en als vergezellende koortfen voorkwamen. Daar het hier de plaats niet is alle aan te halen, zullen wij ons alleen tot de gewigtigfte en meest gewoone bepalen. REIL, VON HOVEN, MEDICUS, TRNKA, enz. hebben dezelve alle meer afzonderlijk behandeld.

Bij eenige van deze koortfen zijn de gewone toevallen der tusfchenpoozende, alleen zoodanig vermeerderd en hevig, dat zij eene eigenaardige gedaante aannemen en het gevaar aanmerkelijk vergrooten. Of de aanwezige toevallen zijn geheel vreemdaardig aan die, welke in de gewone tuspoozende koortfen waargenomen worden.

Tot de eerste foort behooren :

- a. *De koorts met koude verftijving, (febris intermittens algida).* De toevallen zijn, buitengewone zware en hevige koude, gedurende den geheelen aanval, weinig of geene hette noch zweet, en onvolkomene tusfchenpoozingen. Wanneer de lijders gelijktijdig hette en koude ontwaren, die, gelijk de oude zeggen, met elkanderen ftrijden, dan noemen zij ze eene heet-koude koort (*epiala*), zij gaat met de volgende toevallen gepaard: onleschbare dorst, groote benaauwheid, bleek, ingevallen, ontfteld, dood-ge-

gelijkend aangezicht, tusfchenpoozende pols, buitengemeen groote zwakte, onvermogen zich te bewegen, flauwten, en met den derden of vierden aanval, de dood.

- b. De zweetkoorts, (febris intermittens sudatoria, diaphoretica, elodes, helodes).* Matige koude die niet in drooge hette, maar in een zeer fterk en fmeltend zweet overgaat, dat zeer lang duurt en meerendeels eerst met de koude van den volgende aanval voor eenen korten tijd ophoudt, om met vernieuwde hevigheid weder te beginnen. Met iederen aanval neemt het zweet toe, de natuurlijke warmte verminderd, de pols wordt zeer zwak en tusfchenpoozende, de krachten verminderen, zelden overleven de lijders den derden aanval.

Tot de tweede foort van vergezellende koortfen die onder de gedaante van eene andere ziekte en met vreemdaardige verfchijnselen en toevallen voorkomen, behooren:

- a. De tusfchenpoozende koorts met flaapzucht. flaapkoorts, (febris soporosa).* Naarmate de flaapzucht tot eenen meer of minder hoogen trap gerezen is, komt deze koorts met onderscheidene benamingen voor. Als de lijders aanhoudend flapen, maar kunnen opgewekt worden, dan is het *febris interm. comatosa*; wanneer de lijders wel kunnen opgewekt worden, maar wakker zijnde, bewustloos blijven en ijlen; *febris interm. lethargica*; als de flaap aanhoudend en

zoo vast is, dat de lijder in het geheel niet kan opgewekt worden, *febris interm. narcotica*; als de ademhaling daarbij fnorkend, het aangezicht blaauwachtig opgezet en de aanval plotseling op een oogenblik begint, *febris apoplectica*. Daar deze onderscheidene benamingen alleen de de verschillende graden aanwijzen, die de slaapkoorts heeft, zoo zijn zij ook alleen maar in dat opzigt van eenig nut voor de beoefening der geneeskunde. Meest heerschen zij Epidemisch, de aanvallen duren zeer lang, de tijd tusschen de aanvallen is zelden volkomen koortsvrij. De slaapzucht begint reeds met den eersten aanval, neemt met den volgende toe, en doodt door beroerte met den derden of vijfden. Zij houdt den anderendaagschen, derdendaagschen en dubbeld derdendaagsche *typus*. De laatste was in de Epidemie van 1808 en 1809 de gewoonlijkste.

b. *Tusschenpoozende koorts met flauwte (febris interm. syncopalis)*. De koortsaanval begint met flauwten, die afwisselend, tot aan zijn einde voortduren; de pols is klein en zwak, de lijder in den hoogsten trap krachteloos, zoo zelfs, dat in den vrijen tijd, tusschen de aanvallen, de geringste beweging flauwte ten gevolge heeft; de meeste lijdens sterven in de eerste aanvallen.

b. *Tusschenpoozende koorts met slijking, (febris interm. astmatica, catarrhalis)*. De

aanvallen beginnen met drooge hoest, benaauwdheid, aamborstigheid, reutelend geluid op de borst; met iederen volgende aanval, nemen deze toevallen toe, de lijders worden hoe langer hoe onrustiger, de handen voeten en het aangezicht worden koud, hebben eene blaauwachtige gemarmerde kleur, de pols is zeer klein, het zweet koud, de ademhaling word steeds moeilijker, de zwakte neemt toe, en de lijders geven, als iemand, die aan gebrek van lucht tot den ademhaling geschikt, stikt, den geest.

d. *Tusfchenpoozende koorts met blindheid*, (*febris intermittens Coeca*). De koortsaanval begint met blindheid, die eerst met zijn ophouden verdwijnt. Gewoonlijk zijn gelijktijdig nog andere zenuwtoevallen, als slaapzucht, flauwten, stuip-trekkingen, doofheid, gevoelloosheid, enz. aanwezig. Zij is zeer gevaarlijk en doodt, na weinige aanvallen door beroerte, stikking en stuipen.

e. *De tusfchenpoozende koorts met zijde-wee*, (*febris interm. pleuritica*). Iedere aanval begint met de gewone toevallen en verschijnselen van het zijde-wee (*pleuritis*) welke gedurende den koortsvrijen tusfchentijd nalaten, of geheel verdwijnen, maar met iederen aanval heviger wederkeeren. De koorts kan daarbij het karakter van *synocha* of *typhus* hebben. De ontsteking doorloopt niet tegenstaande de tusfchenpoozingen hare gewoone tijdperken, en kan in verettering of versterving overgaan. Gewoonlijk heerscht de-

deze koorts in het najaar Epidemisch, en gaat met de gastrische en galachtige gesteldheid gepaard; over het algemeen heerscht zij niet dikwijls. Ook andere ontstekingen kunnen een tusfchenpoozend karakter aannemen, of zich met eene tusfchenpoozende koorts verbinden.

f. *Tusfchenpoozende koorts met maagkramp (febris interm. cardialgica)*. De koortsaanvallen worden door hevige pijnen en kramp in de maag voorafgegaan, of gaan er mede gepaard, alsook met misfelijkheid, neiging tot braken en looze braken; flauwten, krachteloosheid, hik, stuiptrekkingen en andere toevallen meer, komen met iederen aanval terug, nemen in hevigheid toe, en kunnen doodelijk afloopen.

g. *Tusfchenpoozende koorts met pijn in den buik, (febris interm. colica)*. Tusfchenpoozende zeer zware pijnen in de navelftrek en den onderbuik, die met de koortsaanvallen beginnen en afgaan, verstopte buiksondlasting, hevige zeer afmattende braken, met een brandend gevoel in den flokdarm en keel, moeilijke waterlozing, benaauwdheid, koud zweet, zenuwtoevallen, stuiptrekkingen enz. die ten laatsten met den dood eindigen.

h. *Tusfchenpoozende koorts met boord, (febris interm. choleric)*. Onderscheidt zich van de vorige alleen door grootere hevigheid in de genoemde toevallen, den spoediger volgenden dood,

en de ruime ontlastingen van galachtige stoffen doorbraken en buikloop.

7. *Tuschenpoozende koorts met watervrees, febris interm. hydrophobica*), meer dan gewone zware koortsaanvallen, die regelmatig beginnen en allooopen, zware dorst, drooge brandende mond en keel, een zamentrekkend gevoel langs de loop van den flokdarm, onoverwinnelijke afkeer van alle dranken, en volkomene watervrees. Gedurende de eerste koortsaanvallen, klaagt de lijder alleen over moeilijke slikking, en dat hem alle dranken tegenthaan, met de volgende aanvallen ontwikkelt zich dit toeval in zijn geheel, in den koortsvrijen tuschen-tijd, kunnen zij zonder ietsel drinken. Tweemaal heb ik deze koortsvorm waargenomen, in beide gevallen, slierven de lijders in den 5den aanval, met stuiptrekkingen.
8. *Tuschenpoozende koorts, met pijn in de ledematen, febris interm. arthritica*). Vastzittende of vliegende pijnen in de ledematen, sotten gedurende den koortsaanval, den lijder op het hevigste, de pols is daarbij klein en krampachtig, de lijder zeer benaauwd, de adembaling moeilijk, zware dorst, groote algemeene zwakte, kramp en stuiptrekkingen die doodelijk eindigen.
9. *Vermomde tuschenpoozende koorts, (febris intermittens laryata,)* noemt men de zoodanige ziekten, welke van hare gewone vorm en loop afwijken, regelmatige aanvallen en vrije tuschen-

schentijden hebben. Gewoonlijk houden zij den anderendaagschen *typus*, echter kunnen zij ook iederen anderen aannemen. Zij komen het mees- te voor in tijden, waarin tusfschenpoozende koort- sen Epidemisch heerfschen, en in landen waar zij tot de gewone landziekten behooren; intus- fschen heeft men ze ook gezien in landen, en tijden waarin hoogstzelden tusfschenpoozende koortsen waargenomen worden. Meerendeels hebben zij een zenuwaardig en kwaadaardig karakter, doch zelden zijn zij het in eenen zoo hoogen trap als de vergezellende. De koorts- toevallen, die den gewonen aanval der tus- fschenpoozende koortsen zamenstellen, ontbreken dan eens geheel of zijn slechts onvolkomen ont- wikkelt aanwezig, doch nimmer heeft eene vol- komene koortsaanval, die met koude begint, en met zweet eindigt, daarbij plaats, [want dan zouden zij tot de vergezellende behooren, want het hoofdzakelijkste onderscheid waardoor zich beide koortsvormen van elkanderen onderscheiden is, daarin gelegen. De ziekte, welke deze pe- riodieke gedaante aanneemt, is of plaatselijk of algemeen. Tot de eerste behooren de waar- genomene gevallen van halfzijdige hoofdpijn, tand- en kiespijn, maagkramp, hik, blindheid, doofheid, belemmerde spraak, pijn in een der ledematen enz. Tot de tweede behooren, val- lendeziekte, vrijsterziekte, (*hysteria*) krankzin- zinnigheid en alle mogelijke zenuwziekten; roo-

deloop, aamborstigheid, zijde-wee, boord &c. Het periodike dat deze ziekte in dit geval aanneemt, en dat zij meerendeels alleen door de kina en andere koortsverdrijvende middelen te genezen is, kenschetst dezelve als vermomde koorts, en doet haar onderscheiden van de gewone vormen welke zij anders heeft. Naast deze eigenheden, neemt men ook nog andere verschijnselen waar, welke, waar zij aanwezig zijn, geen twijfel omtrent haren eigendommelijken aard overig laten. De eerste aanval begint met koude, die met den eerstvolgenden minder is, en later geheel wegblijft. Ieder aanval eindigt met zweet. Bij eenen periodike hik, en bij eenen anderen lijder, met periodike krankzinnigheid, die beide door kina genezen zijn, vindt ik dit standvastig plaats hebben. De lijders hebben den gewonen onaangename metaalachtigen smaak, eigenaardigen nuchteren reuk uit de mond, zwaren dorst, zuur ruikend zweet, dat het linnen geel verft. De urin laat het gewone tichelsteen kleurig bezinkfel vallen; de krachten nemen sterk en spoedig af, en er heerschen ter gelijker tijd tussehenpoozende koortsen.

Verdeeling der tussehenpoozende koortsen, volgens haar bijzonder karakter.

- a. *Ontstekingsaardige tussehenpoozende koortsen, (febris intermittens inflamatoria, sthenica.* Het ontsteking karakter is zeker het zeldzaamste dat de tussehenpoozende koorts aanneemt. De mo-

gelijkheid daarvan geheel te ontkennen, zoude de grootste dwaasheid zijn, daar de getuigenissen der voortreffelijkste Geneesheeren, en de dagelijksche ervaring haar bestaan bewijzen, en de ijdelheid aantonen van den twist, met zoo veel bitterheid, tusfchen de Brouwnianen en niet Brouwnianen gevoerd; om dat de eerste de ontstekingsachtige tusfchenpoozende koortfen geheel uit de leerboeken der geneeskunde wilden verbannen, en alle voor asthenisch gehouden hebben. In den winter en het voorjaar, vindt men ze het meest, zelden in den zomer, bijna nimmer in het najaar. Meerendeels alleen *sporadisch*, bij jonge anders gezonde sterke en volbloedige personen, die eenen voedende, prikkelende en verhittende leefregel volgen; na onderdrukte gewone bloedontlastingen en achterweeg blijvende maanftonden, bij sterke en volbloedige vrouwen. Somwijlen heerschen zij ook Epidemisch, of nemen tijdens eene ontstekingsachtige ziekte gesteldheid, daarin deel, hoezeer zij oorspronkelijk een ander karakter gehad hebben.

Zij houden gewoonlijk den daagschen of anderendaagschen *typus*, nimmer of zeer zelden den derdendaagschen, met vooruitspringende aanvallen. De koorts houdt voor het overige eenen zeer regelmatigen loop, begint zonder voorloopers en valt plotseling aan. De aanval begint met zware koude, die door eene brandende lang aanhoudende hitte, hoofdpijn en ligte ijlhoof-

digheid gevolgd wordt; de huid blijft lang droog, in de eerste aanvallen zweten de lijdens weinig, in de volgende neemt het toe, en is zeer ruim, naarmate dat de ontstekingsachtige gesteldheid afneemt. De pols is vol en hard in de aanvallen, en alle de gewone en bekende toevallen eener ontstekingskoorts aanwezig. De tijd tusschen de aanvallen, is in de daagsche nimmer geheel koortsvrij, de pols blijft vol en hard, de dorst, hette en hoofdpijn duren voort; zij zijn zeer genegen in eene aanhoudende koorts, met ontsteking over te gaan, en worden ligtelijk met de half aanhoudende verwisseld. Bij de anderen-daagsche, is de tusschentijd zoo niet volkomen, doch veel duidelijker als bij de eerste; de langerdurende tijdsruimte tusschen de aanvallen, brengt de toevallen meer tot bedaren, intusschen blijft de pols steeds eenigermate vol en hard, en onderscheid zich zeer kennelijk van den kleinen zwakken pols, bij koortsen van het *typus* karakter. Als zij zuiver ontstekingsachtig zijn, en eenen eenigzins hoogen trap bereiken, gaan zij met plaatselijke ontstekingen, of ten minsten met toevallen gepaard, die eene neiging tot ontsteking, en vermeerderden aandrang van vochten, naar enkele deelen te kennen geven. De ijlhoofdigheid, het roode opgezette aangezicht, roode uitpuilende oogen en neusbloeding, vindt men, wanneer de hersenen het meest door

de-

deze ontstekingsachtige gesteldheid lijden. Heeft dit plaats met de ingewanden der borstholte, dan is de borst bezet, de ademhaling moeilijk, kort afgebroken, de hoest droog, met aanhoudende of vliegende pijnen in de borst, benevens die toevallen, welke bij pleuris en longontstekingen voorkomen. Het ontstekingsachtige koortskarakter, kan ook met de andere gemengt en vereenigt voorkomen, het meeste heeft dit plaats met het gastrische en galachtige, en men heeft niet zelden geheele Epidemien van deze geaardheid waargenomen.

6. *De zenuwachtige tusfchenpoozende koorts, (febris interm. nervosa, asthenica).* Op verre weg de meeste tusfchenpoozende koortsen, hebben dit karakter, of nemen het in haren loop aan, ook daar, waar zij oorspronkelijk een ander gehad hebben. Zij heerschen meest Endemisch en Epidemisch, nemen alle gedaanten, van eenvoudige, goedaardige, kwaadaardige, vergezellende en vermomde aan. Haar *typus* is onbepaald, voor uit springend, of achter uitgaande, de daagsche, anderendaagsche en derdendaagsche, zoowel enkel als dubbeld; in moerasfige landstreken, in het najaar, bij aanhoudend koud en vochtig weder, na sterk opgewekte hartstogten, zijn zij het gewoonlijkst; alle de oorzaken, welke eene aanhoudende zenuwkoorts voortbrengen, kunnen ook eene tusfchenpozend ten gevolgen hebben. Bij de geneeskundige

Schrijvers, over deze koorts, vindt men, dat zij somwijlen het zenuwachtige karakter als het eenigste dat zij aanneemt, vaststellen; dewijl andere dit karakter alleen bij de kwaadaardige en vergezellende, zoo als de slaapkoorts, de koorts met beroerte enz. willen laten gelden, en nemen nog eene koortsfoort, onder de benaming van prikkelkoorts (*febris a nimia irritatione*), aan. Doelmatiger komt het mij voor, alle tusfchenpoozende koortfen, die het bepaald, ontstekingsachtig, rotachtige en gastrifche niet hebben, en alle stoffelijke oorzaken ontbreken, of waar deze opgeruimd zijnde, de koorts voortduurt, en alleen door kina en foortgelijke koortsverdrijvende middelen kan genezen worden, als tot de zenuwkoortfen behoorende, te beschouwen. En naar belang der meerdere of mindere gevaarlijkheid en belangrijkheid der toevallen, eene ligte goedaardige tusfchenpoozende zenuwkoorts, en eene zware, gevaarlijke of kwaadaardige aan te nemen.

Zij onderscheiden zich van andere tusfchenpoozende koortfen, door haren langeren duur, zware pijn, in het hoofd met woestheid, duizelingen, ijlhoofdigheid, flauwten, groote zwakte; opspringen der pezen, slaapzucht, verlammingen, beroertens, ftuiptrekkingen en andere zenuwtoevallen; belemmerde zinwerktuigelijke verrigtingen, blindheid, doofheid, gevoelloosheid enz; de pols is klein, zwak, onregelmatig of

tus-

tusfchenpoozende. Met het afgaan der koorts-aanval, verminderen deze toevallen, maar zelden is de tusfchentijd zoo volkomen als bij andere koortfen, en er blijven meerdere of mindere, der genoemde toevallen terug, die eerst geheel, in het tijdperk der genezing verdwijnen.

- c. *De rotachtige tusfchenpoozende koorts*, (*febris intermitt. putrida.*) Heerscht meest Epidemisch in heette landen en moerasfige gronden. Zij houdt gewoonlijk de daagsche of dubbelde anderendaagsche *typus*, de aanvallen springen vooruit, loopen spoedig in elkanderen, en de koorts neemt de gedaante van eene gewone aanhoudende rotkoorts aan. Zij onderscheidt zich van andere tusfchenpoozende koortfen, door haare kwaadaardigheid, de uitputtende ontlastingen, de neiging tot ontbinding en rotting, en alle die toevallen, welke bij de aanhoudende rotkoorts voorkomen. Toevallen, die het meeste in deze koorts waargenomen worden, zijn: bloedige buiksontlastingen, uitputtend zweet, zwarte, blaauwe en roode vlekken, en koudvurige verstervingen. De koude, waarmede de eerste aanval begint, is zeer zwaar, in de volgende aanvallen minder, maar de hitte zeer brandend en langdurig, in de tijd tusfchen de koortsaanvallen, verminderen de ziekteverschijnselen, maar houden niet geheel op, de vlekken zijn minder duidelijk, doch zichtbaar. De koudvurige verstervingen, blijven met het afgaan van iederen
- aan-

aanval op die hoogte staan, welke zij in den aanval bereikt hebben, maar nemen telkens, gedurende den volgenden in uitgebreidheid toe. De lijders herstellen zeer langzaam en blijven lang zwak. De kina moet spoedig in substantie, en in ruime giften toegediend worden, anders bezwijken zij in den derden of vierden aanval. In een merkwaardig, hiertoe behoorend geval door mij behandeld, werd de lijder plotseling aangevallen, en raakte buiten kennis, het geheele ligchaam was met vlekken bezaaid, aan de ledematen kwamen blaauwe blazen met een stinkend scherp vocht gevuld, uitbotten; aan de elleboog, de heup en den enkel, van die zijde waarop de lijder gelegen had, zag men koudvurige verstorvene plekken; van de grootte van een schelling, tot die van eenen gulden. De aanval duurde 12 uren, en eindigde met een zeer ruim en stinkend zweet. In de apyrexia was de pols klein en zwak, de lijder klaagde zeer over afgematheid, en konde het bed niet verlaten. De koorts hield den anderendaagschen *typus*. De volgende aanval was gelijk aan de eerste, de verstervingen namen toe, en er kwamen nog meer vlekken en blazen op, niettegenstaande dat de lijder twee oncen kina in poeder met wijn, en andere gepaste geneesmiddelen gebruikt had, nadat een braakmiddel was voorafgegaan, dat zeer ruime ontlastingen bewerkte had. De derde aanval was korter van duur, de

toe-

toevallen minder hevig, de verftervingen bleven staan, er waren drie oncen kina tusfchenbeiden gebruikt. De vierde aanval was zeer gering, de vijfde en zesde naauwelijks merkbaar, en de zevende bleef geheel achter. De koudvurige verftervingen gingen tot ettering over. De lijder herstelde bij het voortdurende gebruik van verfterkende en voedende hulpmiddelen langzaam maar volkomen.

4. *De gastrifche tusfchenpoozende koorts, (febris interm. gastrica),* gaat altijd met meer of minder duidelijke ontwikkelde gastrifche toevallen gepaard. Naar den aard der gastrifche ophooping, verdeelt men ze in galkoortfen (*feb. int. biliosa*) in flijmkoortfen, (*feb. interm. pituitosa*) wormkoortfen (*feb. interm. verminosa*), en in koortfen met ophooping van onverteerde en andere vreemde, door den mond in de eerfte wegen gebragte ftoffen (*febris interm. saburrhalis*).

Zeer vele tusfchenpoozende koortfen hebben dit karakter, of gaan er mede gepaard; doordien de meeste der voortgedragen oorzaken van dien aard zijn, dat zij eenen nadeeligen invloed op de fpijsverteringswerktuigen uitoefenen, en hunne verrigtingen ziekelijk veranderen. Of de opgehoopte ftoffen in de eerfte wegen, de eenigfte oorzaken voor de tusfchenpoozende koortfen opleveren, en hoe zij bij eene voortdurende inwerking, eene periodike tusfchenpoozende ziekte

te kunnen voortbrengen, zijn voor alsnog, onbeslisbare twist gedingen, waarop men wel de grondstellingen van de onderscheidene geneeskundige leerstelsels toegepast, maar daardoor nimmer verklaard heeft. Voor de beoefenende geneeskunde is het van belang, dat de tusfchenpoozende koortfen, met de gewone gastrifche toevallen en verfchijnfelen gepaard gaan, en dat men de behandeling daar naar moet regelen en wijzigen. De ervaring heeft door alle tijden en ten fpijte van alle ftelsels geleerd: dat geheele Epidemien dit karakter kunnen hebben; dat eene roes, eene overmatige maaltijd, bedorvene of onverteerbare fpijzen, dikwijls weinig uren na het genot, door eene tusfchenpoozende koorts gevolgd worden; dat vele alleen door ruime brakingen en buikontlastingen genezen, die aan alle andere geneesmiddelen, hardnekkigen tegenftand bieden, en zich verslimmeren; en eindelijk, dat zeer vele, die blijkbaar een ander karakter hebben, niet eerder door kina en andere koortsverdrijvende geneesmiddelen, geneesbaar zijn, alvorens men de eerfte wegen, van de daarin bevatte ftoffen ontledigt heeft. De gastrifche koortfen zijn eenvoudige, zuiver gastrifche, of zamengeftelde, met het ontftekingachtige, zenuw- of rotachtige karakter. De gastrifche heerfchen meer in het najaar als in andere jaargetijden, gewoonlijk Epidemifch fporadifch komen zij in alle jaargetijden voor. Zij houden alle mogelijke foorten van aanvallen, de daagsche,

anderendaagsche en derdendaagsche. De gal-koorts houdt gewoonlijk den anderendaagschen. De slijmkoorts vooral, wanneer zij met ziekelijk ingewanden verbonden is, den derdendaagschen. De wormkoorts heeft meest eenen onregelmatigen *typus*. Bij de anderen is hij regelmatig met volkomene koortsvrijen tusschentijden. Doelmatig behandeld zijn zij niet zeer langdurig en de krachten herstellen zich spoedig, maar zij zijn zeer tot instortingen genegen. De meest kenmerkende en duidelijkste aanwijzenden toevallen: zijn, aanhoudende misfelijkheid, bitteren onaangename smaak, slijmige geel beflagene tong, brakingen met ruime stofontlastingen geduren de deaanval-
len, gevoel van zwaarte en volheid in de maagstreek, opgespannen onderbuik, rommelingen van winden, zeer stinkende buikontlastingen, hoofdpijn, duizelingen, benaauwdheid, walg tegen alle spijsen, verlangen naar zuurachtige dranken, geelachtige smerige kleur van het aangezicht, vooral van het witte der oogen, troebele hooggekleurde pis.

a. *Voorgeschiedheid.* (*praedispositio*). Bij de oorzaken meeste lijdens, welke door eene tusschenpoozende koorts aangetast worden, gaat eene zekere aanleg voor dezelve vooraf. Die dan eens duidelijk ontwikkeld, en door de voorboden der koorts kenmerklijk wordt; bij anderen in het verborgene sluimert, zonder zich in het geringste door waarneembare toevallen te openbaren. In tijden van Epidemien
ziet

ziet men niet zelden, dat de fchijnbaar gezondfte en fterkfte menfchen plotfelings aangetast worden, terwijl den eene veel mindere duurzame gezondheid welke aan dezelfde fchadelijkheden bloot ftonden, bevrijd blijven, hetzelfde heeft plaats waar zij fporadifch voorkomen.

Waarin deze aanleg zijnen grond heeft, en van welke veranderingen in de bewerktuiging hij afhankelijk is, laat zich niet ftellig verklaren, even min als zich niet bepalen laat, of de aanleg bij alle koortfen dezelfde, of volgens haar onderscheiden karakter ook verfchillend is, en of hare verfchillende geaardheden, alleen in den aanleg, in de toevallige oorzaken, of in beiden moeten gezocht worden, eene bijzondere wijziging der prikkelbaarheid, eene vermeerderde of verminderde affcheiding en ongelijkmatige verdeeling van het zenuwvocht; vreemd-aardige prikkeling in de eerfte wegen; en eigenaardige veranderingen in de menging en zamenftelling der bewerktuigde ftof, zijn waarfchijnlijk, ieder voor zich alleen, genoeg voor de eenvoudige goedaardige koorts; en meerdere gelijktijdig aanwezig en vereenigt, voor de zamengestelde en kwaadaardige, de voorbefchikkende gefteeldheid of aanleg, waardoor het ontftaan eener tufchenpoozende koorts, door inwerking der bijkomende toevallige oorzaken, mogelijk gemaakt wordt.

Voor het overige is het daarvoor te houden, dat de aanleg voor de ontftekingachtige of aftenitfche tufchenpoozende koorts, het meeste, met dien voor
de

de eenvoudige ontstekingskoorts overeen komt. Terwijl voor de asthenische of die met het tijphus karakter, voornamelijk zwakke zeer prikkelbare gestellen, uit andere ziekten en koortsen verzwakt, en voor de gastrische de zoodanige voorgeschikt zijn, welke een phlegmatisch slijmachtig gestel hebben, aan verstoppingen verzwakkingen en ziekelijk gewijzigde afscheidingen in de eerste wegen lijden, en daarbij eene, zoowel in hoeveelheid als hoedanigheid, onregelmatige en flechte leefwijze houden.

Dezelfde toevallige oorzaken, welke aanhoudende koortssoorten voortbrengen, kunnen ook tusschenpoozende doen ontstaan. De reden waarom zij, bij het eene voorwerp eene tusschenpoozende, bij het andere eene aanhoudende ten gevolge hebben, schijnt alleen in den verschillenden aanleg gegrond te zijn, wederkerig is de aanleg, een gevolg der onderscheidene toevallige oorzaken, en meer in het bijzondere van de schadelijke invloeden van het klimaat, de jaargetijden, de weersgesteldheid, en die des dampkrings, met alle daarin plaatshebbende veranderingen.

De geschiedenis der tusschenpoozende koortsen, levert resultaten, die aan deze veronderstelling: dat de aanleg een gewrocht der toevallige oorzaken zij, vele waarschijnlijkheid bijzetten. Geheele landen en gewesten worden er gevonden, waar de tusschenpoozende koortsen tot de zeldzaamste ziekten behooren, terwijl zij in andere landen nimmer ophouden te heerschen. De natuurlijke gesteldheid van den

grond en den dampkring, in alle gewesten waarin zij heerschen, onverschillig of deze tot de heete, gematigde of koude streken des aardbodems behooren, stemmen steeds met elkanderen overeen, even als zij verschillen met die van landen, waarin deze koortsen zelden voorkomen en bijna nimmer Epidemisch heerschen. Waar door natuurkundige hulpmiddelen, deze bijzondere gesteldheden uit den weg geruimd worden, houden de tuschenpoozende koortsen op, tot de landziekten te behooren, en komen in die landen te voorschijn, wanneer eene haar ontstaan begunstigende verandering voortgebracht is geworden. Laagliggende moerasfige landen, die den dampkring bij aanhoudendheid met hunne bedorvene uitwasemingen bezwangeren, zijn het vaderland der tuschenpoozende koortsen, terwijl hooggelegene drooge landen haar bestaan niet dulden. Als de moerasfige gronden drooggemaakt worden verdwijnen de koortsen; wanneer overstromingen, zeer heete zomers, het graven van kanalen, langdurige en aanhoudende regens, deze uitwasemingen voortbrengen, mist het nimmer dat zij Epidemisch of Spiradisch ontstaan. Moeras-uitwaseming is, zoo niet de eenigste doch de voornaamste oorzaak, waardoor eerst de aanleg en naderhand de koorts zelve ontwikkeld wordt. De meerdere of mindere schadelijkheid van deze uitwasemingen, hangt af van de grootere of kleinere hoeveelheid, zwavel-phosphorus en koolstof houdende water-stoflucht, de grootere vochtigheid, de voorafgegane warmte maat, de daarop volgende koude, en de snelheid waarmede

mede de eene met de andere afwifelt. In die jaargetijden, waarin de weers-veranderingen het grootfte zijn: in het voor- en najaar, of in zomers en winters die even veranderlijk zijn, heerfchen zij bij voorkeur, en houden op, zoo ras de weersgefteldheid beftendig wordt, zoowel bij geftadige koude als bij aanhoudende drooge hette.

Tot de gewigtigfte fchadelijke invloeden, die als toevallige oorzaken, behalven de genoemde aan de ontwikkeling der tufchenpoozende koortfen zeer bevorderlijk zijn, behooren, plotfelinge hevig werkende hartstogten, ziekelijke afscheidingen in de eerfte wegen, vooral in de lever en de daarvan afhankelijke ophooping van gal, wormen, flijm, of ophooping van onverteerbare ftoffen, die door haren prikkel eene ziekelijke terugwerking in het vaatftelfel voortbrengen, teruggedrevene kronifche huidziekten, en een eigenaardig *contagium*. De gevallen waarin zich deze koorts door befmetting medegedeeld heeft, zijn wel hoogst zelden, doch haar beftaan wordt door de getuigeniften der geloofwaardigfte geneesheeren, bewezen.

Op de bijzondere karakters der tufchenpoozende koortfen, hebben de toevallige oorzaken, mede eenen gewigtigen invloed. De bijzondere gefteldheden des dampkrings, de jaargetijden, weersgefteldheid enz. met de daarvan afhankelijke fttaande Epidemifche ziekte gefteldheid, deelen zich even zeer aan de tufchenpoozende, als aan alle andere koortfen mede, en wijzigen haar karakter. Als de Epidemifche gefteldheid, de ontftekingaardige is, dan nemen zij

dit karakter; in de gastrifche, het *gastrifche*; in de raauw-zenuw en rotachtige het zenuwen-rotachtige aan. In vele gevallen, vooral wanneer zij *sporadisch* heerschen, oefenen de individueele gesteldheden der lijders, daarop eenen gewigten invloed, bij den volbloedigen sterken, zal het ontstekingsachtige, bij den zeer aandoenlijken zwakken, het zenuwachtige, de overhand hebben.

oorzaak. Alles wat over de naaste oorzaak der koortfen in
proximo. het algemeen, en in het bijzondere bij de aanhoudende gezegd is, vindt hier zijne plaats. Wat de zaak echter hier nog moeilijker, als daar, doet zijn, is het *periodike* en den loop dezer koortfen. Te regt vraagt men, hoe laten zich de afwisselende toestanden, van ziekte en gezondheid verklaren, die regelmatig met elkanderen afwisselen, uit oorzaken welke aanhoudend en gelijkmatig, ten minsten gedurende eenigen tijd haren schadelijken invloed uitoefenen? zijn deze wisselingen aan van buiten op het ligchaam werkende invloeden, aan de veranderende stonden der maan, aan den loop der hemelsche lichamen, aan den invloed die zij op onzen aardbodem uitoefenen, aan *periodike* regelmatige veranderingen in den dampkring, voortgebracht door *electriciteit* of *magnetismus*, die buiten het bereik van ons waarnemings-vermogen blijven, of aan andere voortgelijke veranderingen toe te schrijven? of zijn zij als iets volstrekt inwendigs, in de bewerktuiging gegrond? en moeten zij in eenen bijzonderen koortsprikkel, in eene verandering der bewerktuigde stof, in
eene

eene verhoogde prikkelbaarheid, of in eene gewijzigde afscheiding der zenuw-vloeiſtof gezocht worden? iedere van deze *hypotheſen* heeft een of ander maal tot grondſlag van breedſprakige verklaringen geſtrekt, die aan het einde alleen daartoe dienſtig waren, om ten bewijze te verſtrekken, dat alle verklaringen van dien aard gewaagd, en met de natuur, zoo als zij voor ons waartenemen is, in tweeftrijd ſtaan. Zooveel ſchijnt intuſſchen als zeker te kunnen aangenomen worden, dat welke geaardheid de tuſſchenpoozende koortſen ook hebben, de invloed van het zenuwgeſtel, op het *periodike* der aanvallen, eenen zeer gewigtigen invloed heeft. Geneesmiddelen en geneeskundige behandelingen, hartstogten en gemoeds-geſteldheden die eenen nadeeligen invloed op het zenuwgeſtel uitoefenen, verſlimmeren dezelve niet alleen, maar brengen dezelve terug, waar zij den lijdens reeds verlaten hebben. Eene opgebeurde gemoedsgeſteldheid bevordert hare genezing; plotſelinge vreugde, blijdschap en hoop doet ze uitblijven. Eene ingebeelde zekerheid en vast geloof, dat de aanval op dezen of genen dag, door het aflezen, het dragen van amuletten, het bezweren enz. zal uitblijven, heeft menigen lijder van zijne koorts bevrijdt, die aan de meest gepaste geneesmiddelen wederſtaan had. Vele andere zenuw ziekten nemen eenen tuſſchenpoozenden *periodiken* loop aan, dewijl de meeste zelden, in gelijke hevigheid van haar begin tot het einde voortduren, en doorgaans met koude rillingen of zwaare koude beginnen. De meeste

zenuw-middelen zijn ook nuttige hulpmiddelen tegen de tusfchenpoozende koortfen, en de krachtigfte koortsverdrijvende; de *kina* en het *opium*, zijn ook tegen zenuw-kwalen veelvermogende, en de zekerfte hulpaanbrengende middelen, in zeer vele gevallen.

De Voorzegging. De zoo verre van elkanderen afwijkende bijzondere geaardheden, toevallen en oorzaken die de tusfchenpoozende koortfen voortbrengen, onderhouden en wijzigen, maken de voorzegging moeilijk en dikwijls twijfelachtig; hoe zeer men ook anders mag aannemen, dat in het algemeen, de tusfchenpoozende koortfen minder gevaarlijke ziekten zijn, als de aanhoudende, kan zulks doch alleen maar in zekere betrekkingen gelden, daar de gunstige of ongunstige uitgang, van zoo vele bijzondere omftandigheden afhankelijk is, en zeer veel op eene doelmatige behandeling aankomt.

De gewone uitgangen der tusfchenpoozende koortfen zijn die, welke men ook bij de aanhoudende koortfen waarneemt, namentlijk, zij gaan over in gezondheid, in den dood, of verwisfelen van gedaante, en gaan over in langdurige fleepende naziekten.

Het hoofzakelijkfte waarop zich de voorzegging gronden moet, is afteleiden:

- 1°. Uit de natuurlijke gefchiedenis dezer koortfen.
- 2°. Uit den *typus* dien zij houden, zijne duur, zijne regelmatige loop, de volkomene koortsvrije tusfchen tijd, enz.
- 3°. Uit het bijzonder karakter der koorts.

- 4°. Uit de oorzaken die haar voortbragten.
- 5°. Uit de met haar gepaard gaande toevallen.
- 6°. Uit de jaargetijden, waarin zij heerschen.
- 7°. Uit de heerschende Epidemische jaarsgesteldheid.
- 8°. Uit den tijd dien de koorts reeds geduurd heeft.
- 9°. Uit de voorafgegane behandeling.
- 10°. Uit de bijzondere individuele gesteldheid des lijders.
- 1°. De geschiedenis der tusschenpoozende koortsen, op de voorzegging toegepast, is vooral in dat opzigt belangrijk, dat vele, aan zich zelve overgelaten, zonder dat eenig geneesmiddel gebruikt is, achterweeg blijven. De eenvoudige goedaardige, houdt met den 7den tot 14den aanval op, en de gezondheid herstelt zich volkomen. De kwaadaardige daarentegen vordert spoedige hulp en eene krachtige behandeling, die doelmatig zijnde, den lijder red; bij verzuim of ondoelmatigheid hem doodt; aan zich zelven overgelaten overleeft hij zelden den 3den of 4den aanval.
- 2°. Ten aanzien van den *typus* dien zij houden, heeft het volgende plaats, waarop men letten moet. De anderendaagfche en dubbeld anderendaagfche zijn de goedaardigste van allen, de daagfche is moeilijker om te genezen, duurt langer, en gaat veelmalen in eene aanhoudende koorts over. De derdendaagfche is de langdu-

rigste en hardnekkigste, dikwijls alle geneesmiddelen wederstand biedende soort, en bijzonder genegen in slepende naziekten over te gaan.

De gewone duur des aanvals van goedaardige koortsen is van 6 tot 8 uren; korter zijnde en met iederen volgende aanval verminderende, maakt zij zelden meer als nog twee of drie aanvallen. Duurt zij langer als 8 uren, dan heeft men den overgang in eene aanhoudende, of half aanhoudende, te vreezen. Wanneer dit ook geen plaats vindt, dan zijn zij toch langduriger, hardnekkiger, nemen iets kwaadaardigs aan, of gaan in slepende naziekten over.

Hoe regelmatig de aanvallen op zich zelve zijn, en op bepaalde uren wederkeren, zoo veel te gunstiger is de te verwachtende beslissing. In de goedaardige koortsen zijn de drie tijdperken, welke den aanval zamenstellen, onderling van bijna gelijke duur; zijn zij dit niet, dan heeft men meer of minder kwade gevolgen te duchten. Zeer zware koude kan door den aandrang der vochten naar de inwendige deelen, den lijder dooden. Zware langdurige hitte, mat hem af, en bevordert den overgang in aanhoudende koortsen met het rotachtig karakter. Overmatig zweet put de krachten uit en heeft ook andere smeltende ontlastingen ten gevolge, behalven dat het reeds voor zich een

teeken der bestaande neiging tot het kwaadaardige karakter is.

Koortfen met eenen regelmatigigen op gezette tijden wederkeerenden aanval, genezen gemakkelijker als wanneer zij onregelmatig zijn, en op alle tijden en uren terug komen. De voor- of achteruit springende aanvallen, mits zij niet langduriger worden, wijzen aan, dat zij zich gemakkelijk laten genezen. De vaststaande onveranderlijke aanval is dikwijls een bewijs voor hardnekkigheid; de vooruitspringende die langer duurt als de voorgaande, geeft den overgang in eene andere koortsvorm te kennen. Bij de derdendaagfche, die daardoor in eene anderendaagfche veranderd, is het een goed, bij de anderendaagfche, die in eene daagfche, en bij eene daagfche die in eene aanhoudende overgaat, een kwaad voorspellend verschijnsel. De achteruitgaande aanval, bij de daagfche koorts is goed, wanneer zij daardoor in eene anderendaagfche, bij den derdendaagfchen wanneer zij in eene vierdendaagfche veranderd; maar het is zeer kwaad, wanneer door het achteruitspringen der aanvallen, de anderendaagfche in eene derdendaagfche overgaat, want deze worden bijna altijd de langdurigste van allen.

De eenvoudige *typus* is doorgaans beter als de dubbelde; de overgang van den dubbelden in den eenvoudigen, wijst eene spoedige genezing

aan. De volkomen afgaande koortsaanval en geheel koortsvrije tusschentijd, voorspeld mede eenen gunstigen uitgang, het tegenovergestelde, den overgang in eene aanhoudende.

- 3°. Het bijzondere koortskarakter is in de tusschenpoozende, voor de voorzegging van geen minder aanbelang, als in de aanhoudende. Het ontstekingsaardige is het beste, de behandeling gemakkelijk en de duur der koorts kort; de natuur alleen is in de meeste sterk genoege eenen gunstigen uitgang te bewerken.

Het Gastrisch karakter sluit zelden eenig gevaar in, als het zuiver is. Het galachtige is goedaardiger en de koorts duurt korter, als in het slijm- en wormachtige; gastrische ophooping en de maag, hebben het minste te beteekenen. Intusschen hangt hier alles van eene doelmatige behandeling af. Als zich het gastrische met het zenuw- of rotachtige verbindt, is het gevaar gewoonlijk zeer groot.

Het ligte eenvoudige zenuwachtige karakter, zoo lang er geen toevallen aanwezig zijn, die een zwaar lijden van het hersengeestel en de inwendige zinwerktuigen te kennen geven, sluit weinig gevaar in. De hoogere graden van deze geaardheid, met toevallen van beroerte, slaapzucht of andere belangrijke aandoeningen van het zenuwgestel, wijzen een zeer dringend en spoedig in den dood eindigend gevaar aan.

Het rotachtige karakter is steeds met groot

gevaar verbonden, eene krachtige geneeswijze dadelijk bij het begin der ziekte gebezigt, kan den lijder somwijlen nog redden; aan zich zelve overgelaten, is de uitgang, gelijk bij de vorigen, altijd doodelijk.

De eenvoudige voor zich alleen ontwikkelde karakters zijn minder gevaarlijk als de zamen- gestelde. Het ontstekingaardige met het gastrische is het minder, als het ontstekingaardige met het rot- en zenuwachtige, of het gastrische met deze laatste gepaard. Met plaatselijke ontstekingen verbonden, is het rot- en zenuw- achtige bijna altijd doodelijk. Want, de ont- stokene deelen gaan met den derden of vierden aanval, dikwijls reeds met den tweeden, tot versterking over.

- 4°. De onderscheidene schadelijke invloeden, wel- ke als zoovele oorzaken, de tusschenpoozende koortzen doen ontstaan, zijn ten aanzien van hare geaardheden, voor de voorzegging van zeer veel aanbelang. De Endemische en Epi- demische gesteldheden des dampkrings, die haar voortbrengen, maken ze ook altijd langdurig en dikwijls noodzakelijk, dat de lijder van woon- plaats verandert en eene gezonde lucht inademt, ten zij dat de Epidemische gesteldheid ophoud, en in eene andere overgaat. In moerasige land- streken waar de dampkring met vreemdaardi- ge uitwazemingen en dampen bezwangerd is, zijn alle koortzen zeer langdurig, voornamelijk ech-

echter die, welke eenen derdendaagsche *typus*, houden; de anderendaagsche is het meeste tot instortingen genegen en de daagsche gaat in aanhoudende over. Ophooping en in de eerste wegen, of andere vreemde prikkels, in de daaronder begrepene werktuigen, laten, wanneer zij bekend zijn, en weg kunnen genomen worden eenen gunstigen, kunnen zij dat niet eenen ongunstigen uitgang voorspellen.

Onbekende prikkels, als splinters, gezwellen, eene uitkomende kies of andere prikkende schadelijkheden, maken de tusschenpoozende koortsen zeer langdurig, doen ze in andere ongeneesbare ziekten overgaan en hebben dikwijls den dood ten gevolge. In zeer langdurige gevallen, waarin hoegenaamd geene schadelijkheden te ontdekken zijn, die daarvoor de oorzaken zouden kunnen opleveren, laat zich een voortgelijke onbekende prikkel vermoeden, door alles wat met den lijder in eenige betrekking staat of gestaan heeft, naauwkerig na te sporen, zal men somwijlen de in het verborgene smeulende vonk doen ontdekken, en in staat zijn haar op te ruimen en het leven des lijders te redden.

Ziekelijke gesteldheden, van de lever, de milt en andere ingewanden, die zeer dikwijls eerst door eene kwalijk behandelde koorts ontstonden, en naderhand de voortdurende oorzaken worden van ongeneesbare koortsen, meest-

meestal met den derdendaagfche *typhus*, maken altijd de voorzegging zeer ongunstig, de meeste lijders bezwijken in deze gevallen door langdurige fleepende ziekten, vooral ongeneesbare waterzucht.

- 5°. De toevallen welke met eene tufchenpoozende koorts gepaard gaan, zijn gewone, of buitengewone. De eerfte, als koude, hette, zweet met de daarbij plaatshebbende veranderingen in den omloop des bloeds, het fpijskanaal, de pisaffcheiding en de andere affcheidingen en verrigtingen, welke men bij ieder koortsaanval, ook de goedaardigfte niet uitgezonderd, zijn alleen voor de kennis der ziekte, die zij kenfchetfen, belangrijk; voor de voorzegging kunnen zij het niet zijn, uithoofde van hunne algemeenheid. De buitengewone toevallen daarentegen, wijzen fteeds een zwaarder lijden van enkele deelen en werktuigen, of van geheele ftelfels, en een meer dan gewoon gevaar aan, dat verfchillend is, naar mate van de belangrijkheid der aangedane deelen. Toevallen, welke het lijden des zenuwgefels te kennen geven, ijlhoodfdigheid, flaapzucht, be-roerte, ftuip trekkingen, flauwten enz., geven fteeds een zeer dringend gevaar te kennen. Insgelijks ook die toevallen, welke eene groote werkeloosheid in het vaatftelfel, opgelostheid van het bloed, en eene ziekelijke menging van het bloed aanwijzen. Overigens zijn alle die toevallen wel-

welke in de aanhoudende koortfen eenen gunstige of ongunstigen uitgang voorspellen, ook hier van toepassing; om niet te herhalen, wijze ik tot dat gedeelte van dit werk terug.

6. De jaargetijden en weersgesteldheden, waarin de tusfschenpoozende koortfen heerschen, zijn voor de voorzegging, verstandig en uit onderzinding toegepast, belangrijk genoeg, om hier aangehaald te worden. In tijden waarin de seizoenen hunnen gewonen en regelmatigigen loop volgen, en het weder daaraan geëventredigt is, zijn deze koortfen het goedaardigste en het gemakkelijkst om te genezen. Vele der hardnekkigsten, welke van het vorige jaar overig bleven, en alle geneesmiddelen wederstonden, genezen nu van zelve, wanneer de alles met nieuw leven bezielende lente door het aardrijk verkwikt.

In den zomer wanneer het weer onbestendig is, zijn de chronische koortfen genegen, eene andere gedaante aan te nemen en te verslimmen. De enkel voorkomende, genezen even ligt als in het voorjaar, wanneer de weersgesteldheid noch overmatig heet, noch koud is. Bij groote hitte nemen zij een gal- of rotachtig karakter, bij koud veranderlijk weder, den slependen gang der najaars-koortfen aan.

De najaars-koortfen zijn steeds langdurig, hardnekkig en meer tot het kwaadaardige genegen, als de voorjaar-koortfen. Maar het mees-

te komt daarbij op de weersgesteldheid aan; koud veranderlijk weder, met veel regen in het voorjaar, verslimmert de geaardheid der dan heerschende tusfchenpoozende koortfen; zachte, matig warme luchtsgesteldheid en droogte in het najaar, doet ze even goedaardig worden als zij anders in het voorjaar zijn. Eenige malen heb ik gelegenheid gehad, mij te overtuigen, dat de gunstige zich reeds verbeterende luchtsgesteldheid en warmte maat in het voorjaar; de ongunstige zich steeds verslimmerende in het najaar; de oorzaken waren, van het verschil dat tusfchen de voor- en najaars-koortfen waargenomen wordt. Eene weersgesteldheid in het voorjaar, die met het gewone najaars weder overeenstemt, maakt dezelve even hardnekkig als anders in het najaar zijn. En omgekeerd, bij eene gunstige, met het voorjaar overeenstemmende weersgesteldheid in het laatste van September en October, nadat bij ongunstig weder, de najaars koortfen in Augustus en September begonnen waren, veranderde het hardnekkige en kwaadaardige karakter, in een even goedaardig, als anders in het voorjaar het meeste voorkomt.

In den winter zijn de tusfchenpoozende koortfen zeldzaam, grootendeels overblijvers van het najaar, die den derdendaagfchen *typus* houden; zij blijven tot dat het weder in de lente zachter wordt, aanhouden, en genezen dan gemakkelijk.

lijk. De najaar's Epidemien houden op wanneer de winterkoude begint.

70. De heerschende Epidemische gesteldheid oefent op de tusfchenpoozende koortfen even zeer haren invloed, en wijzigt haar karakter, als zij het bij andere ziekten doet, en geeft regelen voor de voorzegging, volgens hare goed- of kwaadaardigheid. Als de ontstekingsaardige gesteldheid de heerschende is, neemt zij ook dit karakter aan, zoo ook bij de gastrifche het zenuw- en rotachtige. Volgens de grootere of geringere gevaarlijkheid die aan deze geaardheden eigen is, is dan ook de voorzegging gunstig, ongunstig, gevaarlijk of doodelijk. Zij is het gunstigste bij de ontsteking-aardige het gevaarlijkst bij de rot- en zenuwachtige. En vordert van de zijde des geneesheers, in tijden waarin de laatstgenoemde gesteldheden de heerschende zijn, dat hij fteeds op den mogelijken overgang en volkomene ontwikkeling dezer gesteldheden verdacht zij.

80. Tusfchenpoozende koortfen, die reeds lang geduurd hebben, vooral als zij door eene doelmatige geneeswijze niet konden bedwongen worden, geven te kennen, dat zij hardnekkig zijn, uit hoofde dat de voortbrengende oorzaken nog altijd aanwezig zijn; dikwijls moeten deze gezocht worden in de Epidemische en Endemische gesteldheden van den woonplaats des lijders, en er blijft voor hem niets overig,
om

om zijne gezondheid te herkrijgen, als van woonplaats te veranderen. Menigwerf echter zijn de oorzaken in de bewerktuiging zelve gegrond; verstopping der ingewanden, en andere miskende werktuigelijke ziekten, onderhouden dezelve, en doen iedere poging ter genezing vruchteloos afloopen. Wederkeerig hebben langdurige koortsen eenen zeer nadeligen invloed op de bewerktuiging, en worden de oorzaken van andere slepende naziekten. Onder deze zijn de meest gewone:

a. Zwellingen der buiks-ingewanden vooral van de lever en milt, die men in de lijken aan langdurige koortsen overleden, niet zelden zoo groot vind, dat zij de geheele bovenbuikstreek innemen, zich naar boven en beneden uitstrekken, en alle ingewanden uit hare natuurlijke plaatsing verdringen.

b. Geelzucht. De opgezwollene lever is met vochten opgevuld, en de galafscheiding wijkt verre van haren gezonden toestand af, waarvan de geelzucht als eene veranderde afscheiding in de huid het gevolg is. Meeren-deels gaan de genoemde zwellingen vooraf, en zijn de oorzaken, der zich later ontwikkelende geelzucht. Zij is gewoonlijk zeer hardnekkig en word door ander werktuigelijke gebreken in de lever gevolgd, die met den dood eindigen, ook dan nog, wanneer de koortsen ophouden, of reeds eenigen tijd opgehouden hebben. In de

jaren 1806 en 1807, heerschte eene vrij kwaadaardige tusfchenpoozende koorts Epidemie, onder de militairen in *Zeeland* en de Hollandsche Eilanden. Weinige lijdens herstelden volkomen, de meeste vervielen na herhaalde instortingen in langdurigen buikloop en geelzucht, vermagerden en stierven eerst, wanneer zij tot levende geraamten uitgeteerd waren. Bij alle overledenen, waarvan ik de lijken opende, en dit getal was zeer groot, vond men gebreken in de bewerktuiging der lever en milt. Verhardingen, etterzakken, ledige, of met eene taaije dikke naar stroop gelijkende gal gevulde galblaas. Bij de meeste was de lever en milt eens zoo groot en zwaar, als zij hadden behooren te zijn. Water in het hartzakje, vleesachtige aangroeizels in zijne holligheden waren zeer gewoon, bij twee van hun was het hartzakje met het grootste gedeelte der oppervlakte van het hart, door tusfchenvliezen vast gegroeit.

- c. Tering. Lieden die eenen natuurlijken aanleg voor deze ziekte hebben, ziet men niet zelden na eene voorafgegane tusfchenpoozende koorts wegwijnen, die zich gedurende dezelfde, wat de borsttoevallen betreft, tamelijk wel, en beter als te voren bevonden. Te vreezen is deze uitgang, wanneer de lijdens zeer verzwakken, te veel met ontlastmiddelen behandeld, en het tijdig gebruik der kina verzuimd wordt. Maar vooral dan, wanneer met de

de afnemende koorstoevallen, die der borst-ziekte zich duidelijker ontwikkelen.

- d. Waterzucht. Deze is eene der gewoonlijkste slepende naziekte, welke haren oorsprong uit de langdurige tusfchenpoozende koortfen ontleenen. De ziekelijke gesteldheid der ingewanden, de algemeene en plaatselijke zwakte der vaste deelen, vooral van het vaatftelzel, een te lang uitgesteld gebruik der kina, en van andere verfterkende koortsverdrijvende hulpmiddelen, het gebruik van rottekruid, dat men tot het verdrijven der koortfen federt eenige jaren, zoo onvoorzigtig en ruimschoots aanbeval en misbruikt heeft, zijn hare meest gewone oorzaken. En overal waar de eene of andere deze oorzaken aanwezig of voorafgegaan is, heeft men dezen uitgang te vreezen.
- e. Schurftaardige huidziekten, behooren almede tot de gewone uitgangen, van langdurige koortfen. Meerendeels houdt de koorts op, als de uitflag te voorschijn komt, en de koorts keert terug, als dezelve door kwik- en gewone fchurftzalf verdreven wordt. Uit dit oogpunt beschouwd, zijn huidziekten voor de voorzegging van groot belang.
- 9°. De voorafgegane behandeling, is voor de voorzegging niet zonder aanbelang, eene aan zich zelve overgelatene tusfchenpoozende koorts, die nog niet zeer lang geduurd heeft, is doorgaands gemakkelijker te genezen, wanneer zij doelmatig be-

wordt, als anderen, waartegen reeds veler-
 lijke hulpmiddelen beproefd zijn. Ondoelmatig
 behandelde koortsen, worden meestal langdu-
 rig en dikwijls gevaarlijk, wanneer zij ook
 oorspronkelijk tot de goedaardige behoorden.
 De kwaadaardige worden bijna altijd doodelijk,
 wanneer niet reeds met den tweeden aanval,
 de *Kina*, *Opium* en andere gepaste middelen
 gebezigd worden. De ontstekingsachtigen nemen
 eene aanhoudende gedaante aan, wanneer men
 haar met versterkende en prikkelende genees-
 middelen behandelt. De *asthenische* worden
 kwaadaardig en langdurig, door eene verzwak-
 kende geneeswijze.

10. De bijzondere *individuele* gesteldheden der lij-
 ders, wijzigt niet alleen het karakter der
 koorts, maar hebben ook op hare langere of
 kortere duur, hare goed- of kwaadaardigheid,
 eenen zeer gewigtigen invloed. Voor zwakke
 ziekelijke gestellen, bovenal voor hun, welke
 aan kwaadsappigheden laboreren, zijn de tus-
 schenpoozende koortsen altijd gevaarlijker,
 als voor andere gezonde en robuste gestellen;
 grijsaards sneven niet zelden in de koortskoude,
 bij zwangeren zijn de koortsen langduriger als bij
 anderen, moeilijk om te genezen, en hebben
 miskramen ten gevolge. Vooral bij de eerste
 nemen zij ligtelijk eene slepende geaardheid
 aan, en gaan in naziekten over. Ook kunnen
 de bijzondere ziekelijke gesteldheden, en hare
 oor-

voorzaken, met de koorts zoo naauw verbonden zijn en in een smelten, dat deze eerst moeten weggenomen worden, alvorens zich de koorts genezen laat. Of de koorts blijft van zelfs weg, zoo ras die bijzondere ziekelijke gesteldheid opgeruimd is; zoo zag men b. v. *venerische* lijders, door tusfchenpoozende koortfen in den loop dezer ziekte aangetast, waar de koorts eerst weg bleef, nadat de *venerische* ziekte genezen was.

Lieden die aanhoudende en tusfchenpoozende koortfen, kortelings doorgestaan hebben, zijn in tijden waarin de laatste Epidemiesch heerschen, nog gedurende eenen geruimen tijd aan derzelver terugkeer onderworpen, en zij kunnen eerst dan gezegd worden, volkomen genezen te zijn, als de tijdperken waarin de meeste instortingen plaats vinden, voorbij zijn. Wederkeerende tusfchenpoozende koortfen, die met eene voorafgegane koorts in een zeker verband staan, of als zoodanig te beschouwen zijn, om dat de *individuele* gesteldheid des lijders, na de voorafgegane koorts, zoodanig gebleven is, dat zij de terugkeer bevordert, noemt men instortingen (*recidivæ*). Men onderscheid ze in ware, volkomene, (*recidiva perfecta*) en valsche, onvolkomene (*recidiva imperfecta.*) onder de eerste verstaat men die, welke naar eene kortere of langere volkomene koortsvrije tusfchentijd weder

keeren. Onder de laatste die gene, waar de lijder nog steeds op de koortsdagen, zich meer of minder kwalijk bevonden heeft, de koorts niet volkomen genezen, maar alleen onderdrukt geweest is. Meerendeels volgen de instortingen in hare aanvallen, eene zekere regelmatigheid in het getal der dagen waarop zij terugkeeren. De daagsche en derdendaagsche komen na verloop van 14 dagen, en wel op denzelfden dag en hetzelfde uur terug, waarop de koorts-aanval zoude gekomen zijn, indien de voorafgegane koorts onafgebroken voortgeduurd had. De anderendaagsche komt met die zelfde regelmatigheid na verloop van zeven dagen terug. Ook hebben de instortingen het eigendommelijke, dat zij juist zoo vele aanvallen maken, als de voorafgegane koorts gehad geheel heeft, en dat men voor den afloop van dat getal, weinig door genees- en hulpmiddelen tegen dezelve vermag. Het meeste heeft men de instortingen te vreezen, als de lijders te vroeg het gebruik der *Kina* nagelaten hebben, en vooral ook wanneer de koorts zeer spoedig door groote giften van dat middel is onderdrukt geworden. Bij lieden die eene slechte leefregel houden, aan den invloed van het gure jaargetij en ongunstige weersgesteldheden blootgestaan hebben, die zware vermoeijenssen en zielsaandoeningen, onmiddelijk of kort na het uitblijven der koorts ondergingen, na bijslaap en zelfs-

zelfs-besmetting, bij jongelingen zag ik de instortingen als een gevolg daarvan, dikwijls en bij herhaling plaats grijpen. Overigens zijn de instortingen gemeenzamer in het najaar, als in de andere jaargetijden. Lijders die kwaadaardige tusschenpoozende koortsen doorgestaan hebben, welke men door eene zeer werkdadige geneeswijze met groote giften *kina* onderdrukt heeft, herstelden zelden volkomen, maar worden op de gewone tijden der instortingen, op nieuw door eene tusschenpoozende koorts aangetast, die gewoonlijk zeer goedaardig is, en als zoodanig moet behandeld worden, met deszelfs afloop keert de gezondheid volkomen en duurzaam terug.

De geneeskundige behandeling der tusschenpoozende koortsen, komt in vele betrekkingen met die der aanhoudende overeen, maar wijkt ook in zoo vele wezenlijke zaken van haar af, dat de ontwikkeling der wijze, hoe zij moeten behandeld worden, in hare geheele uitgebreidheid onvermijdelijk noodzakelijk is, met terugwijzing tot dat gene, wat meer in het algemeen over de behandeling der koortsen, en bijzonder der aanhoudende, met een bepaald karakter gezegd is, om herhalingen te vermijden, voor zoo verre zij hier kunnen vermeden worden.

De aanwijzingen waar aan bij eene verstandige behandeling der tusschenpoozende koortsen moet voldaan worden, zijn verschillend, naar de bijzondere geaardheid, de goed- of kwaadaardigheid, de oorza-

ken, de toevallen, de *tijpus*, de samenstelling met andere ziekten &c., gewijzigd uit het eigendommelijke der tusfchenpoozende koortfen, waardoor zij zich van alle andere ziektevormen onderscheiden, namentlijk: dat zij uit twee tijdperken, dat van den aanval (*paroxysmus*) en dat der koortsvrije tusfchentijd (*intermissio*.) zamengefteld zijn; ontleend zich de bepaling voor de aanwijzing in het algemeen, en verdeelt de behandeling:

- 1o. In die van den aanval, die zich niet verder als deszelfs duur uitftrekt, en ten doel heeft, om hem te matigen en te lenigen.
- 2o. De behandeling buiten den aanval, die de genezing der koorts zich ten doel ftelt.

1o. *Behandeling van den aanval.*

Alles wat de Geneesheer gedurende den aanval toen kan, is om den toestand des lijders te verzachten daar hij eenmaal ontwikkeld zijnde, in het geheel niet, of alleen tot groot nadeel kan onderdrukt worden. In de eenvoudige goedaardige tusfchepoozende koorts, waar de aanval niet zeer hevig is, en regelmatig afloopt, doet men gewoonlijk beter, niets dan eene werkdadige hulpaanbieding te bezigen, die den toestand des lijders meer verflimmert dan verbeterd. Hoe eenvoudiger men te werk gaat, zoo veel te beter. In landen waarin deze koortfen land-eigen zijn, vraagt de lijder zelden eenige geneeskundige hulp tegen den aanval, en de Geneesheeren zijn gewoon, alles aan de natuur alleen over te laten. In landen daarentegen, waarin dezelve tot de zeldzaamste

fte

ste voorkomende ziekten behooren, vraagt de lijder zeer dringend om de hulp van een Geneesheer, en de ze is gewoon, den aanval op eene meer stellige en bijzondere wijze te behandelen.

In de kwaadaardige tusfschenpoozende koortsen, is de behandeling van den aanval van meer belang, en vordert niet zelden eene bijzondere wijziging, waarvan nader zal gesproken worden.

Tot algemeene regelen, die bijzonder voor jonge eerst beginnende kunst-oefenaren belangrijk genoeg zijn, om hier eene plaats te verdienen, behooren: dat zich de lijder kort voor den aanval, van spijs en drank onthoude, vooral zijn zware, niet ligt verteerbare en vette spijsen prikkelende en verhittende dranken nadelig, zij verzwaren den aanval, en maken hem langduriger. De maag met spijs en drank opgevuld, maakt de ademhaling moeilijk, en verwekt benaauwdheden, misfelijkheid, walging; hevige tot in de koortsvrije tusfschentijden aanhoudende braken, zijn daarvan gewone, en zelden achterweeg blijvende gevolgen.

Men late den koortsaanval in het bed afwachten, komt hij des morgens, dan moet de lijder in het geheel niet opstaan, maar deszelfs afloop in het bed afwachten. Komt hij op eenen anderen tijd van den dag, dan moet zich de zieke ten minsten een uur voor den aanval naar bed begeven, het is goed dat men het bed eerst laat warmen, vooral bij koud en guur weder. Zonder deze voorzorgen wordt de koortskoude vervroegd, en heviger als zij anders

de geweest zijn. Is de lijder dorstig, dan geve men gewoone thee, een aftreksel van vlier en chamilbloemen, of alleen water met melk, laauw warm te drinken.

De beginnende koortskoude verbeelde men zich niet, door kunstwarmte te kunnen verdrijven, daar alle pogingen die men tot dat einde zoude aanwenden, den toestand des lijders verslimmeren, en de daarop volgende hette vermeederen. Want het gevoel der koortskoude is een zenuw-toeval, dat door kunstwarmte alleen niet weg te nemen is. Intusfchen late men den lijder, indien hij zich nog buiten het bed bevinden mogt, terstond in een matig verwarmd bed ter rust begeven, verwarmd met drooge doeken, zakken met warm zand gevuld, of warme flesfchen, de voeten en de overige het zwaartst door de koude aangedane deelen; dekke hem behoorlijk doch niet overmatig met wollene dekens. Ook moet het zieken vertrek des winters matig gestookt worden. Men geve warme dranken. dikwijls en in kleine hoeveelheden te drinken, thee en de gewone aftreksels van kruiden, limonade of andere zuurachtige dranken, vooral bij *sthenische* of ontstekingsaardige en galachtige gesteldheden. Bij zeer zwakken, en waar de koorts een meer ontwikkeld *asthenisch* karakter heeft, water met wijn en kaneel, thee met een weinig rum, arak of brandewijn, aftreksels van pepermunt, melisse, orangebladen enz. Aan enkel waterachtige dranken, laauw warm toegediend, geve ik steeds de voorkeur, intusfchen kunnen de genoemde wijnachtige

tige en prikkelende , in bijzondere gevallen nodig en van groot nut iijn. Zoo ras als de koude nalaat , en de hette begint , steld men de prikkelende verhitte dranken ter zijde. Gaat de koude met hevige pijnen en kramp gepaard , dan zijn kleine giften heulfap met de braakwortel verbonden , in het begin of kort voor den aanval gegeven , zeer krachtig om dezelve tegen te gaan en te bedaren. Brakingen welke een gevolg zijn van overmatig spijsgebruik , kort voor den aanval , of van andere *gastrische* ophoopingten , bevordere men door veel drinken van waterachtige warme dranken met zee-ajuin en azijnhoning. Maar men wachte zich wel , brakingen , die een gevolg zijn van eene al te groote aandoenlijkheid en kramp in de maag , uit ophoopingten afte leiden , en als zoodanig te behandelen , eene fout die den lijder op den rand van het graf brengen zoude. Kleine giften *opium* , eenige druppels *liquor anodini* , twee tot vier druppels *oleum cajaputi* , het drankje van *Riverius* , uit loogzout met citroenzuur , gedurende het opbruischen gegeven , komen alsdan te pas , zoowel om het braken te doen bedaren , als ook om gelijk LIND en andere Geneesheeren zeggen , de koude te verkorten , en het zweet spoediger op de hette te doen volgen.

Zoo ras als de koude bedaart en de hette begint , dan kan men aan den lijder toestaan zich eenigermate luchtiger te houden. Men vermindere het dekfel , verversche de lucht en verkoele dezelve een weinig , echter moet dit alles met de noodige omzigtigheid ge-

geschieden, en niet overdreven worden, daar al te koel te houden de koortskoude kan doen wederkeeren, en het zweeten vertraagt en belemmert. De meeste lijders verkiezen hunnen drank, gedurende de hette, koud, en geven aan zuurachtige dranken de voorkeur. Als de borst vrij is en geene ontstekingtoevallen aanwezig zijn, kan men dezelve aan de keuze der lijders overlaten, doch ijskoud moeten zij niet zijn. Limonade of andere zuurachtige dranken met planten en minerale zuren bereid, behalven in gevallen met aandoeningen der borst gepaard, waar zij slijmachtig en verzachtende zijn moeten, late men naar welgevallen drinken. Als de hette zeer zwaar is, lang aanhoud, en er iets ontstekingaardigs mede gepaard gaat, kan men ingeval van nood eene matige aderlating doen, en een mengfel uit de salpeter en oxymel toedienen. Zelden zullen intusfchen de gevallen zijn, waarin eene zoo werkdadige behandeling in het tijdperk der hette te pasfe komt.

Bij zeer zware hoofdpijn en ijlhoofdigheid, zijn mostaard pappen en zuurdeeg aan de voeten en kuitén aangewezen. Benaauwdheden met opspanningen van den buik, en verstopte buik-ontlasting, vorderen laxerende klijsteren; de daarop volgende ontlastingen, brengen deze toevallen tot bedaren.

Het zweet dat op de hette volgt, moet de lijder rustig in het bed afwachten, matig gedekt, iedere plotselinge verkoeling vermijdende. De koude dranken zijn met warme te verwisfelen, gewone thée, aftreksels van vlier of chamomille bloemen, zijn dan
doel-

doelmatig. Zelden zal het noodig zijn het zweet door eene bijzondere behandeling te bevorderen; volgt het in het geheel niet of in geene toereikende hoeveelheid op de hette, zoo kunnen die middelen, welke meermalen tot dat einde aanbevolen zijn, met voordeel gebezigt worden, als warme baden, warme dranken, met een weinig wijn en kruiderijen, flappe punch, thee met rum of arak, een mengfel met *spiritus Mindereri*, kamfer in kleine giften, of eene gift *pulvis Doveri*.

Die gevallen waarin het zweet overmatig wordt, komen veel menigvuldiger voor, als die, waarin het te gering is. Een al te ruim zweet put de krachten uit, en geeft aan de koorts een kwaadaardig karakter. In de derdendaagfche koortfen, die reeds lang geduurd hebben, is dit toeval een gewoon verschijnsel, dat tegengegaan en in bedwang moet gehouden worden; tot dat einde houde men den lijder in de koortshette ligt gedekt, geve, gedurende het zweeten, de dranken meer koud als warm, met bijvoeging der minerale zuren; een aftrekfel van falie met het zuur van HALLER, verdient boven alle andere de voorkeur, een middel dat in deze gevallen nimmer mijne verwachtingen te leur ftelde. De onaangename fmaak der falie aan de meeste lijders tegenftaande, laat niet toe, haar aftrekfel tot gewonen drank te bezigen, men moet het dierhalve meer als geneesmiddel befchouwen en toedienen.

Na den afloop van het zweet. wordt de lijder met warme doeken afgewreven, en fchoon linnen wel
uit-

uitgewazemd en warm aangetrokken; indien het zijne omstandigheden toelaten, dan is het goed dat hij zich in een ander wel gewarmd bed ter rust begeeft en den slaap afwacht. Hoe ongestoorder en geregelder het zweet afloopt, zoo veel te volkomener is de daarop volgende koortsvrije tusschentijd; niet behoorlijk afgewacht of belemmert, maakt het de tusschenpoozing onvolkomen, vervroegd en verzwaart den volgenden aanval.

Het eigenaardige der tusschenpoozende koortsen, zoowel ten aanzien der tijdperken, die den aanval zamenstellen, als de regelmatige volgreeds, waarin zij plaats hebben, dat grootendeels in de bijzondere wijziging van het zenuwstelsel gegrond is, heeft van de vroegste tijden af aan een ruim veld geopend, om middelen te beproeven, welke door eene plotselinge en hevige werking op dit stelsel, ten zij als ziels- of ligchamelijks prikkels, onmiddelijk voor den aanval toegediend, dezen moesten onderdrukken. Een gewenscht gevolg heeft niet zelden bewezen, dat zij door eene andere wijziging in de wederwerking van dat stelsel voort te brengen, ook wezenlijk dit vermogen te bezitten, hoe verkeerd en ondoelmatig zij ook schenen te zijn. Echter zijn de genomene proeven geenszins van dien aard, hetzij de gebezigde middelen op eene materiele of immateriele wijze werkzaam zijn, dat zij algemeene aanprijzing zouden verdienen of onschadelijk mogen geacht worden. Bovendien bewijzen ook dezelfde ervaringen dat zij alleen tegen ligte goedaardige koortsen helpen,

pen, dewijl zij daarentegen bij kwaadaardige met stoffelijke oorzaken en werktuigelijke gebreken, niets vermogen, haar gebruik hoogst nadeelig is, en zelfs doodelijk worden kan.

Onder de middelen, welke tot dat soort behooren, zijn buiten twijfel diegene, wier werking zich alleen zielkundig, door eene sterk opgewekte verbeelding laat verklaren, de minst schadelijke; onder den gemeenen man; zijn zij het meeste in gebruik, het werkzaamst bij eene tot het wonderbare neigende zielsgesteldheid. Het aflezen van de koorts, het be-
tooveren van dezelve, het begraven, het dragen van amuletten, enz. zijn de meest gewone.

Geheel anders is het daarentegen met die middelen gelegen, welke door geneeskundigen aangeraden worden, en op eene zeer hevige wijze het ligchaam aan doen; zij schaden, waar zij niet helpen. De meeste geraakten dan ook even spoedig in vergetelheid, als zij eerst opgang gemaakt hadden. Zoolang de geneeskunst in het bezit blijft van middelen, vermogen-
de genoeg, om, op eenen zekeren en onschadelijken weg de koortsen te genezen, behoort men daaraan geen bijval te geven, en noch minder ter navolging aan te prijzen. In eenige weinige gevallen, namen-
lijk waar reeds alle andere middelen vruchteloos gebruikt werden, en de langdurigheid der koorts alleen in eene bijzonder wijziging der zenuw-werkdadigheid haren grond heeft, en waar, gelijk RICHTER zegt: „Eene koude koorts, bij overigens volkomenen
„koorts-

„koortsvrije tusfchentijd, zoo kwaadaardig wordt,
 „dat met de grootfte waarfchijnlijkheid, de dood,
 „met den eerftvolgenden aanval te verwachten is.
 „Dan zoude het wel geoorloofd zijn, deze gewel-
 „dadig werkende geneesmiddelen toe te dienen, ten
 „gevolge van de zoo juiste praktifche grondstel-
 „ling, bij dringend gevaar beter een onzeker middel
 „toe te dienen, als in het geheel niets te doen.”

De middelen, welke tot deze foort behooren, zijn warme en koude baden, waarin de lijder plotfeling en onmiddelijk bij de eerfte voorboden van den aanval gedompeld, en eenigen tijd gehouden wordt. Groote giften van wijn, brandewijn met of zonder kruiderijen, een glas brandewijn met eene goede dofis peper is vooral onder de Westphaalfche baggerlieden, als zij hier te lande door koude koortfen aangetast worden, vrij algemeen in gebruik, vele worden onbetwisbaar er door van hunne koorts bevrijd, maar vele heb ik ook gezien, waarbij deze kuur eene aanhoudende koorts ten gevolge had.

Groote giften van *opium* of andere narkotifche middelen; een fterkwerkend braakmiddel, eenige minuten voor den aanval gegeven; fterke ligchaamsbewegingen, doorgaans de koortsaflopen genoemd, gedurende den geheelen aanval volgehouden; behoren ook tot deze gewaagde geneeswijze.

Het aanleggen van *tournikets* op de groote flagaderen, en het binden der ledematen, eene plotfelinge en zware fchrik, enz.

2°. *Aanwijzing. Behandeling buiten den aanval.*

Het

Het doel dat men door de geneeskundige behandeling buiten den aanval te bereiken tracht, is de genezing van de koorts zelve. De wegen welke men tot dat einde inlaat zijn verschillende, naar de oorzaken die de koorts voortbragten, naar de bijzondere geaardheid die zij aangenomen heeft, volgens den *typus*, de toevallen, de met haar gepaarde ziekelijke gesteldheden en ziekten, naar het tijdperk waarin zich den lijder bevindt, en de meer of mindere terug blijvende voorgeschiedtheid tot instortingen; dienvolgens kan men nu de navolgende aanwijzingen vaststellen:

- 1.º Men spore de toevallige oorzaken op, om ze op de eenvoudigste en spoedigste wijze te verwijderen.
- 2.º Men behandle de koorts volgens hare bijzondere geaardheid, en de bijzondere, met haar verbondene ziekten.
- 3.º Men bestrijde de koorts door specifieke middelen, welke, het zij door de naaste oorzaak te vernietigen, het zij op eene andere, doch altijd eigenaardige wijze, de koorts genezen.
- 4.º Men wijzige de behandeling volgens den *typus*.
- 5.º Behandeling der zamengestelde tuschenpoozende koortsen.
6. Behandeling der genezende, en afwering der instortingen.

1.º *Aanwijzing.* Men spore de toevallige oorzaken op, om ze op de eenvoudigste en spoedigste wijze te verwijderen.

Alles wat ten opzichte van deze aanwijzing, bij de aanhoudende koortsen gezegd is, vindt met weinige uitzonderingen en wijzigingen ook hier plaats en toepassing.

De toevallige oorzaken der tusschenpoozende koortsen, zijn dikwijls zeer spoedig voorbijgaande schadelijkheden, en hare inwerking zoo kortstondig, dat het eene zeer moeilijke zaak blijft, daarvan eene verklaring te geven, namenlijk: hoe zij menigwerf zulke langdurige en hardnekkige ziekten kunnen voortbrengen, waarbij het tusschenpoozende der aanvallen de zaak nog moeilijker maakt. Ten anderen zijn de toevallige en verwijderde oorzaken, voortdurend en buiten het bereik des Geneesheers; bij de Epidemische en Endemische gesteldheden heeft dit voornamelijk plaats, den grond die de lijder bewoont, de lucht die hij inademt, de natuurlijke gesteldheid des lands, de gewone en met den landstreek overeenkomstige voedsels, de wijze zich te kleeden, de woningen, de bezigheden van het grootste deel der bevolking en wat dies meer is, zijn altemaal schadelijkheden, die de Geneesheer ook bij hare grondigste kennis, niet in zijne magt heeft, om ze weg te nemen of onschadelijk te maken. Wijders kunnen de toevallige oorzaken volstrekt uitwendige, of inwendige zijn, en nevens de Endemische en Epidemische gesteldheden bijoorzaken aanwezig zijn, waardoor die algemeen werkende schadelijke invloeden, eerst in staat geraken van koortsen te verwekken.

Tegen de spoedig voorbijgaande oorzaken, welke
reeds

reeds opgehouden hebben op de bewerktuiging hare schadelijken invloed te oefenen, geeft het gene bijzondere behandeling, en men kan alleen hare uitwerkfelen bestrijden; wanneer de kunstbehandling volgens het bijzondere karakter, dat de koorts aangenomen heeft, geregeld wordt. Indien het algemeen werkende schadelijkheden zijn, kan men fomwijlen door gepaste voorbehoed middelen derzelver nadelige uitwerkfelen afwenden.

De voortdurende Epidemifche en Endemifche schadelijkheden, kunnen door doelmatige maatregelen van eene goede geneeskundige Politie, wel zelden voor het tegenwoordige oogenblik, maar wel voor het vervolg opgeruimd worden. Zoo zag men in landen, waarin de tufchenpoozende koortfen tot de meest gewone landziekten behoorden, door uitdrooging van moerasfen, door afleiding van ftilstaande wateren, door eene verbeterde levens- en voedingswijze der inwoners, door het uitkappen en dunnen van Boschkadien deze ziekte geheel verdwijnen.

Door de lijders naar eene gezonde landftreek te verplaatfen, en aan de fchadelijke invloeden van het klimaat te onttrekken, kan men doorgaans alleen hunne koortfen genezen. In hardnekkige gevallen is dit laafte het eenigfte middel, hunne gezondheid te herftellen. Dit kan nu wel niet voor eene algemeene maatregel om de toevallige oorzaken weg te nemen befchouwd worden, daar men zich alleen aan hare fchadelijke inwerkingen onttrekt, in zeke-

re gevallen is zij voor den Geneesheer van groot belang, en vinden veelvuldige toepassingen en wijzigingen plaats.

De vraag, of men door voorbehoed middelen, de vatbaarheid voor de schadelijke inyloeden der Endemische en Epidemische gesteldheden geheel of gedeeltelijk kan uitbluschen, is belangrijk genoeg om nader onderzocht, en door naauwkeurige waar- en proefnemingen in een helderder licht gesteld te worden. Het is hier de plaats niet om ons in een breedvoeriger onderzoek in te laten, waar het genoeg is aan te stippen, wat tot dat einde reeds gedaan is, met eenen uitslag, die ten minsten gedeeltelijk aan het voorgestelde doel beantwoord heeft.

Men rade in het algemeen tot het dragen van warme kleeding, vermindering der morgen- en avondlucht, het gebruik van versche, ligt verteerbare spijsen, verbiedende alle gerookte, gezoutene, zeer zware, vette en meelachtige spijsen, met uitzondering der zoodanige, welke goed gaar gebakken, of gekookt, niet klijchtig en taaij zijn. Kaas, Zeevischen en veel zuur, zijn zoo niet volstrekt schadelijk, ten minsten zeer verdacht. Men late dagelijks eenige glazen goeden wijn bij welgestelde lieden; des morgens en avonds eene kleine hoeveelheid brandewijn of genever of bittere kruidachtige zelfstandigheden getrokken, bij minvermogende en aan het gebruik van sterken drank gewone personen, gebruiken. Want het is eene algemeene erkende daadzaak, dat personen aan een matig gebruik van wijn en sterken drank gewoon, zoo lang zij aan deze gewoonte getrouw blijven,

zel-

zelden door tusfchenpoozende koortfen, in tijden van Endemien en Epidemien aangetast worden, echter derzelve onvatbaarheid verliezen, zoo ras zij daarvan afgaan. Met een zeer goed gevolg had men bij de Hollandfche armée het gebruik van eene bittere tinctuur ingevoerd, waarvan dagelijks aan iedere man een of twee maal een ration gegeven werd, gedurende koude koorts Epidemien. Volfrekt uitwendige oorzaken, van eenen bijzonderen aard, als Splinters, eene holle kies, vreemdaardige prikkels enz., moeten terftond op de beste en met hare geaardheid overeenftemmende wijze, weggenomen worden. Dat dit echter niet in den aanval, maar in de koortsvrije tusfchentijd, behoort te gefchieden, behoeft naauwelijks herrinnert te worden.

Inwendige oorzaken moeten insgelijks door gepaste hulpmiddelen weggenomen worden. Teruggedrevene huidziekten, vooral fchurftachtig uitflag, brengt men tot de huid terug. Venerifche en andere fcherpten, worden door foortgelijke middelen behandeld; ophopingen in de eerfte wegen en wormen, door ontlast- en wormmiddelen opgeruimd; werktuigelijke gebreken vooral in de ingewanden, volgens hare bijzondere geaardheid behandeld, en genezen. Twee maal zag ik langdurige koude koortfen, die hardnekkig aan alle hulpmiddelen wederftand boden; en al flaagde men ook al eens met groote giften *Kina*, den aanval te onderdrukken, keerde zij toch telkens terug; tot dat eindelijk eene kromming van den ruggegraat de koorts deed uitblijven, en de gezondheid terugkeeren.

De toevallige bijoorzaken, zijn in het algemeen voor den Geneesheer van groot aanbelang, daar zij hoezeer niet voor zich, maar alleen de Endemische en Epidemische gesteldheden ondersteunende koortsen doen geboren worden, die niet zelden met hare opruiming wegblijven, en aan de genoemde gesteldheden haren schadelijken invloed ontnemen.

De meest voorkomende bijoorzaken zijn :

a. *Fouten in den leefregel.* Bedorvene spijsverteering en ophooping en door het gebruik van zware onverteerbare spijsen en dranken. Die waar zij aanwezig zijn, volgens de bijzondere aanwijzingen voor de ontlastende geneesmiddelen, naar boven, of naar beneden ontledigd worden; dewijl de lijder eene matige en goede leefregel houden moet. Als de stof naar boven *turgesceert* geeft men een behoorlijk werkend braakmiddel, met *Tartarus Emeticus*; *turgesceert* de stof naar beneden, een purgeermiddel met Rhabarber, Senna of midden zouten, naar de bijzondere gesteldheden der ingewanden. Grijpen na de eerste ontlastingen deze ophooping en andermaal plaats, dan zijn zij gewoonlijk meer in de verzwakte en kwijnende verrigtingen van het voedings-kanaal, dan wel in van buiten aangevoerde onverteerbare stoffen te zoeken, en vorderen middelen om deze gesteldheden te verbeteren; als bittere *extracten* en *tincturen*, aftrèkfels van bittere kruiden, b. v. het onder den gemeenen man vrij algemeen in gebruik.

bruik zijnde aftreksel van Alzemknoppen met Chamilbloemen. De leefregel moet uit ligt verteerbare voedfels bestaan, en ook deze, in geene al te groote hoeveelheden gebruikt worden; de lijd der vermijde de morgen- en avondlucht, en alle ligchamelijke en zielsvermoeijingen. Op deze wijze ziet men niet zelden, zonder andere geneesmiddelen nodig te hebben, de koorts uitblijven, en de lijders volkomen herstellen, dewijl anderen, waar men door eene al te werkdadige geneeswijze de koorts onderdrukte, veel meer aan instortingen onderhevig zijn, die in hardnekkige derdendaagsche koortsen, en niet zelden in slepende naziekten ontaarden. Hoe bij een meer ontwikkeld koortskarakter, waar deze geneeswijze niet toereikende is, moet gehandeld worden, zal bij de behandeling der volgende aanwijzingen gezegd worden.

b. Verkoudheden. Deze behoren zeker tot die bijoorzaken, welke in de Endemische en Epidemische gesteldheden het meeste voorkomen. Bij iedere Epidemie zal men gelegenheid genoeg vinden om zich te overtuigen, dat steeds die personen het eerst en menigvuldigst aangetast worden, welke aan schadelijke invloeden blootgestaan hebben, die de huid-uitwasemingen belemmeren of in wanorder brengen. Zoo zag ik onder het militaire, bij Epidemien in *Overysfel Noordholland* en *Zeeland*, dat de meeste Soldaten op de wachten, en zelfs op de posten,

door de koorts aangetast werden, ook ontstonden de meeste instortingen op die dagen, waarop de herstelden hunne eerste wacht deden. In de steden is de geringste volksklasse, op de dorpen het dienstbare gedeelte, en het jonge boeren volk, dat zich bij het melken, des morgens en avonds aan het vatten van koude moet blootstellen, het spoedigst aangegrepen.

Bij de geneeskundige behandeling, moet hier vooral daarop gezien worden, dat zich de lijdens warm kleeden, de morgen- en avondlucht, alsmede alle weersveranderingen volstrekt vermijden. Gedurende den aanval moeten zij het zweet wel afwachten, en door vlijtig drinken van vlierthee, of andere zacht op de huid werkende dranken bevorderen, in het bed blijven tot dat het zweet geheel opgehouden heeft. Na den afloop der drie of vier eerste aanvallen, is het zaak met deze behandeling optehouden, want de goedaardige koorts laat dan reeds na, bij die welke langer duren, wordt het zweet ligt overmatig, en put de krachten uit, en zij vorderen eene meer krachtige koortsverdrijven-zich vrij te waren.

Aan nog gezonde personen rade men dan dezelfde voorzorgen, door warme kleeding, vermijding van plotselinge weersveranderingen en warmte maat, en onderhouding der uitwaseming zich vrij te waren.

Gemoedsaandoeningen. Ook deze, vooral schrik, ver-

verdriet, toorn, kommer, vrees enz., kunnen als bij oorzaken tot de ontwikkeling van Epidemisch heerschende koortsen bijdragen. Waar zij aanwezig zijn, moet men ze trachten te bedaren en den lijder in eene opgewekte en aangename gemoedsstemming brengen; eene goedaardige koorts kan hierdoor alleen genezen worden, terwijl het bij anderen de voor onmogelijk gehoudene genezing mogelijk maakt, en de schadelijke gemoedsbeweging niet weggenomen wordende de koorts doodelijk doet eindigen.

f. Besmetting. Bij de tusfchenpoozende koortsen die zich door besmetting voortplanten, trachte men door doelmatige voorzorgen, de uitbreiding der besmetting te verhoeden, en door warme kleeding, reinheid, beweging in de opene lucht, ligtverteerbare voedfels, het gebruik van eenige glazen wijn of een glas brandewijn en genever, door onderhouding eener geruste en opgeruimde gemoedsgesteldheid, de vatbaarheid te verminderen en aftewenden. Daar men, waar de besmetting der koorts zich reeds ontwikkeld heeft niets meer tegen dezelve vermag, en de koorts volgens haar aangenomen karakter moet behandeld worden. De gevallen waarin zich de tusfchenpoozende koortsen door besmetting mededeelen zijn hoogst zeldzaam, misfchien bestaat er in het geheel geene smetstof, en is datgene, wat men daaraan toefchreef, een gevolg van andere algemeene werkende fchadelijkheden.

Tweede Aanwijzing. Men behandelc de koorts volgens hare bijzondere geaardheid, en de bijzondere met haar verbondene ziekten.

a. Tusfchenpoozende Ontftekingkoorts. (febris interm. inflammatoria, asthenica synocha).

Bij de geneeskundige behandeling van deze koortsvorm, waartoe wij nu kunnen overgaan, daar het noodige ten aanzien van haaren loop, toevallen en uitgangen, reeds gezegd is (zie pag. 478), komt het voornamelijk daarop aan, om te onderscheiden of de ontftekingaardige gesteldheid in eenen grooten of geringen graad aanwezig is, om daaraan geëvenredigt de antiphlogistische geneeswijze aantewenden.

Meerendeels is de ontftekingstoestand matig, meer met zijnen aanleg, als volkomene ontwikkeling overeenkomende; de weinig te beteekenende ontfteekingstoevallen, de niet zeer harde noch volle pols, de geringe hette en hoofdpijn wijzen dit aan, de antiphlogistische geneeswijze moet dierhalven ook met omzichtigheid en in eene geringere fterkte aangewend worden. Zuurachtige dranken, ligte weinig voedende fpijzen uit het plantenrijk, verkoelende purgeermiddelen uit manna, cassia, tamarinden en middenzouten bij verftopte buiksondasting, vlier en geest van *Minderer* bij belette huiduitwazeming, kleine giften van falpeter in flijmachtige dranken uit falamoniak, braakwijnsteen, en wijnsteen in de gewone giften buiten den aanval, zijn mee-

meerendeels toereikende de ontstekingsachtige gesteldheid weg te nemen, en de koorts met de 3den of 4den aanval te doen uitblijven.

Als de ontstekingsachtige gesteldheid meer ontwikkeld is, en aan de koorts het zuivere ontstekingskarakter heeft, dan moet zij ook als eene zoodanige behandeld worden, de antiphlogistische geneeswijze komt nu in hare geheele uitgebreidheid te pas, doch voornamelijk wanneer plaatselijke ontsteking der ingewanden, congesties naar het hoofd en de borst, of andere uit volbloedigheid voortvloeiende en gevaar dreigende toevallen mede gepaard gaan. Eene aderlating is dan onvermijdelijk noodig, die men herhalen moet, wanneer de ontsteking toevallen aanhouden, of bedoord geweest zijnde, zich andermaal verheffen. De hevigheid der toevallen, de Epidemische en individuele gesteldheden, moeten de hoeveelheid van het weg te laten bloed bepalen en het geheele geneesplan bepalen.

Algemeen stemt het gevoelen der beste Geneesheeren daarin overeen, dat de tusschenpoozende ontsteking koorts, nimmer zoo ruime bloedontlastingen verdraagt, als de aanhoudende. Omtrent den tijd wanneer men de ader moet openen heerscht een aanmerkelijk verschil onder de Geneesheeren, eenige willen men zal kort voor, andere in, en weder anderen na dat de aanval afgelopen is, in den koortsvrije tusschentijd,

tijd, bloed laten. Het veiligst is mijns inziens zich aan geene vaste bepalingen te houden, maar alleen de hevigheid der aanwijzende toevallen in het oog te houden, en dan even onbeschrómd zoowel in, als buiten den aanval de ader te openen; het tijdperk der koude alleen, dat bovendien zeer kortstondig is, en weinig te beteekenen heeft, behoort eene uitzondering te maken.

In en buiten den aanval late men verkoelende zuurachtige dranken, limonade met salpeter, gerstenwater met dit midden zout en oxymel in ruime mate drinken. De buiksontlasting wordt door verkoelende purgeermiddelen en lavementen onderhouden. De leefregel moet insgelijks verkoelend weinig voedend zijn. Vleeschspijzen, wijn en andere verhittende en prikkelende dingen zijn hoogst nadeelig.

Als op deze wijze de ontstekings toestand weg genomen is, blijft de koorts dikwijls achterwegen, doet zij dit niet, dan geven de regelmatig afloopende aanvallen, de volkomene koortsvrije tusschentijd, de weekke zachte pols, de verminderde hette, de matige hoofdpijn, minder hoog gekleurde pis, het nalaten der plaatselijke ontsteekingen, aanwijzende toevallen en pijnen, genoegzaam te kennen, dat de ontsteeking weggenomen, en de antiphlogistische geneeswijze haare grenzen bereikt heeft, de wederkeerende koorts aanvallen moeten na door de gewone koorts-

koortsverdrijvende geneesmiddelen onderdrukt, of volgens het bijzondere karakter dat zij aangenomen hebben, en de samenstelling met andere ziekten en toevallen behandeld en genezen worden.

Vele Geneesheeren zullen dikwijls even als ik in het geval geweest zijn, de aderlating op eene zeer onberedeneerde wijze, tegen tusschenpoozende koortsen te hebben zien aanwenden, in gevallen waarin hoegenaamd aan geene ontsteeking te denken was, en de koortsen reeds lang geduurd hadden; maar, wat mij daarbij vreemd en raadselachtig bleef, was dat zij schijnbaar een zeer gunstig gevolg had, zoodat de koorts aanvallen, die alle mogelijke geneesmiddelen wederstaan hadden, na de aderlating niet meer terug kwamen. Bragt hier de plotfelinge ontleding der vaten, eene wederwerking in de bewerktuiging te weeg, welke die der koorts vernietigde? Had tegen alle waarschijnlijkheid aan, toch eene ontstekingsachtige gesteldheid plaats, die de koorts onderhield? Of had de lating eene gedaantewisseling der koorts ten gevolge, zoodat deze wel achter bleef, maar de lijder even ziek als te voren was? Misschien kunnen alle deze gevallen ieder voor zich plaats hebben, en er de oorzaak van zijn. Maar hoe het ook wezen moge, blijft dusdanig eene handelwijze, die alleen op goed geluk ondernomen wordt, verwerpelijk, waartegen men waarschouwen, en ieder jong geneesheer zich wagten moet.

b. Tus-

b. Tusschenpoozende zenuwkoorts. (*febris interm. nervosa*). pag. 481.

Dit bij de tusschenpoozende koortsen het meest voorkomend karakter, geeft zich door gewoon en buitengewone toevallen die reeds breeder zijn opgegeven, te kennen. Den eer of mindere hooge graad, de zuiverheid, of samenstelling met andere geaardheden en toevallen, vorderen dezelfde behandeling en wijzigingen, welke bij de aanhoudende zenuwkoorts, in de wijze, hoe zij moet behandeld worden zijn opgegeven.

Als algemeene regelen laten zich nog vaststellen, dat men alle ontlastende en verzwakkende geneesmiddelen nimmer buiten volstrekte noodzakelijkheid bezige; dat men, indien zij met eene gastrische ophopingen gepaard gaat, deze, in den beginne der ziekte door een braakmiddel ontlaste, purgeermiddelen zijn doorgaans schadelijk, om dat zij te veel verzwakken, het is beter de buiksontlasting door lavementen in den gang te houden.

Gedurende den aanval die gewoonlijk met benaauwdheden en andere zenuwtoevallen gepaard is, geve men meer prikkelende en opwekkende als verkoelende dranken, water of limonade met wijn, thee met rum of brandewijn, slappe punch met weinig zuur bereid, zijn de zenuwtoevallen hevig dan trachte men ze door zenuwmiddelen vereenigt met kleine giften opium of hyosciamus extract te bedaren.

N^o. 1.R_p *Tinct: Castor.**Liq. anod. m. h. a. dr. i. ß.**Aquae melisf. unc. vi.**Syr: diacod. unc. i.*

D. S.

om het half uur een
lepel vol.N^o. 2.R_p *Liq. urn. dr. un.**Aether. Vitriol. dr. ii.**Aquae menth. unc. vii.**Syr: diacod. unc. i.*

D. S.

om het uur een
lepel vol.

Ter bereiking van het voorgestelde doel heeft mij bijzonder N^o. 2. voldaan, waarom ik ook daaraan steeds den voorrang geve; waar het noodig is, voege ik bij het laatste *Laud. Liq. Synh* van 15 tot 30 droppels.

Buiten den aanval moet men de gewone koorts-drijvende geneesmiddelen, in ruime giften, terstond na den afloop van de eerste aanvallen of zoo ras men het koortskarakter erkend heeft, toedienen. Wat hiertoe nog verder zoude behooren, zal bij de behandeling der volgende aanwijzingen, gezegd worden.

c. Tusschenpoozende rotkoorts. (*febris interm. putrida*)-

Deze tot de kwaadaardigste, maar in ons klimaat ook zeer zeldzaam voorkomende koortsvorm, is reeds pag. 482. breeder behandeld, en hare geneeskundige behandeling door eene medegedeelde waarneming aangewezen. Weshalven wij hier kort kunnen zijn; dikwijls gaat dit karakter met eene gastrische gesteldheid gepaard, of heeft zich daaruit ontwikkelt; krach-

tig

tig werkende braakmiddelen zijn derhalven in het eerste begin der koorts niet wel te vermijden, die men des noodig, veilig eenige malen herhalen kan, purgeer en zweetdrijvende middelen daarentegen, zijn bijna altijd schadelijk, en moeten zoo veel mogelijk vermeden worden, want het is zelden dat niet reeds in den beginne eene neiging tot onmatigheid in deze ontlastingen bestaat. Zijn er omstandigheden en toevallen, welke het bevorderen der buiksontlasting gebieden, dan doet men zulks door lavementen met wijn-azijn, of koolstof-zuur houdende vochten. In den koorts-aanval geve men limonade met minerale zuren bereid, vooral in de hette en het zweet, in de koude, water met azijn, of eenige glazen enkelde wijn, in behoorlijke tusschenruimten. Buiten den aanval vare men met de minerale zuren in ruime giften voort, en geve de *kina* en *kampher* in de grootst mogelijke hoeveelheid, die verdragen wordt.

d. De gastrische tusschenpoozende koorts, (*febris interm. gastrica*).

De kenteekenen waardoor zich de gastrische koortsen kenfchetfen, zijn dezelfde, welke bij de aanhoudende gastrische koortsen opgegeven zijn, en waarvan reeds pag. 483. het noodige gezegd is.

De verschilpunten die zoo dikwijls twistende zijn te berde gebragt, zonder immer beflist te

wor-

te worden, zullen wij hier slechts in het voorbijgaan aanraken, wegens den invloed, dien zij wel eens op de geneeskundige behandeling van deze koortsen gehad hebben, en nog hebben; namentlijk: of de gastrische verschijnselen in deze koortsen als oorzaken, gevolgen of uitwerkselen te beschouwen zijn?

Het overeenstemmend gevoelen van die Geneesheeren, welke hunne oordeelvellingen door onpartijdigheid lieten besturen, komt hier op neder: dat vele tusschenpoozende koortsen het gastrische karakter hebben, dat men de aanwezige ophooping op eene doelmatige wijze ontlasten moet, dat dit verzuimd wordende, de koorts eene langdurige en slepende geaardheid, die met plaatselijke aandoeningen en gebreken eindigt, doet aannemen. Dat de genezing wel zelden door de ontlastende geneeswijze alleen daargesteld wordt, maar men zich gewoonlijk in de noodzakelijkheid bevindt, nadat de ophooping weg genomen zijn, de koorts door *Kina* of andere koortsverdrijvende geneesmiddelen te onderdrukken. En dat men in de behandeling van deze koortsvorm steeds indachtig zijn moet, aan de meermalen gedane waarschuwing, van niet alle koortsen, waar de lijders over walging klagen, en eene beslagene tong hebben voor gastrische te houden; daar deze toevallen dikwijls in consensuele zenuw-betrekkingen gegrond zijnde, met iedere ontlasting verslim-

meren, en eerst door een ruim gebruik van koortsdrijvende middelen, met de koorts zelve verdwijnen.

De onderscheidene gedaante die de tusfchenpoo- de gastrifche koorts kan aannemen, zijn dezelf- de met die der aanhoudende, de geneeskundige behandeling moet nagenoeg volgens de daarbij gegevene regelen en voorschriften gewijzigd zijn.

- i. Tusfchenpoozende galkoorts. (*febris interm. biliosa*). Deze koorts gaat van haar begin af, aan, en dikwijls reeds voor hare ontwikkeling, met de gewone galachtige toevallen gepaard. Gedurende de koortsaanvallen zijn zij doorgaans het zwaartst, en met zeer ruime gal-ontlastin- gen door brakingen en buikloop verbonden. Met het afgaan van den aanval, worden zij wel minder, maar houden nimmer in den vrijen tusfchentijd geheel op. De gal te ontlasten is hier het hoofdoogmerk des Geneesheers. Naar- mate de aanwezige toevallen, welke het tur- gesceren der stof naar boven of naar beneden aanwijzen, worden zij door braak- of laxeer- middelen ontlast. In het begin der koorts met den eersten of tweeden aanval, zijn de braak- middelen doorgaans, en de laxeermiddelen eerst later aangewezen. Somwijlen is het noodig, de eerste eenige malen te herhalen. Het beste is om ze in den koortsvrijen tusfchentijd, zoo lang voor den aanval toe te dienen, dat het braken met

met zijn begin kan afgeloopen zijn; men geve den Braakwijnsteen, Braakwortel of beide vereenigt, in eene hoeveelheid, die genoeg is, ruime ontlastingen te bewerken. Als na het braakmiddel, de eerstvolgende koortsaanval minder als de voorafgegane, en de galachtige verschijnselen verminderd zijn, dan mag men zich het beste gevolg van de ontlastende geneeswijze beloven. Nemen deze toevallen later weder toe, dan herhale men het braakmiddel; wijzen daar en tegen de toevallen aan, dat de stof naar beneden turgesceert, dan komen laxermiddelen of lavementen te pas, naarmate de krachten des lijders en het al of niet aanwezig zijn van verstopte buikontlasting of loslijvigheid hetzelfde vereischen. Tot laxermiddelen zijn hier de zuurachtige en zachtwerkende middenzouten bijzonder aangewezen, ook Tamarinde, Casfia, Wijnsteen met of zonder Magnesia. Bij zeer trage gestellen, en waar de zwakte reeds grooter is, voegen men Rhabarber daarbij. Gedurende den aanval late men zuurachtige dranken gebruiken, indien de lijders eenige eetlust hebben, gestoofde vruchten en ligt verteerbare met zuren toebe-reide groentens nuttigen. Heeft men nu op deze wijze de galachtige ophooping opgeruimd, of laten de krachten niet langer toe, de ontlastende geneeswijze vol te houden, en duurt de koortst voort, dan geeft men koortsverdrijvende geneesmiddelen, vooral de *kina*. Niet altijd

behoeft men het gebruik van dit middel zoo lang uit te ftellen, tot dat alle galachtige toevallen en verfchijnfelen geweken zijn, maar men kan zoo ras de dringendfte toevallen nalaten, de *kina* met ontlastmiddelen vereenigt toedienen, en daarmede aan beide aanwijzingen, om de ophooping en op te ruimen, en de koorts te onderdrukken, voldoen; is de Epidemifche gefteeldheid zoodanig, dat de koortfen ligtelijk een kwaadaardig karakter aannemen, dan moet men om deze overgang te verhoeden, terftond, na de braakmiddelen de *kina* op de genoemde wijze toedienen.

Als eene ziekelijke gefteeldheid in het galafcheidende ftelsel aanwezig is, die de ziekelijke afscheiding, zij moge dan quantitatief of kwalitatief zijn, onderhoudt, die door de ontlastende geneeswijze alleen niet kan hersteld worden, maar in tegendeel door de prikkeling van den maag en darmbuis verflimmerd wordt, moet men op de meest gefchikte wijze, door geneesmiddelen, die bijzonder op het leverftelsel inwerken, en die bij de behandeling der aanhoudende galkoorts uitvoerig befchreven zijn, daarin voorzien.

2. Tufchenpoozende flijmkoorts. (*febris intermittens pituitosa*). zeer hardnekkige koortfen met den derdendaagfche *typus*, hebben gewoonlijk dit karakter; fomwijlen ook geheele Epidemien. De behandeling is dezelfde als bij de aanhoudende

dende slijmkoorts in het breede is omschreven. Prikkelende, oplosfende en bittere geneesmiddelen, in den beginne het Ammoniak-zout, Braak-wijnsteen in kleine giften, de bittere extracten van het *Taraxacum*, *Trifolium*, *Absinthium* en *Gentiana*, zijn hier vooral op hunne plaats; tusfschenbeiden een braakmiddel, bij verstopte buiksontlastingen, een laxeërmiddel uit de Jalappa, Aloes of Rhabarber, met de zoete kwik- en goudzwavel. Nemen, gedurende het gebruik van deze middelen de slijmtoevallen af, wordt de tong zuiver, het voorkomen beter, en keert de eetlust weder, dan blijve men er mede voortvaren, en ondersteune door eenige glazen goeden wijn daags, en ligt verteerbare voedfels, de krachten; de koortsaanvallen nemen dan allengskens af, en blijven ten laatste geheel uit; de op deze wijze genezene lijdens zijn zelden aan instortingen onderhevig, terwijl die waar de koorts door *kina* onderdrukt wordt, bijna nimmer uitblijven. Indien de lijdens zeer zwak zijn, gedurende het gebruik der ontlastende, oplosfende en bittere geneesmiddelen de toevallen vermeederen, de eetlust geheel ontbreekt, het voorkomen slechter wordt, de krachten meer en meer afnemen, en de koortsaanvallen heviger en langduriger worden, zijn deze middelen geheel ter zijde te stellen, of men late dezelve vereenigt met *kina* toedienen. Het Ammoniak-zout, de Soda, groote giften Braak-

wijnsteen, de Rhabarber, de Goudzwavel en het Yzervitriool met de *kina* in toereikende giften zijn dan zeer doelmatig, de langdurigste en hardnekkigste koortsen worden er niet zelden door genezen.

℞ *Pulv. Cort. Per. opt. unc. i ℥.*
Sal. Ammoniac. vel. sod. depur. dr. i ℥.
Syr. comm. q. s. ut fiat elect.
 D. S.

Tusschen twee koortsaanvallen in gelijke giften, om het uur of twee uren te gebruiken.

℞ *Pulv. Cort. Peruv. opt. unc ℥.*
Tart. acid. stib. gr. x·x
Syr. commun, q. s.
Utsiat Elect. d. s.

Als het vorige toe te dienen.

℞ *Pulv. cort. Per. opt. dr. vi.*
Sulphat. ferri gr. xxxvi.
Sulphuret. oxyd. stib. hydrog. gr. xii.
M. fiat pulv. div. in xii part. aeq.
 D. S.

Om de twee uren een poeder.

Voor al van dit laatste middel, dat ook door den Heer SEBASTIAN aanprezen wordt, heb ik meermalen de beste uitwerking gehad.

Na het achterweeg blijven der koortsaanvallen, blijven de meeste lijders nog lang zwak,

en zeer aan instortingen onderhevig, weshalve het noodig is, nog eenen geruimen tijd *kina*, bittere en Staalmiddelen te laten gebruiken, ten einde de gezondheid duurzaam hersteld worde. De herstelden moeten zich warm kleeden, koude vochtige lucht, waterachtige dranken, vette, moeilijk verteerbare spijzen, visch, kaas enz. vermijden, en dagelijks eenige glazen wijn, goed wel gehopt bier tot gewone drank, en daaraan gewone personen, des morgens een klein glas jenever op bittere middelen getrokken, gebruiken.

- 3.° Tusschenpoozende wormkoorts. (*febris interm. verminosa*), komt meestal bij kinderen voor, doch ook geheele Epidemien hebben wel eens dit karakter gehad; zij komen zelden geheel zuiver, maar meerendeels met het slijmachtige en galachtige verbonden, voor. De toevallen, zijn de gewone der aanhoudende wormkoorts, zich wijders kenschetsende door de onregelmatigheid in de koortsaanvallen, die plotseling opkomen, en even spoedig weder nalaten, of met zenuw-toevallen gepaard gaan en lang aanhouden. De koortsachtige gesteldheid der pols, met de gewone worm toevallen en de ontlasting van deze insecten, maken, waar zij aanwezig zijn, de kennis van deze koorts niet moeilijk. Maar niet altijd zijn zij zoo duidelijk en volkomen ontwikkelt aanwezig, en dan wordt het niet alleen voor den jongen, practisch min ge-

oefenden Geneesheer, maar zelfs voor den meest ervarenen allermoeijelijkst, en men loopt dikwijls gevaar eene worm- met eene zenuwkoorts of deze met de eerste te verwisfelen, eene fout, waartegen men zich door de grootste oplettend- in het waarnemen, moet trachten te hoeden.

De geneeskundige behandeling is gelijk aan die der aanhoudende wormkoorts, gewijzigd naar die der tusfchenpoozende slijmkoorts. De wormen moeten met hare nesten ontlast, en de koortsaanvallen, als zij daarna blijven volhouden, of hare verzwakkende uitwerking aan den toestand der lijders eene dreigende houding geeft, tegen gegaan en onderdrukt worden. De wormdrijvende geneesmiddelen geve men in verband met laxeermiddelen buiten den aanval, en lenige door bedarende, de dringendste toevallen in den aanval. Als de noodige ontlastingen voorafgegaan zijn, kunnen de wormmiddelen met de *kina* vereenigt toegediend, met of zonder laxeermiddelen, naarmate het de gesteldheid der buiksontlasting vordert. *Kina* en *Valeriaan*, het Wormkruid, de *Cortex Geoffraeae*, *Jalap*pe en *Rhabarber*, zijn de meest vermogendste, waaruit eene keuze naar omstandigheden te doen is.

Wanneer de omstandigheden der lijders zoodanig waren, dat men zijn hoofdoogmerk tegen de koorts wenden moest, of deze veilig konde onderdrukt worden, dan heb ik mij

mij steeds het heste bij het gebruik van het volgende middel bevonden.

R_o Pulv. Cort. Peruv. opt.
— rad. Valer. Syly. a unc i.
Sulphat. ferri
Pulv. rad. Rhei a dr. i.
Syr. commun q. s. ut fiat Elect.

D. S.

Om de twee uren een eijerlepeltje.

Nadat de koorts achterwegen is gebleven, late ik dit middel altijd nog eenigen tijd voortgebruiken, in dagelijks verminderde giften, en eerst met de volkomene herstelling allengskens er mede ophouden. Ten aanzien der leefregel, geldt hetzelfde, wat in dit opzigt, bij de slijmkoorts gezegd is.

4. Eenvoudige gastrische tusfchenpoozende koorts. (*febris interm. saburrhalis, gastrica simplex*). Bij de andere gastrische tusfchenpoozende koortfen, hangen de ophoopingten in de eerste wegen, altijd meer of min van eene bijzondere ziekelijke gesteldheden der afscheidende werktuigen af, dewijl in deze de aanwezige stoffen van buiten in de maag en darmbuis gebragt zijn. Zij is de goedaardigste, en minst moeilijke in de behandeling, maar ook die, welke zeer menigvuldig voorkomt. De voorafgegangene levenswijze en de toevallige oorzaken die haar on-

middelrijk voorafgegaan zijn, in verband met de gewone gastrische verschijnselen, die wel is waar, zelden geheel gemist worden, maar hier zeer duidelijk ontwikkelt zijn, maken de kennis van deze koortsvorm niet zeer moeilijk.

Dezelfde aanwijzingen welke bij de andere gastrische koortsen te volgen zijn, moeten ook in deze voldaan worden. Namelijk de aanwezige stoffen op de meest geschikte wijze te ontlasten, nieuwe ophooping van te komen en de koorts, indien zij, nadat de nodige ontlastingen vooraf gegaan zijn, niet mogt wegblijven, met de gewone koortsdrijvende middelen te onderdrukken.

Zoo lang de vreemde stoffen nog in de maag, en naar boven ter ontlasting geschikt zijn, geven men kort na den aanval een braakmiddel, en herhale hetzelfde zoo dikwijls als de omstandigheden zulks vorderen. Hebben de stoffen de maag reeds verlaten en turgesceren zij naar beneden, dan zijn laxermiddelen uit midden-zouten met rhabarber of Jalappa aangewezen. Zijn de lijders zeer zwak, dan geve men de *kina* en andere koortsverdrijvende geneesmiddelen, en ontledige den darmbuis door behulp van laxeerende lavementen.

Daar de braakmiddelen niet alleen door hunne ontlastingen, maar ook door de sterke schudding, waardoor zij de geheele bewerktuiging aandoen, eene andere stemming in de prikkelbaar-

baarheid, gevoeligheid en de onderscheidene verrigtingen te weeg brengen, maar bijzonder op de huid werken en de uitwaseming bevorderen en herstellen, zonder veel te verzwakken, behoeft men zoo beangst in hun gebruik niet te werk te gaan. Een braakmiddel zonder dat ophooping in de maag aanwezig zijn, zal in den beginne der koorts gegeven, ook dan meer goed als kwaad doen, dewijl een verzuimt braakmiddel nimmer zonder nadeelige gevolgen blijft, en zeer dikwijls de eenige oorzaak is, voor de latere hardnekkigheid en langdurigheid der koorts. Vele Geneesheeren hebben derhalven ook dit middel in het begin van alle tusfchenpoozende koortsen aangeraden, en deszelfs gebruik tot eenen algemeenen regel vastgesteld.

Meer omzigtigheid vordert het gebruik der laxermiddelen, buiten volstrekte noodzakelijkheid, behooren zij niet gegeven, en bij groote zwakte vermeden te worden. Want waar zij niet heilzaam zijn, zijn zij schadelijk en ondermijnen de krachten; ook kan meest altijd op eene minder nadeelige wijze, door lavementen aan het doel beantwoord worden, dat men daarmede beoogd.

Wanneer gastrische ophooping in de gevolgen van eene ziekelijke afscheiding in het spijs-kanaal en gebrekkige menging der afgescheidene vochten aanwezig zijn, dan moet de geneeskun-

di-

de behandeling op dezelfde wijze ingerigt zijn en bestuurd worden, als bij de aanhoudende koortsen tot dat foort behoorende, gewijzigd volgens het eigenaardige der tusfchenpoozende koortsen, namentlijk dat zij zelden alleen door ontlaste middelen genezen worden, maar door gaans op het einde de kina, en andere koortsdrijvende geneesmiddelen noodig hebben.

Na den afloop van alle gastrifche koortsen, blijft steeds eene zekere neiging tot dezelfde gefteldheid in de eerste wegen terug, die in zwakte, verhoogde prikkelbaarheid en gevoeligheid fchijnt gelegen, en de fpijsverteringswerktuigen vatbaar doen zijn, door de geringfte fchijnbaar niets beteekenende oorzaken in hunne verrigtingen gestoord te worden. Geneigdheid tot instortingen, gebrek aan eetlust en zwakke fpijsvertering zijn daarvan de gewoonlijkfte gevolgen, die, de koortsaanvallen achter weeg gebleven zijnde, het voorgestelde gebruik der kina, bittere en ftaalmiddelen, en vooral ook eene goede leefregel en diaet vereifchen, zoo lang volgehouden, tot dat de gewone tijdperken der wederkeerende aanvallen, en alle andere ziekten verfchijnfelen verdwenen zijn.

Derde aanwijzing. Behandeling der koorts met specifieke middelen.

De ervaring heeft sedert de vroegfte tijden geleerd, en overtuigt nog dagelijks ieder geneesheer, die niet blind zijn wil, dat noch het opruimen der toevallige
en

en verwijderde oorzaken, noch eene beredeneerde behandeling der koorts, volgens haar bijzonder karakter, onverschillig, volgens welk der bespiegelende stelsels dezelve ook moge ingerigt zijn, alleen voldoen, om tusfchenpoozende koortfen te genezen; maar dat men verre weg in de meeste gevallen zich in de noodzakelijkheid gebragt vindt, de koorts op eene Empirifche wijze, met die middelen, welke koortsdrijvende genoemd worden, te verdrijven. Hoe deze middelen de koorts genezen, weten wij niet, maar dat zij haar genezen, is door duizende malen herhaalde waarnemingen geftaafd, en wordt nog dagelijks op het ftelligfte bewezen. Waarfchijnlijk doen zij het op eene geheel materiele wijze, door aan de bewerktuiging die ftoffen mede te deelen en te herftellen, welke zij door de koorts en hare voortbrengende oorzaken verloren heeft. Het eigenaardige mengfel van het eerfte en voornaamfte koortsverdrijvende geneesmiddel, de kina namentlijk, en het vergeefsch zoeken naar plaatsvervangende middelen, hoe nabij zij haar ook in hunne zamenftellende deelen te komen fchijnen, maken dit gevoelen, hoogst waarfchijnlijk.

Geneesmiddelen, welke op zoodanig eene wijze op de bewerktuiging inwerken, dat zij de koorts verdrijven, zonder in het oogloopende wederwerkingen en veranderingen voort te brengen, en bij gevolg op eene regtftreekfe wijze, op de naaste oorzaak der koorts inwerken, en ze uitblusfchen, noemt men te recht, *eigenaardige koortsverdrij-*
ven-

vende geneesmiddelen. (remedia febrifuga specifica). Zoolang het gevoelen, dat iedere koorts door eene bijzondere koortstof of prikkel voortgebragt werd, en de koorts eene heilzame beweging en poging der natuur zijn zoude, om zich van deze stof te ontdoen, algemeen onder de Geneesheeren heerschte, was men zeer beducht de koortsverdrijvende geneesmiddelen toe te dienen om er koortsen mede te genezen. Duizende naziekten werden, als de onmiddelijke gevolgen harer toediening, opgenoemd; en duizende genezingen van slepende ziekten, door koortsen aan zich zelve overgelaten, of gedurende het gebruik van ontlastmiddelen, als bewijzen daartegen gesteld. Zelfs de kina, het krachtigste van alle koortsverdrijvende middelen, moest, hoe moeilijk het ook aan de Geneesheeren viel, voor het bekend was, dat zij eene koorts kan genezen, het nadeel der vooroordeelen en verkeerde theoretische grondstellingen ondervinden. Jaren waren noodig de Geneesheeren van hunne dwalingen terug, en tot de algemeene invoering van dit geschenk der Godheid, te brengen.

Naarmate dat de gedaante der geneeskundige theorien en stelsels veranderde, en men in de regtstreekse veranderingen der bewerktuiging, in hare stoffelijke zamenstelling en de daarvan afhankelijke zoowel als daarmede verbondene eigenschappen en krachten, de naaste oorzaak van alle ziekten zocht, of ook wel waande gevonden te hebben, verviel men tot een ander uiterste. Wilde men eerst, niet dan met

met de grootste omzigtigheid, voorzorgen, en voorafgegane voorbereidende geneeswijze de koortsverdrijvende geneesmiddelen aangewend hebben; men wilde nu terstond alle koortsen door opruiming van hare naaste oorzaak genezen, en die in zoo vele uren verdrijven, als men te voren dagen en weken behoefde. Deze twee uitersten, waartusfchen de waarheid in het midden ligt, waren het, waartoe de geneesheeren beurtelings vervielen, ja velen nog dagelijks vervallen. Indien mijne krachten aan mijne beoelingen mogen beantwoorden, zal ik beide vermijden, en ten minsten eenige feinen vaststellen, ontleent uit de ervaringen der voornaamste Geneesheeren, om aan te wijzen, welke rigting hier den veiligen weg neemt, en reeds genomen heeft.

Zuivere tusfschenpoozende koortsen met het eenvoudige zenuw- of typhuskarakter, met hoegenaamd geene stoffelijke oorzaken verbonden, kunnen onmiddelijk door koortsdrijvende geneesmiddelen onderdrukt worden. Zijn zij daarentegen meer zamengesteld en ingewikkelt, dan komen die middelen niet te pasfe, want alsdan maken zij de koorts langdurig, of hebben, wanneer zij ook de regelmatige aanvallen onderdrukken, ten gevolge, dat de ziekelijke gesteldheid der bewerktuiging voortduurt, of eene andere wijziging en gedaanteverwifeling aanneemt.

De bijzondere behandeling der toevallige oorzaken, en die der bijzondere geaardheden der koortsen, fchijnen hare noodzakelijkheid en nuttigheid daarin gelegen te hebben, dat zij de zamengestelde koortsen
in

in eenvoudige veranderd, die nu geschikt zijn door koortsdrijvende geneesmiddelen veilig en zeker te kunnen genezen worden.

Bij het ontstekingsachtig en gastrisch karakter zijn de koortsverdrijvende geneesmiddelen schadelijk, maar deze karakters opgeruimd zijnde, en de koorts eene eenvoudige gedaante verkregen hebbende, nuttig en noodzakelijk.

Doet zich de tusfchenpoozende koorts als eene eenvoudige voor, maar is de lijder te gelijk door eene andere ziekte aangetast, die zonder daarmede in een onmiddelijk verband te staan, met iederen koortsaanval afneemt, zoo dat de koorts als het geneesmiddel van eene andere ziekte moet beschouwd worden, dan laat men de koorts ongestoord in zijnen loop, en aan de natuur over; ten ware dat zij gevaarlijker zijn mogt, als de ziekte, welke zij verligt. Echter doet men ook dan beter de aanvallen te matigen en de krachten te ondersteunen, als dezelve geheel te onderdrukken. In de jaarboeken der geneeskunst vind men voorbeelden, van krankzinnigheid, vallende ziekte, stuiptrekkingen, zenuw-toevallen, verlammingen, waterzucht, geelzucht, verstoppingen in de ingewanden, blindheid, doofheid, huid- en andere ziekten meer opgeteekend, welke door eene bijkomende tusfchenpoozende koorts genezen werden, en verslimmerden of wederkeerden, als men de koorts te vroeg en ontijdig onderdrukt had.

De meeste der tusfchenpoozende koortsen, ook dan

dan wanneer zij van haar begin af aan, een eenvoudig karakter hebben, worden gemakkelijker, zekerder, spoediger en met kleinere hoeveelheden koortsverdrijvende geneesmiddelen genezen, nadat zij ten minsten drie aanvallen gemaakt hebben, dan wanneer men ze onmiddellijk na den eersten aanval stoppen wil, tevens zijn de herstelden ook minder aan instortingen onderhevig. Hoe groot moet de hoeveelheid *kina* niet zijn, om eene kwaadaardige koorts, die met den tweeden of derden aanval het leven met gevaar dreigt, te onderdrukken? Meermalen heb ik langdurige koortsen genezen, waartegen reeds zeer groote hoeveelheden *kina* en andere koortsverdrijvende middelen gebruikt waren, door de lijders gedurende vijf of zeven aanvallen, alle deze middelen ter zijde te doen stellen, en de *kina* dan in de gewone hoeveelheid tusschen twee aanvallen te laten gebruiken. Eene once deed de koorts dikwijls achterweeg blijven, die te voren aan ponden van dit middel tegenstand geboden had.

Het gevoelen van die Geneesheeren, welke veronderstellen: dat de tusschenpoozende koortsen even gelijk vele anderen, door een *miasma* voortgebragte ziekten, noodwendig eenen bepaalden loop hebben moeten, om die veranderingen in de bewerktuiging voort te brengen, waarvan de kritische ontlastingen afhangen, om daarna veilig en zeker genezen te kunnen worden, komt mij voor, door de natuurlijke geschiedenis dezer koortsen bewezen te zijn, en

Min

alle-

allezins de oppenlettendheid des praktischen Geneesheers te verdienen.

In bijzondere Epidemische en kwaadaardige gesteldheden, kan en moet men haar onmiddellijk door *kina* of andere koortsverdrijvende geneesmiddelen onderdrukken, wegens het gevaar dat zij insluiten. Ook daar waar anders gezonde lieden door plotseeling voorbijgaande en Endemische oorzaken, vooral in moerasfige landstreken, de koorts krijgen, mag zulks geschieden.

De voorjaars-koortsen genezen doorgaans zeer gemakkelijk, bij het gebruik van zacht ontlastende en zweetdrijvende geneesmiddelen, zonder koortsverdrijvende noodig te hebben. Echter komt daarbij veel op de bijzondere omstandigheden en gesteldheden der Epidemien en der lijders aan; de gemakkelijke genezing dezer koortsen is meer eene uitwerking der heilzame pogingen der natuur, als wel der geneeskundige behandeling, maar ook de voornaamste oorzaak, waarom in de latere jaren, zoo vele geneesmiddelen den roem van koortsverdrijvende verkregen, en in de praktijk, ten minsten voor eenigen tijd opspraak maakten, maar ook even spoedig in vergetelheid geraakten.

Najaars-koortsen vorderen bijna altijd koortsverdrijvende middelen, zelden blijven zij zonder deze achter. Zoo ras derhalven de toevallige oorzaken opgeruimd zijn, en de koorts van drie tot zeven aanvallen gemaakt heeft, moet men ze toedienen.

Die

Die welke reeds lang geduurd hebben, de krachten uitputten, en door hare schadelijke inwerkingen op de bewerktuiging met de aan deze koortsen zoo gewone gebreken der ingewanden dreigen, onderdrukken men zoo spoedig mogelijk op de doelmatigste wijze. De gewoonlijk met haar aanwezige gastrische verschijnselen, moeten ons niet tot het langer volhouden der ontlastende en oplosfende geneeswijze verleiden, daar deze verschijnselen een gevolg der koorts en geenszins hare oorzaken zijn, die verdwijnen zoo ras de koorts nalaat.

De geneesmiddelen welke de ervaring als koortsverdrijvende (*remedia febrisfuga*) heeft leeren kennen, zullen wij hier laten volgen, over eenige meer breedvoerig spreken, anderen slechts aanstippen. De bijzondere verdeeling dezer middelen, door eenige Geneesheeren aangenomen, namelijk in vlugge en aanhoudende, gaan wij voorbij, daar wij te weinig weten van de wijze, hoe zij werken, er geen praktisch nut mede verbonden is, en het noodige dien aangaande bij de aanwijzingen voor het een en ander middel zal gezegd worden.

1. Het krachtigste van alle, op eene specifieke wijze de koortsverdrijvende geneesmiddelen, is de *kina*. Weshalven wij haar ook hier de eerste plaats aanwijzen. In alle gevallen waarin de koorts-aanvallen door dit soort van middelen kunnen en moeten onderdrukt worden, is zij het zekerst en krachtigst hulpmiddel.

Bij de eenvoudige tusschenpoozende koorts,

M m 2

bij

bij het zenuw- en rotachtige karakter, en bij zwakte, is de *kina* steeds aangewezen, mits dat de verrigtingen der spijsverterings-werktuigen genoegzame krachten hebben, om dien bast te verteren en te assimileren. Vele der nieuwere geneeskundige Schrijvers hechten bijzonder op deze tegenaanwijzing, en willen het gebruik van dit middel naauw bepaald hebben. Geneesheeren die vele tusfchenpoozende koortfen behandeld hebben, zullen erkennen dat deze tegenaanwijzing zoodikwijls niet voorkomt, en dat de *kina* doorgaans het eenigst middel is, om de kwijnende verrigtingen van het spijskanaal op te wekken, en tot deszelfs gezonden toestand terug te voeren. Men bezigt immers de *kina*, bij verzwakte spijsvertering ook in andere ziekten met het grootste voordeel, en waarom zoude nu juist in de tusfcheppoozende koortfen, waartegen zij een specificum is, zooveel meer omzichtigheid nodig zijn, en dezelve minder verdragen worden? De invloed dien de onderscheidene stelsels op de beoefenende geneeskunst gehad hebben, en nog hebben, laat zich hier niet miskennen. Geenszins wil ik intusfchen loochenen, dat er gevallen zijn, waar de maag de *kina* niet verdraagt, walging, brakingen en verheffingen der aanvallen tot hare onmiddellijke gevolgen behooren, maar, die naar het mij voorkomt, meer de gevolgen der nog aanwezige ontstekingsachtige en gastrische getfeldheden, waar in de koortsbast niet te pasfe komt

komt en altijd schadelijk is, schijnen, als wel van andere oorzaken.

Algemeene regelen, welke men bij het gebruik der *kina* behoort in acht te nemen, zijn de navolgende:

- a. Nimmer geve men terstond na den afloop van den eersten koorts-aanval, maar eerst na den 3^{den}, 5^{den} of 7^{den} de *kina*. Met uitzondering alleen van die gevallen, waarin de koorts een kwaadaardig karakter heeft, en het leven niet anders, dan door eene spoedige onderdrukking der aanvallen kan gered worden.
- b. Het gebruik der *kina* is volstrekt af te keuren, wanneer de koorts met eene ontstekingsaardige gesteldheid, of wezenlijke, algemeene en plaatselijke ontstekingen gepaard gaat; ook bij zinkingaardige aandoeningen, en ziekten waarin de borst- en ademhalings ingewanden, de meest lijdende deelen zijn, is zij nadeelig.
- c. Bij duidelijk ontwikkelde gastrische toevallen, na voorafgegane overlading van de maag, zijn deze stoffelijke oorzaken eerst op te ruimen, en met de *kina* zoo lang te wachten, als de ontlastende en oplofende geneesmiddelen de koorts-aanvallen en toevallen doen afnemen en verligten.
- d. Wanneer andere gelijktijdig aanwezige ziekten verminderen, de eetlust goed blijft, de krachten eer toe als afnemen en het voorkomen der lijders verbetert, dan is de *Kina* niet aangewezen.

- e. Indien eene bijzondere *Idiosyncrasie* het voor den lijder onmogelijk maakt de *Kina* te gebruiken, zoo dat zij walging, brakingen, hitte en hevigere koortsaanvallen ten gevolge heeft, moet zij achter wege blijven, en waar het noodig is, een ander koortsverdrijvend geneesmiddel in hare plaats gesteld worden.
- f. Tegen voorjaarskoortsen is zij minder noodzakelijk dan tegen najaarskoortsen, bij den anderenden daagschen typus minder dan bij den daagschen, derdendaagschen en dubbelde koortsen.
- g. Bij kraamvrouwen, zwangeren en zeer jonge kinderen, vordert hare toediening meer omzigtigheid, maar behoeft niet geheel en al achterweeg te blijven, wanneer zij overigens aangewezen is.
- h. Men moet haar nimmer, gedurende de aanvallen, maar altijd, nadat zij afgeloopen zijn, in den koortsvrijen tusschentijd toedienen, deze lang genoeg zijnde, is het het doelmatigst, tot twee of drie uren na den geheelen afloopdes aanvals, mede te wachten. Bij de daagsche en dubbelde koortsen kan men zich zelden aan dezen regel binden. Tegen de anderendaagsche maak ik er tien of twaalf uren voor den aanval, een begin mede, in de derdendaagsche geef ik ze alleen op den tweeden vrijen, of den dag voor den aanval. Gedurende den aanval verdragen de lijders bijna nooit de *kina*, zonder dat brakingen en andere toevallen volgen; hetzelfde heeft plaats als

als de *kina* te kort naden aanval toegediend wordt.

i. Dikwijls gebeurt het ook, dat dezelve niet wel bekomt, doordien zij met andere middelen vervalscht, of dat wat door den apotheker gegeven wordt, in het geheel geene *Kina* is.

k. Ook de vorm waarin zij gegeven wordt, heeft invloed op hare uitwerkselen. Niet alle lijders verdragen ze in substantie, bij anderen blijft zij in afkookfels, aftreksels en extract gegeven, zonder werking, en de gevolgen, die de langdurigheid van de koorts in de bewerktuiging voortbrengt worden door onwetenden aan haar vroegtijdig gebruik geweten.

In alle gevallen waar geene der genoemde tegen aanwijzingen bestaan, en het zaak is de koorts te verdrijven, moet de geneesheer bij het voorschrijven van dit middel op het volgende letten en bedacht zijn:

1. Dat de *kina* echt, niet vervalscht, van goede kwaliteit, en behoorlijk toe bereid zij. Het poeder moet zoo fijn mogelijk zijn, de afkookfels niet te lang koken, en even als de aftreksels en het extract, volgens de voorschriften in de Bataafsche Apotheek, vervaardigt zijn.

2. Het krachtigste is de *kina*, in substantie, eene once poeder doet meer, als twee in afkookfels, of aftreksels, of eene halve once *extract*. Wanneer de lijder dezen bast verdragen en in een toereikende hoeveelheid gebruiken kan, moet dezelve nimmer anders als in substantie toegediend worden. Als

de spijsverteeringskrachten zeer verzwakt zijn, en gebruik van dit middel door benaauwdheid, zwaarte, drukking en pijn in de maag, misfelijkheid en braken gevolgd wordt, voege men er het een of ander prikkelend aromatik middel bij, en kieze vooral het zoodanige, dat tevens den smaak verbeterere en voor den lijder aangenaam is, want bij velen zijn deze toevallen meer in den tegenzin, dan in de maag zelve gelegen. Dezelfde lijder die eerst de *kina* niet gebruiken konde, verdraagt ze zeer wel als men er kaneel bijvoegt, dezeve met wijn mengt, of op iedere gift eene teug goeden wijn laat nanemen, dikwijls ook dan reeds, wanneer het poeder, in de gedaante van een *electuarium* voorgeschreven, en de slikbrokken in ouwel gegeven worden. Naast het gebruik in substantie, waar deze niet voegzaam is, verdient eene gefaturceerd afkookfel of koud aftrekfel met bijvoeging van een aromatik, den smaak verbeterend middel, de voorkeur; de *Tinctuur* en het *extract* zijn de minst vermogende bereidsels. Ook kan de *kina* nog op andere wijze gebruikt, in klijsteren, baden, pappen en innaaisels toegediend worden. In klijsteren gebezigt behoort de toe te dienen hoeveelheid het drie of vier dubbel te zijn, van die, welke men anders door den mond gebruiken laat. In baden aangewend moet de geheele hoeveelheid vocht waarin men laat baden een *Kina* afkookfel zijn. Tot pap mengt men het poeder

met water of rooden wijn, en bedekt daarmede den geheelen buik. Als innaaisels, wordt de geheele ruimte, die tusfchen twee op elkanderen genaaide hembden overig blijft met een zeer fijn *Kina* poeder gevuld, het linnen moet niet te digt zijn, zoo dat het doortuft; om de vier of zes dagen, moeten de gedragene met verfche hembden en *Kina* verwisfeld worden. Bij zuigelingen ziet men de koorts wel eens uitblijven, wanneer de minne de *Kina* in fubftantie en in groote hoeveelheid gebruikt.

3. Veel komt bij het gebruik van dit middel tegen de koortfen, daarop aan, dat men het in toereikende hoeveelheid toediene. In de eenvoudige tusfchenpoozende koorts, rekent men voor eene volwasfen perfoon, wanneer hij den daagfchen of anderendaagfchen *tijpus* heeft van 6 dragmen tot een en eene halve once tusfchen twee koortsaanvallen toereikende; in de derdendaagfchen van anderhalf tot twee oncen. Tegen kwaad-aardige koortsoorten zijn deze giften zelden toereikende, en moeten tot het dubbelde en driebubbelde gebragt worden.

Ook moet in het bepalen der voor te fchrijven hoeveelheden, op den ouderdom en het geflacht, de meerdere of mindere aandoenlijkheid der lijders, en op de geaardheid der *Epidemie* gelet worden. Bij hoogbejaarden, min aandoenelijke geftellen, bij mannen in najaars *Epidemien*, en bij lijders die de koorts lang gehad hebben.

zeer verzwakt zijn, en in bijna alle mogelijke vormen en verwisfelingen de koortsverdrijvende geneesmiddelen gebruikten, moet de toetediene hoeveelheid grooter zijn, als waar het tegenovergestelde plaats heeft.

4. Van de onderscheidene wijzen door geneesheeren aangeraden, om de *Kina* toetediene, ten einden men daarvan de grootste uitwerking hebben zoude, schijnt die de beste te zijn: waar de noodige hoeveelheid in gelijke giften verdeeld, van uur tot uur in de laatste tien of twaalf uren voor den aanval gebruikt wordt. Doch zoo dat iedere gift ten hoogsten eene drachma bedrage; heeft men meer als twaalf drachma noodig, dan begint men zoo vele uren vroeger als het getal der giften meer bedraagt. In grooter tusschentijden, als twee tot drie uren, heb ik nimmer eene zoo algemeen voldoende uitwerking gezien, als ik ondervonden heb, wanneer ik ze op de genoemde wijze toediene b. v. b.

Rp. Pulv. Cort. Peruv. unc i.

— — Cinnam. dr. i

Sijr. commun. q. s. ut f.

boli Nr. XII.

s.

Om het uur een brok in ouwel.

Pulv.

R. Pulv. Cort. Peruv. opt. unc. i.

aquæ flor. Chamom. unc. xi.

— *Cort. Cinnam. unc. ii.*

Sijr. Aurant. unc. i.

M. s.

Om het uur wel omgeschud eene once.

5. Uit overdrevene vrees voor de verzwakkende uitwerkselen der laxeermiddelen heeft men het voor onzin verklaart, het gebruik der *Kina* met dat der eerste te vereenigen; steunende op ervaring van beroemde geneesheeren en door eigene ondervinding geleerd, schroomde ik niet te beweren, dat beide middelen met elkanderen kunnen, en dikwijls tot welzijn des lijders moeten verbonden worden, zonder daardoor juist in eene contradictie te vervallen. Nogtans onder die voorwaarden, dat men niet bedoele vele en ruime ontlastingen, want dan zoude het beter zijn een laxeermiddel op zich zelve te geven, maar alleen om de buikontlasting in gang te houden, en nieuwe ophopingen te voorkomen, waar derhalven de buik verstopt is, met een gevoel van hette, zwaarte en volheid in de buik, en deze eenigermate opzet, moet ons de raanwijzing voor het gebruik der *Kina*, niet terug houden, de buikontlasting te bevorderen en open lijf te houden. Bij zeer zwakke buikingewanden, met neiging tot buikloop, vermijde men de openende middelen, en vervange hare plaats door klijsteren, dagelijks of om den

an-

anderen dag, naar mate de omstandigheden het vereisfchen. Tot inwendig gebruik, om met de *Kina* verbonden en toegediend te worden, komen voornamelijk de *Rhabarber*, het *Amoniak* zout en braakwijnsteen in aanmerking. De eerste van eene halve tot eene heele drachma, op eene once *Kina*, het *Ammoniak* zout van een tot drie drachmen, en de braakwijnsteen tot 16 grijnen. Eenige jaren geleden, heeft men, vooral met het laatste middel, op deze wijze toegediend, veel ophef gemaakt. Intusfchen heb ik nimmer gezien, in gevallen, waar het onderdrukken der koorts, het eenigfte doel was, dat men daarmede meer dan met de *Kina* alleen konde uitvoeren.

6. Wanneer men de *Kina* tegen koortfen toedient is het vooral noodig, dat de verrigtingen van het fpijskanaal zooveel mogelijk, ten aanzien der ontlastingen in haren natuurlijken loop ongestoord blijven, maar tevens ook dat zij niet overmatig zijn, en in buikloop ontaarden, een toeval dat dikwijls bij het gebruik der *Kina* plaats grijpt en dezelve door het fpijskanaal heen voert en ontlast, zonder dat het tijd heeft om ze te verteeren en te asfimeren, waartoe volgens het algemeen gevoelen, de tijd van 24 uren gevorderd word, tot dat alle hare nuttige deelen door de opflorping zijn opgenomen. Als de buiksontlastingen te talrijk zijn, of eene wezentlijke buikloop ontstaat, moeten zij tegengegaan en gestopt worden. Een bijvoegfel van de *Kaneel* van vijf
grij-

grijnen of van drie tot vijf droppels *laudan. liq. syd.* tot iedere gift, zijn merendeels toereikend aan ons doel te beantwoorden, Zijn zij het niet dan rade ik tot het afwisselend gebruik der *Kina* met slijmachtige middelen, met heulsap en ook deze niet voldoende tot zamentrekkende en aromatische. Eene beurtelingsche toediening van deze middelen en de *Kina*, bezit groote voordeelen en vermag meer als wanneer zij met haar gemengd, aangewend worden.

℞ *Puly. Gumm. Arab. unc. β.*

Op. depur. gr. II—IV.

Aq. Chamom. unc. VI.

— *Cort. Cinnam. unc. II.*

M. D. S.

Het eene uur eenen lepel vol, en
het andere eene gift *Kina*.

℞ *Rad. Columb. unc. β.*

Coq. cum suff. quant. aq. comm.

Per. ½ horae in vase clauso

Colat. unc. VII. adde

Puly. gumm. Arab. dr. III—VI.

Laud. liq. Syd. dr. I.

Syr. diacod. unc. I.

M. D. S.

Met de *Kina* afwisselend, om het
andere uur eenen lepel vol.

De gevallen die het noodig maken, de *Kina* wegens den buikloop geheel ter zijde te stellen, komen wel, echter niet zeer dikwijls voor, wanneer

neer geene fouten in de behandeling begaan zijn. Als intusfchen de buikloop een wezentlijk gevolg der *Kina* is, en niet ophouden wil, zoolang men met haar gebruik volhoudt, dan moet men ze geheel nalaten, en liever andere koortsverdrijvende geneesmiddelen, die beter verdragen kunnen worden, in haren plaats stellen, want de buikloop vernietigt de heilzame uitwerking welke de *Kina* anders hebben zoude, niet alleen, maar put de krachten nog meer uit. De *cascarilla*, de *columbo* en de *tormentilla* met *opium* zijn alsdan die middelen waarvan men het meest te verwachten heeft, en die men als de aanwijzing om de koorts te onderdrukken zeer dringend is, en de buikloop begint te bedaren in een afkookfel met de *Kina*, gevoegelijk kan toedienen.

7. Indien niettegenstaande de genoemde maatregelen van voorzorg, onaangename ontwaarwordingen in de maag op haar gebruik volgen, als maagpijnen, walging, braken enz. vergrootende hoeveelheid kancel, voege andere kruide-rijen daarbij, of meng ze met wijn aan. Gaan ze nuw toevallen of kramp daarmede gepaard, of komen zij als op zich zelve bestaande toevallente voorschijn, dan is het noodig de *kina* in vereeniging met *Castoreum*, *Heulsap*, *Serpentaria*, *Arnicae*, *Valeriaan*, *Cajeput* of *Menth-oly* toe te dienen. Ook van deze middelen zag ik doorgaans eene betere uitwerking, wanneer zij alleen en afwisselend met de *kina*, als wanneer zij

zij met haar in een mengfel gegeven werden. Prikkelende en aromatische oplegfels op de maag- en boven-buikftreek, inwrijvingen met *Linimentum Volatile* en *Laud. Liq. Syd.* en bij dringende omftandigheden eene Spaanfche-vliegpleifter, dragen zeer veel bij deze toevallen te bedaren; zelfs waar men alvorens de inwendige hulpmiddelen vruchteloos gebruikt had.

8. Het zuur in de maag (*ardor ventriculi*) is in zekere geftellen een niet zelden voorkomend verfchijnsel, gedurende het gebruik der *kina*, dat wel niet belangrijk genoeg is, om haar gebruik te ftaken, maar vele lijdens worden er door in den waan gebragt, van ze niet te kunnen gebruiken, en weigeren om er mede voort te gaan. Uit dien hoofde is het doorgaans noodig wel op dit toéval te letten, en waar het zich openbaart, door opflorpende middelen weg te nemen. Te meer nog kan dit veilig gefchieden, daar het gebleken is, dat de *kina* met *Loogzouten*, *Kalkwater* en *Magnesia*, voornamelijk de gebrande, verbonden, niets in hare koortsverdrijvende krachten verliest, maar integendeel eerder wint. Welk van deze middelen de voorkeur verdient, is nog niet beflist, de eene Geneesheer geeft aan dit, de andere aan het ander den voorrang. Twintig jaren geleden, waren de *Loogzouten*, tegenwoordig is de *Magnesia* heet meste in gebruik. Volgens mij-

ne ondervindingen, en die mij gedeeltelijk in eigen persoon betreffen, zijn de *Loogzouten* verre boven de *Magnesia* te verkiezen. Gewoonlijk bediene ik er mij van, op de volgende wijze.

Rp Pulv. Cort. Per. optim. unc. i.

Sodae. depur. dr. i

Aq. Chammom. unc. xii

Syr. cort. Aurant. unc. i

M. D. S.

Om het uur een half kopje.

Rp Pulv. Cort. Peruv. gros. unc. ii.

Coq. c. suff. quant. aq. pluvial.

Colat une xii.

adde

Sod. dep. dr. i.

Syr. cort. Aurant. unc. i.

M. D. S.

Om het uur een half kopje.

In de zamengestelde koortsen kan de *kinæ* ook met andere hulpmiddelen naar evenredigheid der aanwezige ziekten en toevallen, met minerale zuren *Aluin*, *Camphor* enz. vereenigt toegediend worden.

De tijd hoe lang en de hoeveelheid waarin zij, nadat de koorts-aanvallen zijn uitgebleven nog noodig is, schikt zich naar de bijzondere gesteldheden der lijdens. De bijzondere voorschriften en bepalingen daaromtrent door onderschei-

scheidene Genceesheeren vastgesteld, hebben juist door de individuele gesteldheden zoo vele uitzonderingen, dat, alhoewel zij in het oog moeten gehouden worden, toch nimmer algemeen en onbepaald te volgen zijn.

Zoo lang de lijders zeer zwak zijn, terwijl de eetlust ontbreekt, zij des nachts sterk zweeten, en zij op de dagen waarop de koortsaanval zoude terug gekomen zijn, indien hij niet ware onderdrukt geworden, zich minder wel, als op de andere dagen gevoelen, over hoofdpijn, laste smaak en dorst klagen, terwijl de pols schiekelijk is, en alle die ligte ziekte verschijnselen aanwezig zijn, bekend onder de benaming van binnenkoorts, dan moet men onafgebroken met de *kina* laten volhouden. Zoo dat de lijder de eerste drie dagen dezelfde hoeveelheid nog eens gebruikt, die noodig was om de koorts te verdrijven, den vierden en vijfden dag, de helft, en den zesden en zevenden, het vierde gedeelte.

Om de krachten volkomen te herstellen is het meerendeels nodig, ook nu nog, gedurende 3 of meer dagen, twee of drie maal daags eene halve of heele drachma met wijn te laten nemen of de *kina* met wijn afgetrokken te geven.

Om de zwakke spijsvertering en ontbrekende eetlust te herstellen, zijn de bittere middelen alleen of met de *kina* verbonden, zeer nuttig, en tot dat einde de *quassia*, de *gentiana*, het *absyntium* met *oranje-schillen* bijzonder aan te bevelen.

Ter vermijding van instortingen, en om voor te komen dat de lijders niet, bij een te lang volgehouden gebruik der *kina*, door gewoonte ongevoelig voor hare werking worden, raad men aan, dezelfde hoeveelheid, die men tot wegneming van de koorts noodig gehad heeft, vooral tijdens epidemien, in landstreken, waar het luchtgestel en de landaard de instortingen zeer begunstigen, en bij zeer zwakke aandoenelijke gestellen, de dubbelde hoeveelheid nog eens te gebruiken en in diervoegen te verdeelen, dat zij binnen zes of zeven dagen verbruikt wordt. Anderen willen, men zal de *kina*, na het uitslijven van den koortsaanval, terstond ter zijde stellen, en ze eerst weder toe dienen op de dagen waarop de instortingen gewoonlijk plaats vinden, dat is, voor de anderendaagse koorts op den zevenden, voor de daagse en derdendaagse op den veertienden, een en twintigsten en acht en twintigsten dag; en wel in diervoegen: op den zevenden dag laat men de eene helft van de hoeveelheid, welke tot het wegnemen der koorts noodig was, in groote giften en korte tusschen tijden, op den veertienden en een en twintigsten dag de andere helft in twee gelijke deelen verdeelt, gebruiken. Na de daagse en derdendaagse koortsen, de eerste helft op den veertienden, en de andere op den een en twintigsten en acht en twintigsten dag.

De

De gunstige getuigenisfen, welke men voor deze methode in de fchriften van onderscheide- ne Geneesheeren vindt, laten hare nuttig- en doelmatigheid niet in twijfel trekken. Intusfchen kan ik toch niet nalaten aan te merken, dat ik voor 16 jaren in een groot militair hospitaal, waarin destijds, gedurende verfcheidene maan- den, een getal van 4 tot 500 lijders met koude koortfen behandeld werden, en, na ge- noeg bij alle herftelden, inftortingen plaats gre- pen, van deze behandeling, met de grootste naauwgezetheid gevolgd, zelden aan de opge- vatte verwachting beantwoordende uitkomsten gezien heb.

2. Onderscheidene foorten van binnen- en buiten- landsche basten.

Ingevolge de hooge prijzen, uit zucht tot nieuwe ontdekkingen, uit eene herfenschimmige vrees voor kwade gevolgen, uit geneeskundige vooroordeelen, omdat in enkele gevallen de *kina* ontoereikende bleef de koorts te onderdrukken, en dikwijls ook uit onedele winzucht, hebben de Geneesheren, federt de invoering der *kina*, na plaatsvervangende geneesmiddelen gezocht, en zich voornamelijk tot onderscheiden boombasten bepaald, die dan eens met de *kina* gelijk ftaan, dan haar overtreffen zouden. Indien de erva- ring geftaafd had, al wat overdrevene lofredenaars van het een of ander dezer middelen beweerd hebben, dan zouden wij de *kina* gerustelijk uit

De apotheken verbannen kunnen. Maar, geenszins is dit het geval, zij is en blijft den eersten plaats innemen, dewijl de andere alleen in zeer ligte koortsen en onder andere gunstige medewerkende omstandigheden in staat bevonden worden eene tusfchenpozende koorts te genezen.

Tot diegene, waarvan men nog het meeste te verwachten heeft, behooren onder de uitheemsche: de *Cortex Angusturae*, *Cascarillae*, *regalis*, *china nova*, *mexicana* en andere bijsoorten, waarvan het nog onbekend is, van welke boomsoorten zij herkomstig zijn. Onder de inlandfche: *cortex Salicis laureae albae*, *Hypocastani*, *Quercini*, *Liliodendronis Tulipiferae*, *Aurantiorum*, *Pruni padi*, *Pruni spinosae*, *Fraxini excelsioris*, *Taxis baccatae*. Deze onderscheidene basten, worden op dezelfde wijze als de *kina*, in poeder, afkookfel, aftreksel en extract toe gediend, in giften tot de helft grooter, met uitzondering van de *cortex angusturae* en *regalis*. Van de *Taxis baccata* geeft men niet meer als twee drachma in poeder, en 10 tot 12 greinen in extract in de 24 uren. De zeer zamentrekkende wilgen en eiken bast worden alleen gegeven zelden goed verdragen, weshalven men kaneel, oranjeſchillen of andere opwekkende middelen mede verbind; bij buikloop en andere uitputtende ontlastingen doen zij zeer goede dienſten, vooral met de *kina* verbonden. Bij eene zwakke maag en ingewanden

den verdient de *angustura* en *cascarilla*, die ik bovendien voor de krachtigste van alle plaatsvervangende koortsmiddelen houden, hetzij alleen gegeven, of voor de helft met *kina* gemengd.

3. *Wortelen*. Als koortsverdrijvende geneesmiddelen hebben zich voornamelijk werkzaam getoond:

a. *Radix Arnicae, montana* vooral in verband met *kina*, bij hardnekkige koortsen met buikloop, de gift is van 10 greinen tot eene halve drachma, alle of om de twee uren.

b. *Radix Caryophyllae*. Van 3 tot 6 dragma, tusfchen twee koortsaanvallen gegeven, kan zij in ligte gevallen de koorts onderdrukken, tegen hardnekkige koortsen, en in najaarsepidemien is zij zelden voldoende bevonden.

c. *Radix Valerianae silvestris et celticae*. Zelden krachtig genoeg de koortsaanvallen te doen uitblijven. Met *kina* is zij tegens koortsen met het zenuwachtig karakter een van onze beste geneesmiddelen, men geeft ze in poeder van 15 greinen tot eene halve drachma, om het uur of om de twee uren, in aftreksel van eene halve tot eene geheele once.

d. *Radix Ipecacuanhae*. Als braakmiddel kort voor den aanval gegeven, vooral als deze met eene krampachtige gesteldheid der huidvaten gepaard gaat, en de bevordering van het zweet bedoeld wordt. Men geeft ze in kleine giften

alle 10 minuten, tot dat eenige brakingen gevolgd zijn. Gedurende de aanvallen wordt zij ook als een krampstillend en zweetdrijvend middel van een half tot een heel grein ieder uur gegeven. Walging of brakingen moet zij alsdan niet verwekken, en vinden deze plaats, dan behooren de giften tot de helft verminderd te worden of geheel achterweeg te blijven. Ligte koortsen kan men op deze wijze wel eens tot wijken brengen, doch overigens moet men juist geen groot vertrouwen in de koortsverdrijvende krachten van dit middel stellen.

4. Zaden.

a. *Semen Phellandrii aquatici*. Behoort onder de meettvermogende plaatsvervangende geneesmiddelen der *kina*. Het is vooral aangewezen, waar de koorts met aandoeningen der ademhaling-werktuigen verbonden is; in verband met de *kina* van twee tot drie drachma op eene once, of alleen wanneer de *kina* niet verdragen wordt, met zuiker in aftreksels 3 tot drachmen van 10 greinen tot eene halve drachma. Als men het in poeder geeft, moet vooral gezorgd worden dat het behoorlijk fijn is.

b. *Koffijboonen*. Vele beroemde in de geneeskunst geldende stemmen pleiten voor het koortsverdrijvend vermogen van dat middel, uit eigene ondervinding kan ik niet daarover oordeelen. Men geeft de ongebrande bonen in poeder, van 10 greinen tot eenen scrupel met zuiker en aromatieke bijvoegsels, om de twee uren, gedu-

durende de koortsvrije tusschentijd, of in afkookfel van 1 tot 2 lood met 7 oncen water tot de helft verkookt, met drie lood versch uitgeperst citroensap op de koortsvrije dagen, des morgens nuchteren. Men verhaaldt, genezingen met dit middel bewerkt, van koortsen die hardnekkig aan alle andere middelen wederstaan hadden.

- c. *Nux Vomica*. Kan in kleine giften tegen koortsen met zenuw toevallen, waar andere Narcotische geneesmiddelen aangewezen worden, mede van nut zijn. Als zuiver koortsverdrijvend middel is zij niet noemenswaardig, haar gebruik vordert omzigtigheid en zij is veel minder vermogend om zenuw toevallen te bedaren als het *opium*.

5. Kruiden en bloemen.

- a. *Arnica bloemen*. Een zeer werkzaam koortsmiddel, dat zelfs tegen verouderde zeer hardnekkige koortsen, met goed gevolg gebruikt wordt. Bij ongevoelige zwakke en rheumatische gestellen, schijnen zij wel het meest op haren plaats te zijn, men geeft ze in poeder, dat zeer fijn zijn moet, alleen of met *kina* van 5 tot 20 greinen om de twee uren, in aftrekfel van 2 drachma tot eene halve once.

- b. *Chamomil bloemen (flores chamomillae)*. Verdienen naast de andere bittere versterkende geneesmiddelen eene plaats, als koortsverdrijvende zijn zij krachtiger als andere, wegens hare aroma-

tieke bestanddeelen en krampstillend vermogen. Tegen ligte koortfen die nog niet lang geduurd hebben en vooral in voorjaarsepidemien, tel ik haar onder onze beste middelen; hare algemeene verkrijgbaarheid en matige prijs, vorderde dat zij meer algemeen in gebruik behoorde te zijn, als voor het tegenwoordige plaats heeft. Men geeft ze in poeder van eene scrupel tot eene dragma, om de twee uren met zuiker, of met fyroop in confers. Met de *kina* verbonden zijn zij werkzamer als alleen, en besparen in vele gevallen de helft van dat kostbare middel, in aftreksel zijn zij minder werkzaam en verdienen derhalven ook in die gedaante, minder algemeene aanprijzing.

- c. *Datisca cannabina*. Schijnt als koortsverdrijvend geneesmiddel eenige krachten te bezitten, men geeft ze in poeders van eene scrupel tot eenhalve drachma, dagelijks twee tot viermaal, op de koortsvrije dagen, of in extract van drie tot 6 greinen.
- d. *Absinthium*, *Centaurium minus*, *Trifolium fibrinum*. Verdienen nevens zoo vele andere bittere geneesmiddelen, naast de *Quassia*, *Gentiana* etc, eene plaats onder de koortsverdrijvende; men geeft ze in aftreksels, afkookfels, doch meest in extract, van eene tot drie drachma in vier en twintig uren. Bij verzwakte spijsverteering, bij verstopte buiksonstlasting slijmachtige ophooping en in de eerste wege,
- en

en in alle gevallen waarin de *kina* niet verdragen wordt, of zonder uitwerking blijft, verdienen zij beproefd te worden.

e. *Kruiderijen.* Weinigen van deze behoorrende zelfstandigheden zijn er, die niet als koortsmiddelen, het gezag van den eenen of anderen Geneesheer kunnen aanvoeren. Als hulpmiddel om den smaak te verbeteren, verdient vooral de kaneel en de aetherische oliën van inlandsche gewassen genoemd te worden, als koortsdrijvende zijn het de peper, de muscaatnoot, die echter meer als huismiddelen onder den gemeenen man, als onder de geneesheeren in gebruik zijn.

f. *Warme kruidebaden.* (Waartoe *Chamomillen*, *Melisse*, *Munt*, *Wynruit*, *Rosmary*, *Majolynenz.* gebezigt worden.) Verdienen in koortsen met het zenuwachtige karakter, bij zeeraandoenelijke gestellen, kinderen en voorwerpen, waar men met andere middelen weinig vermag, de opletendheid des Geneesheers; te meer daar zij tot de oudste geneesmiddelen behooren. Men wend ze kort voor den aanval aan, zoodat de lijder, voor dat de koude opkomt, zich in het bad bevindt. Hetzelve moet zoo warm zijn, als het de lijder verdragen kan, de badkuip gesloten, en de lijder zoolang er in blijven, als het de warmte toelaat, na drie of vier baden, heeft men de koorts zien weg blijven.

g. *Pappen van Tabak.* Gewone rooktabak met

watertot eene dikke pap gekookt, en bloot op de maagstreek gelegd, zoude somwijlen, hardnekkige door andere middelen ongeneesbare koortsen, genezen hebben.

- h. *Belladonna, Hyosciamus en Aconitum* verdienen nimmer als koortsverdrijvende, maar wel als narcotische middelen, waar deze, wegens bijzondere toevallen en gesteldheden aangewezen zijn, aangewend te worden.
- i. *Lichen parietinus*. Het nieuwste van alle de middelen, welke in onze dagen zich eenigen roem verworven hebben. Volgens den Schrijver van het Prijschrift te *Weenen*, bekroond, (G. C. H. SANDER). Zijn de bestanddeelen van dit mos, dezelfde als die der *kina*, het staat met deze in koortsverdrijvende krachten volkomen gelijk, zoo het haar niet overtreft. Waar de *kina* aangewezen is, is het dit middel insgelijks, men geeft het op dezelfde wijze, onder dezelfde voorzorgen, en in dezelfde hoeveelheid. Intusschen zullen meer proeven met dit middel moeten gedaan worden, in (*Holland* heeft men het nog in het geheel niet gebruikt,) alvorens stellig kan beslist worden, of de krachten van hetzelfde ook wezentlijk zoo veelvermogende zijn, als de Heer SANDER daarvan opgeeft.
6. *Opium*. Van de middelen uit het plantenrijk late ik hier het *opium* volgen, dat, volgens zijne nuttigheid, als koorts verdrijvend geneesmid-

middel naast de *kina* den eersten plaats inneemt, en als zoodanig uit de vroegste tijden tot op ons, zijnen roem heeft staande gehouden. Zijn gebruik vordert intusfchen groote omzigtigheid; de gevallen waarin het nuttig is zijn vrij naauw bepaald, en het verdient op verre na niet dien algemeenen en uitgebreiden roem als onbepaald koortsdrijvend middel, dien door de om te zucht overdrijven, aan hetzelfde is toegediend geworden. Bij asthenische koortfen met het zenuwachtige karakter, zenuwtoevallen en krampachtige gesteldheden, vooral bij kwaadaardige tusschenpозende koortfen, welkers aanvallen zeer lang duren en het leven gevaar drijgen; wanneer de lijder alleen kan gered worden, door den aanval af te breken en zenuwtoevallen te vermijden, behoort het niet onbeproefd te blijven. Bij gastrische gesteldheden, neiging tot het ontstekingsaardige karakter, gevoellooze zwakte en slaapzuchtige toevallen, is het schadelijk, ja doodelijk, wanneer men de ruime giften van eenige nieuwere Geneeskundige aangeprezen, toedient. Men gebruikt het in substantie, tinctuur of extract. Wanneer men eene spoedige en sterke werking bedoelt, geeft met het zuivere *opium* van eene vierde tot twee greinen, aan volwasfenen, of het *laud. liq. Syd.* van 10 tot 30 droppels op eens, het extract tot twee greinen. Eene minder hevige maar langzame en aanhoudende werking noodig oordeelende, om de verhoogde ge-

voo-

voeligheid en prikkelbaarheid te matigen, wordt het in kleine giften van eene achtste tot een vierde van een grein in substantie of extract, van drie tot zes druppels in tinctuur met water of wijn, om het half of geheele uur toegedient.

Om de koorts te onderdrukken, heeft men aangeraden, onmiddellijk voor den aanval, bij de eerste voorboden, een tot twee greinen op eens in te geven, en deze gift twee of drie malen te herhalen, waarmede men somwijlen slaagt, om het voorgestelde doel te bereiken.

Tegen langdurige en alle andere koortsen, waarin de ziekelijke wederwerking alleen tot het zenuwstelsel bepaald en in gewoonte gegrond is, verdient deze handelwijze aanprijzing en navolging, in alle andere gevallen is zij, mijns bedunkens, voor nadelig te houden.

In kwaadaardige met zenuw-toevallen gepaarde tusfchenpozende koortsen, vooral wanneer deze toevallen eene zeer opgewekte wederwerking in het zenuw- en hersengeftel aanwijzen, kramp, fluiptrekkingen en raaskallende ijlhoofdigheid aanwezig zijn, is het *opium* gedurende den aanval gegeven, het zekerste en vermogendste middel om deze toevallen te bedaren of te verhoeden, en den volgenden aanval af te wenden. Tot dit einde geeft men na den afloop der koude, of als de hette begonnen is, 20 tot 30 druppels *Laud. liq. Syd.* of een grein *opium* in substantie, of om de 10 minuten drie tot acht druppels *Laud.*
liq.

liq. Syd. de hette wordt daardoor verkort, het zweet bespoedigd en de zenuw-toevallen be-
daard. Dit doel bereikt zijnde, staakt men het
verdere gebruik van dit middel, geeft in den
koortsvrijen tusschentijd, de *kina* of een ander
aangewezen geneesmiddel; komt den volgenden
aanval terug, dan gaat men op dezelfde wijze
te werk.

Het *opium* kan ook met de *kina* vereenigd
gegeven worden, waardoor niet zelden koortsen
genezen, die te voren aan alle andere koorts-
drijvende middelen, zelfs aan de *kina* en het
opium alleen gegeven, wederstaan hadden.

7. *Wijn.* In alle koortsen waar *kina*, *opium* en
andere versterkende en opwekkende middelen
aangewezen zijn, is het ook de wijn, wijn-
geest, brandewijn *naphta* en andere geestrijke
vochten. Eene ruime teug goede oude wijn,
heeft bij oude, zeer verzwakte lieden, kort voor
den aanval genomen, de koorts wel eens doen
uitblijven. Doch de gevallen zullen zeer zeld-
zaam zijn, waarin men door dit middel alleen
met dat oogmerk toegediend, slagen zal. De
wijn is een gewigtig hulpmiddel, welks ge-
bruik echter meer tot de dieet behoort. In
tijden van Epidemien, rekent men denzelven tot de
beste voorbehoedmiddelen, wanneer men eenige
glazen tot, eene halve flesch dagelijks gebruikt.

De *Naphta* geeft men onmiddelijk voor den
aanval, van eene halve tot eene geheele drachma

op

op eens, met een aromatiek gedestilleerd water, en herhaalt deze gift bij de volgende, indien de aanval niet reeds met de tweede gift achterweeg blijft. Bij langdurige hardnekkige koortsen, die in eene tot gewoonte geworden wederwerking schijnen gegrond te zijn, kan men dit middel beproeven, voor mij zelve belove ik er mij weinig van, want in die gevallen waarin ik het gebruikte of zag gebruiken, heeft de uitkomst bijna nimmer aan de verwachting beantwoord.

8. *Stoffen uit het Dierenrijk.*

- a. *Castoreum.* Koortsen met het zenuwachtige karakter, heeft men na het gebruik van dit middel wel eens zien achterweeg blijven. Met dat oogmerk geeft men het van ééne scrupel tot eene drachma met pepermunt, of een ander gedestilleerd water, kort voor den aanval, op eens.
- b. *Spaansche vlieg-pleisters.* Zoo lang als stofelijke oorzaken aanwezig, of de koorts het stenische karakter heeft, zijn zij nutteloos en schadelijk. Door eene vermeerderde wederwerking in de nabijheid van die deelen, die ruim met zenuwen bedeeld zijn, om de huid op te wekken, kunnen zij in asthenische koortsen, mischien de ziekelijke terugwerking van het zenuwgestel bedaren, en naar zeker deel heente leiden, en den koorts aanval voorkomen. Tegen ligte koortsen met verhoogde prikkelbaarheid kunnen zij van nut zijn, doch zel-

den

den zullen zij aan het doel dat men bereiken wil, beantwoorden. Geneesheeren die er gebruik van hebben gemaakt, deden twee uren voor den aanval, eene groote Spaansche vliegpleister op de maagstreek leggen.

c. *Oleum animale Dippeli*. Van 20 tot 30 dropfels kort voor den aanval gegeven, zal volgens de waarnemingen van eenige Geneesheeren, dezelve onderdrukken.

d. *De Lym, Colla animalis* behoort tot die middelen, welke eerst sedert weinige jaren in gebruik gekomen zijn, en die voornamelijk aan schaarsheid van goede *kind*, en hare hooge prijzen in de oorlogsjaren, zijne beroemdheid, die bij de meeste voorbijgaande en zeer kortstondig geweest is, te danken hebben.

Waar versterkende geneesmiddelen en eene voedende dieet, aangewezen zijn, kan de lijm met zuiker en kruiderijen toebereid, als een voedend middel veilig gegeven worden. De onaangename smaak en de meerendeels half bedorvene toestand, waarin de gewone Schrijnwerkers lijm in de winkels ter koop aangeboden wordt, maar vooral de gemakkelijkerheid, waarmede men zich uit beenpoeder, verschmager vleesch van jonge beesten, den dierlijken lijm gestolt als gelei, of warm en vloeibaar als bouillon verschaffen kan, maakt het raadzaam deze laatste boven de lijm te verkiezen. Men kan de eene of andere kruiderij,

voor-

vooral de muscaat noot bijvoegen, en den lijder in den koortsvrijen tusfchentijd, om het uur of de twee uren, eene of twee oncen laten gebruiken.

- e. *Spinnewebbe, Araneum.* mede eene eerst federt weinige jaren aangeraden koortsverdrijvend geneesmiddel, dat indien het wezentlijk dit vermogen bezit, waarschijnlijk in zijne lijmachtige zelfftandigheid te zoeken is.

Om het te gebruiken laat men de gewone spinnewebbe, door kloppen zoo lang zuiveren - tot dat alle vreemdaardige deelen daarvan afgefcheiden zijn, uit 7 tot 9 lood vuil, verkrijgt men naauwelijks een lood zuiver. Van deze mengt men eene drachma met 12 looden boter, door het lang en zeer fijn op een plankje te hakken, fmeert deze boter op brood, en laat de lijders er zoo veel van eten, dat zij tusfchen twee koortsaanvallen van 30 tot 40 greinen gebruiken. Naar mate van den ouderdom geeft men meer of minder, de opgegevene hoeveelheid is voor volwasfenen van middelbare jaren, FAUST en AUTENRIETH willen de hardnekkigfte koortfen door dit middel genezen hebben, zonder immer eene nadelige uitwerking of onaangenaam toeval er van gezien te hebben.

Als een onfchadelijk middel kan men het beproeven; aanraden kan ik het niet, daar ik het zelf nog niet gebruikt heb, en het ook niet ligt doen zal, want volgens mijn gevoelen,

len, behoort het tot die klasfe van nuttelooze geneesmiddelen, waarmede onze apotheken bovendien overladen zijn.

9. *Zouten, metaalbereidingen en metalen.*

a. Het drankje van RIVERIUS (*potio Riveri*). In koortfen, in welke zich de ziekelijke wederwerking, die de koorts voortbrengt, vooral tot de maagzenuwen bepaald, en zich, als het ware, van daar over het zenuwgeftel uitbreidt; in gevallen dierhalven, waarin de aanval met krampachtige toevallen in de maag begint, deze zeer prikkelbaar en gevoelig is, weinig verdraagt of alles, wat de lijder gebruikt brakingen verwekt; misfchien ook, wanneer nog vreemdaardige ftoffen in de maag aanwezig zijn, is dit middel zeer nuttig en heilzaam, daar het de koortsaanvallen fpoediger doet afloopen en de lastigfte toevallen bedaart. Waarfchijnlijk berust de heilzame nitwerking van dit middel alleen op het koolzuur, dat zich bij deszelfs gebruik in de maag ontwikkelt. De beste wijze om het toe te dienen, is de reeds vroeger door ons opgegevene, waarbij niets van het zich ontwikkelende koolzuur verloren gaat. Men geeft het kort voor den aanval, of gedurende denzelfen, wanneer het aangewezen is.

b. *Loogzouten, Potasfa en Soda.*

Deze van één tot twee drachma, tufchen twee koorts-aanvallen gegeven, zouden fomwijlen de hardnekkigfte koortfen genezen hebben. Alleen

heb ik dezelve nimmer gegeven, en kan dus niet over dezelve nuttigheid op deze wijze toegediend oordeelen, in verband met *Kina* heb ik ze menigwerf met de schoonste uitwerking aangewend. Toen ik voor 16 jaren reeds bijna een jaar aan koude koortsen gelaboreerd had, die wel eens achterweeg bleven, maar telkens wederkeerden, en waartegen ten laatsten noch *Kina*, noch *Opium*, noch andere middelen eenige werking deden, gebruikte ik de *Kina* met *Soda*, anderhalve dragma op eene once, met het beste gevolg, de koorts week, en ik bleef van instortingen bevrijd. Verandering van woonplaats van *Leijden* naar *Gouda*, heeft daartoe ook misfchien het zijne bijgegebragt.

- e. *Ammoniak-zout*, *Murias Ammoniacae*. Heeft zich tegen langdurige koortsen, vooral met den derdendaagschen *typus*, met zwakke en ziekelijk gestelde ingewanden, nuttig bewezen. Men geeft hetzelfde alleen, of vereenigt met *tart. emeticus*, van vijf tot tien greinen, alle of om de twee uren, buiten de koortsaanvallen met de bittere extracten van de *Gentiaan*, de *Chamillen*, *Centaurium Minus*, *Millesolium* en *Trifolium Febrinum*, of *Kina* van twee tot drie drachmen. De hardnekkekkigste koortsen worden er dikwijls door genezen. In plaats van het ammoniak-zout, raad de beroemde RICHTER zeer tot het gebruik van de *Murias ferri ammoniacale*

(*flores*

flores Ammoniaci martiales) drie tot viermaal daags van 10 tot 30 greinen.

d. *Sulphas Cupri, (Vitriolum coeruleum). Sulphas Cupri ammoniacale, (Cuprum ammoniacum)*. De hardnekkigste koortsen wil men met dit middel genezen hebben. In gevallen waartegen men met andere middelen niets uitvoert, en geene stoffelijke of bijzondere oorzaken aanwezig zijn, kan men het beproeven. Men geeft het gewoonlijk met *Opium* van een half tot een heel grein, twee of drie maal daags, of kort voor den aanval. In grootere giften verwekt het ligt braken, drukking en pijn in de maag, weshalven men, met deszelfs gebruik omzigtig zijn moet.

e. *Sulphuretum oxyduli Stibii Hydrogenatum Sulphur auratum Antimonii*). In slijmachti-ge gesteldheden en traagheid der eerste wegen, verdient dit middel zeer geprezen te worden; tegen hardnekkige koortsen die reeds lang geduurd hebben, is het bijzonder op zijne plaats, men geeft den Goudzwavel, alleen, van een half tot een heel grein alle twee uren, of met *Kina*, *Opium* en andere middelen. Het hier volgend voorschrift, wordt voor een der werkzaamste gehouden:

R. *Sulphuret. oxyd. Stib. Hydrog. gr. i.*

Opii depurat. gr. j.

Pulv. Cort. Peruv.

— *flor. Chamom. a sc. ℞.*

M. F. pulv. dent. tal. doses viii.

S. Tusschen de koortsaanvallen
te gebruiken.

f. *Murias Hydrargyri oxydulati* (*mercurius dulcis*) komt vooral tegen langdurige koortsen met ziekelijke gesteldheden des levers te passe, of waar eene venerische gesteldheid aanwezig is, die de koorts onderhouden. Men laat het op de gewone wijze, van een tot vier greinen, dagelijks twee en drie malen, tot beginnende kwijling gebruiken, wanneer men er mede ophoudt. Als het kwijlen nalaat, maar de koorts voortdurende is, wordt het middel andermaal gegeven, en daarnevens ook andere aangewezen koortsmiddelen gebezigt.

g. Staal, *Limatura ferri*. Is tegen hardnekkige derdendaagsche koortsen, bij bleekzuchtige en waterachtige gestellen, en vooral bij opzwellingen der milt. met *Myhrrae*, bittere en aromatische middelen, van vijf tot tien greinen dagelijks drie of viermaal gegeven, een van onze krachtigste middelen, dat in vele gevallen alle andere overtreft.

h. Rottekruid, *Arsenicum album*. Meer tot waarschouwing als tot gebruik, spreke ik hier
van

van dit middel, dat ik mij ontzien zoude hebben te noemen, indien ik wist, dat ik tot deszelfs gebruik aanleiding geven mogt. Het is een der gewoonste bestanddeelen van zekere tinctuur, die men als geheim koortsmiddel in verkoop gebragt heeft. Kleine giften onderdrukken de koortsaanvallen, zelfs de hardnekkigste niet uitgezonderd. Maar wee den lijder die het gebruikt heeft! waterzucht, uitterende ziekten, verstoppingen in de ingewanden die alle met den dood eindigen, zijn de nimmer uitblijvende gevolgen. Vele lijders heb ik gezien die de koorts door *Arsenicum* waren kwijt geraakt, maargeene die niet door eene slepende ziekten aangetast waren, welke hun in het graf voerden. En, waartoe behoeven wij zulk een verschrikkelijk middel, dat reeds op zich zelf zoo gevaarlijk is, dat door de geringste fout in het voorschrift, bereiding en gebruik doodelijk wordt; behalven dat het zoo vernielend op de bewerktuiging inwerkt, dat nog na maanden en jaren zijne doodelijke uitwerkingen niet te miskennen zijn. Het spel dat in de laatste 25 jaren, met het menschelijke leven gedreven is, heeft ook op de geneeskunst zijnen invloed gehad, en de geringe waardering van hetzelfde, vele Geneesheeren tot de gewaagste proefnemingen met gevaarlijke middelen verleidt.

10. *Wrijvingen. (frictiones).* Langdurige koortsen zonder stoffelijke oorzaken of aandoeningen der

ingewanden, die zich door eene veranderde wederwerking in het zenuwengestel, laten genezen, heeft men wel eens door sterke wrijvingen van het geheele ligchaam, met wollen lappen in wijngeest gedoopt, gedurende een half tot een heel uur voor den aanval volgehouden, zien uitblijven.

- II. *Electriciteit* ter genezing van ziekten, dan eens te algemeen aanprezen, dan weder geheel vergeten, zelden op de haar toekomende plaats gesteld, heeft men ook ter genezing van tusfchenpoozende koortfen aangeraden. In langdurige gevallen waar men door eene plotfelinge en hevige werking op het zenuwgestel, zijne wederwerking wil veranderen, kan zij van nut zijn. Tot dat einde geeft men kort voor den aanval, eenige sterke fchokken met de Leijdsche flesch, in dier voegen, dat de electrike vonk voornamelijk die deelen treft, welke rijkelijk met zenuwen bedeed zijn, b. v. b. langs den ruggegraad en de maagstreek.

Vierde aanwijzing. Men wijzige de behandeling volgens den *typus*.

Daar bij eene doelmatige behandeling der tusfchenpoozende koortfen, voornamelijk op het bijzondere koortskarakter moet gelet worden, en iedere *typus* met de onderscheidene geaardheden kan voorkomen, zoo heeft deze weinig invloed op den aard der behandeling. Alleen in zoo verre is de *typus* voor de kunst-behandeling belangrijk, als hij mede behulpzaam is, om

omde bijzondere geaardheden, de plaatselijke aandoe-
ningen der ingewanden, den loop der koorts en uit-
gangen, te leeren beoordeelen. De daagfche en dub-
belde anderendaagfche *typus*, waarbij de aanvallen
vooruitspringen, en telkens langer aanhouden, geven
eene neiging tot den overgang in aanhoudende koort-
fen te kennen, en vorderen, om dit te verhoeden,
eene krachtige behandeling en fpoedig gebruik der
koortsverdrijvende geneesmiddelen. De anderendaag-
fche *typus*, maakt minder fpoed noodzakelijk, zoo-
lang hij regelmatig blijft, onregelmatig wordende,
moeten de koortsverdrijvende middelen, als er geene
bijzondere tegenaanwijzingen beftaan, terftond en
krachtig toegedient worden. Den derdendaagfche
typus, waarmede de koortfen zoo ligt langdurig wor-
den, en ziekelijke gefteeldheden in de ingewanden te
weeg brengen, moet men zoo ras de koortsmiddelen
aangewezen zijn, door fterke giften, onderdrukken.
Want eenmaal langdurig geworden zijnde, helpt de
Kina, en andere in hunne werking met haar overeen-
ftemmende geneesmiddelen weinig, en men voert
meer met *Sal-Ammoniac*, bittere middelen, *Sulphur*
auratum, *Mercurius dulcis* en andere daartegen uit.

Vijfde aanwijzing. Behandeling der zamengeftelde
tusfchenpoozende koortfen.

Onder de benaming van zamengeftelde koortfen,
zijn hier alle diegene te begripen, welke onder de
afdeelingen van kwaadaardige, onregelmatige, verge-
zellende en vermomde koortfen, voorkomen; als
mede die, welke met bijzondere ziekelijke gefteeld-

heden, gevaardrijgende toevallen, met eene kwade gecompliceerde geaardheid, verbonden zijn, en, eene bijzondere behandeling vereischen.

Uit al datgene wat wij reeds over de behandeling der koortfen in het algemeen gezegd hebben, zal het voor den eenigzins geoefenden kunsttoefenaar niet moeilijk zijn, de behandeling zoo te regelen, dat ook tevens aan de aanwijzingen in de hier bedoelde ziekten voldaan worden. Ten aanzien van de meer bepaald, zoogenaamde kwaadaardige vermoede koortfen, zal het noodig zijn, meer breedvoerig te spreken.

Nimmer heb ik kwaadaardige koortfen waargenomen, welke door flauwten, flaapzucht, beroerte en andere zenuwtoevallen, gevaar en den dood dreigden, als tijdens van Epidemien; meest in de zomer en het najaar, zelden in het voorjaar, dan meer, dan minder menigvuldig; het meest heb ik ze gezien en behandeld in het jaar 1809. Edoch, in eenige nabijgelegene fteden en plaatfen, heerschten zij algemeener als hier en in den omtrek. Hare kwaadaardige geaardheid verried zich reeds met den eerften aanval, deze was zeer hevig, duurde buitengewoon lang, het zweet was onregelmatig of zeer ruim, met de beginnende hette vielen de lijders in eenen vasten, zoo het fcheen zeer gerusten flaa die verscheidene uren aanhield, doch waaruit zij konden opgewekt worden. Met den afgaanden aanval ontwaakt zijnde, gevoelde zich de zieken buitengemeen zwak en lusteloos, hunne kleur was, hoe bloeiend die ook voor den aanval mogt geweest zijn, geel-
ach-

achtig bleek, het aangezicht ingevallen, de tong sterk bezet; bij eenigen zag men buikloop, bij anderen verstoppte ontlasting. Gewoonlijk hielden de koortsen den anderendaagfchen of dubbeld anderdaagfchen *typus*, of den 8 tot 12 uren vooruitspringende derdendaagfchen, den daagfchen heb ik niet gezien. Iedere aanval vervroegde van vier tot zes uren, en ging met telkens verflimmerende toevallen gepaard, bij eenige begon de tweede, bij andere de derde, met flauwte, stuip-trekkingen en tusfchenpoozende pols, de koude was buitengemeen hevig en langdurig, de hette matig, het zweet ongelijkmatig en zeer ruim. De flap die in de eerfte aanvallen voor nog bijna natuurlijk konde doorgaan, werd nu fnorkend, en de lijdens konden niet opgewekt worden. Aan zich zelven overgelaten, eindigde de derden, vierde of vijfde aanval met den dood, door beroerte, flapzucht of flauwten.

Allen, waarbij de behandeling krachtig en doelmatig was ingerigt, herstelden, maar doorgaans zeer langzaam en kregen hunne gezondheid eerst dan volkomen terug, na regelmatig verloopene instortingen. Somwijlen gebeurde het ook, dat zich het kwaadaardige karakter, uit eene zich eenvoudig en goed-aardig voordoende koorts, na den vijfden aanval ontwikkelde. In de behandeling volgde ik de voorschriften dier Geneesheeren, welke men over het algemeen beschouwd, deze koortsen het beste beschreven en het doelmatigst behandeld te hebben. De uitkomsten beantwoordeden aan de billijke daarop gegronde verwachtingen. Zoo ras zich bij het

eerst goedaardig toefschijnend koortskarakter, ongewone en iets kwaads voorspellende toevallen voegden, als flauwtens, diepe lang aanhoudende snorkende slaap, meer dan gewone, als het ware plotselinge krachttuitputting, gaf ik terstond de *Kina*, in groote meerendeels dubbelde giften, om den volgenden aanval te onderdrukken, waarmede men wel niet altijd volkomen, maar toch in zoo verre slaagde, dat hij minder hevig en gevaardreigende was. Het volgehouden gebruik der *Kina* in ruime giften, tusfchen de volgende aanvallen, hield deze dan ook gewoonlijk terug. Als men zeker van zijne zaak zijn wilde dan moesten twee of drie oncen *Kina* in de vrije tijd, tusfchen twee aanvallen gebruikt worden, een bijvoegfel van wijn of kruiderijen deed ze wel verdragen.

Wanneer de koorts oorspronkelijk het kwaadaardige karakter had, liet ik terstond, na afloop van den eersten aanval een braakmiddel uit *Ipecacuanha* en *Tartarus Emeticus*; buikloop aanwezig zijnde, alleen de eerste gebruiken. Een uur nadat het braken opgehouden heeft werdt met de *Kina* een begin gemaakt, en deze in eene hoeveelheid gegeven, dat binnen de waarschijnlijken koortsvrijen tusfchentijd, op het midden getal uren van den daagschen en anderendaagsche koorts op 18 berekend, twee oncen verbruikt werden. Voor de eerste giften is de maag meerendeels nog zeer aandoenlijk, en er ontstaan walging en brakingen; om dit voor te komen, is het noodig de eerste drie of vier giften niet grooter
als

als tot eene scrupel met wijn of kruiderijen gemengt, toe te dienen, dan vermeerdert men iedere gift met 10 greinen, zoodat de laatste vijf óf zes giften eene drachma bedragen, en om de drie kwartier uur gebruikt worden. De volgende aanval is dan gewoonlijk minder hevig en de toevallen minder gevaar dreigende.

Zoo ras cenige voorlopende toevallen den naderenden aanval aankondigen, blijft de *kina* staan, en het volgende mengfel wordt gedurende den aanval gegeven, waarvan ik doorgaans eene betere uitwerking, als van de ruime giften *Laud. Liq. Syd.*, door andere Geneesheeren in den aanval aangeraden en toegediend gezien heb:

Rp. Carbon. Ammoniae Pyro animal. liquid.
Aether. Sulphuric. Alcoholic. a drii.
Aq. Menth. unc. viii.
Syr. Diacod. unc. j.

M. D. S.

Om het uur eenen lepel vol.

In die gevallen waarin de gevaardreigende toevallen meer kramp en stuipachtig, als slaapzuchtig zijn, verdient zekerlijk het *Opium* en zijne bereidingen den voorrang. Het *Laudanum Liq. Syd.* kan dan wel tot 25 droppels in het opkomen van den aanval op eens gegeven worden, want waar de *opiata* aangevozen zijn, moeten zij in ruime giften, niet later dan in het tijdperk der voorloopers en, op de tijden
 der

der eerstvolgende aanvallen herhaald, toegedient worden.

De lijders volstrekt bewusteloos zijnde, en niets kunnende doorzwelgen, komen inwrijvingen met *Aether* en *Laud. Liq. Syd.* op de maagstreek en onderbuik, om de twee uren herhaald, te pasfe, te gelijktijdig laat men mostardpappen en Spaanschevliegen pleisters aan de kuit en voetzolen leggen, en prikkelende lavementen uit een afkookfel der *Kina*, met *Valeriaan*, *Asfa foetida* enz. om de twee uren inspuiten. Terstond als de aanval afgeloopen, en de lijder tot kennis gekomen is, wordt met de behandeling in de aanval opgehouden, en met de *Kina* in dezelfde giften, als te voren, begonnen en voortgevaren, indien het zijn kan; in nog grootere giften.

De hoeveelheid *Kina* noodig om dit soort van koortsen meester te worden, moet dikwijls buitengemeen groot zijn, alvorens ons doel bereikt wordt. Eenmaal liet ik telkens tusfchen twee aanvallen, twee afkookfels van twee oncen *Kina*, met eene once in poeder, en dus zes oncen gebruiken, en des niettegenstaande kwamen de aanvallen, met alle hare gevaarlijke toevallen, driemaal terug, eerst in de vierde, die nog buitengewoon hevig en langdurig was, bleef de lijder zich zelfs bewust. De zevende aanval bleef achterweeg, de lijder had in iedere vrije tusschentijd nog twee en drie oncen *Kina* ingenomen. Gelijk het hier onbetwistbaar is dat de *Kina* het middel was, waaraan de lijder zijn le-

leven te danken had, zoo was het ook in alle andere gevallen, waarin het leven gered wierdt.

Is men gelukkig genoeg om op deze wijze de koorts tot staan te brengen, of de kwaadaardige, in eene eenvoudige goedaardige te veranderen, dan moet de *Kina* nog steeds in ruime giften en zoolang voortgebruikt worden, tot dat zich de lijder volkomen gezond bevindt, de krachten hersteld zijn en de eetlust wedergekeerd is.

Zeer weinige lijders heb ik gezien, die zonder instortingen volkomen herstelden, de meeste bleven, nadat de koortsaanvallen hare kwaadaardigheid verloren hadden, of geheel na lieten, van tijd tot tijd met binnenkoortsen bezet, zeer zwak, des nachts sterk zweten, eene beflagene tong, geene eetlust en verstopte buiks-ontlasting behouden. De groote hoeveelheid *Kina*, schijnt hier de prikkelbaarheid en gevoeligheid te zeer verdoofd en eene ophooping in de maag en darmbuis veroorzaakt te hebben. De *Kina* en andere versterkende middelen bleven toen zonder eenige uitwerking, er grepen *recidiven* plaats, met het eenvoudige gastrische karakter enden anderendaagfchen *typus*. Een braak- of laxeermiddel, en daarna bittere middelen met wijn, deden de koorts meerendeels met den derden aanval uitblijven en de lijders herstelden nu spoedig en duurzaam. Alleën in die gevallen waarin de koorts langer aanhield, liet ik de *Kina* weder op de gewone wijze gebruiken, doch altijd eerst dan wanneer andere middelen
niet

niet hielpen en de aanwijzingen voor haar gebruik, duidelijk waren.

Door veelvuldig waarnemen, den natuurlijken loop dezer koortsen hebbende leeren kennen, heb ik naderhand, als de kwaadaardige toevallen verdwenen waren, en met de *Kina* nog eenige dagen volgehouden was, maar de straks genoemde toevallen ten voorschijn kwamen, zonder zwaarigheid te maken, een braak- of laxeermiddel met *Rhabarber* toegediend, de *recidiven*, en worden hierdoor ook de volkomene genezing oogenfchijnlijk daardoor bevorderd.

In de behandeling van deze koortsen, vooral als zij met toevallen van beroerte gepaard gaan, heeft men ook bloedontlastingen aangeraden, bij jonge volbloedige personen met eene vermeerderde en sterke aandrang van bloed naar het hoofd, zoude ik geene zwaarigheid vinden, van eenige bloedzuigers aan de slapen des hoofds, of op het voorhoofd te zetten, maar ruime bloedontlastingen door aderlatingen ten sterksten afraden. Mij zijn geene gevallen voorgekomen waarin zij aangewezen waren, integendeel, waren mijne lijders, steeds voorwerpen van een zwak ligchaams- en zeer aandoenlijk zenuwgestel.

Het *Opium* heb ik minder algemeen aangewezen gevonden, als zulks wel bij andere Geneesheeren het geval geweest is. Daar datgene, wat men zelve ziet en waarneemt, altijd éenen sterkeren indruk maakt, als wat ons door andere verhaald wordt, zoo aarzele ik ook niet, aan de *Kina*, behalven in die gevallen, waarin ik het *Opium* voor bijzonder
aan-

gewezen houde , verre boven hetzelfde den voorrang te geven.

Het aangevoerde , van den beroemden RICHTER , dat ruime en sterke giften *Arcenicum* in den koortsvrijen tusschentijd een goed gevolg hebben zouden ; behoort , mijns bedunkens , tot de gewaagste en gevaarlijkste stellingen van dezen grooten praktischen arts , welke men van zijnen bezadigden geest niet verwachten zoude , en waartegen men niet genoeg waarfchouwen kan.

Er is ons nu nog overig van de behandeling der vermonde tusschenpoozende koortsen te spreken , zoolas men zich , door de regelmatigheid der aanvallen en tusschenpoozingen eener ziekte , welke zij ook wezen moge , overtuigt heeft , dat zij den naam eener vermomde koorts verdient , moeten zij volgens de geaardheid der toevallen en haar bijzonder karakter , gelijk andere tusschenpoozende koortsen behandeld worden. *Kina* en *Opium* zijn ook hier de middelen waarop alles aankomt. De eerste geeft men volgens de algemeene regelen , die haar gebruik bepalen , niet in , maar buiten den aanval , in grootere of kleinere giften , geëvenredigd aan de noodzakelijkheid om de aanvallen spoedig te onderdrukken. Gewoonlijk moeten de giften grooter zijn , en haar gebruik langer volgehouden worden als tegen eenvoudige koortsen.

Het *opium* komt ook hier alleen te pasfe , wanneer de ziekte met krampachtige toevallen gepaard gaat. De giften moeten ruim zijn , kort voor den aanval

val gegeven, en op den tijd van de volgende aanvallen nog eenige malen herhaald worden. Bij eene periodische hik, die regelmatig om den anderen dag wederkeerde, zeer hevig was, eenige uren aanhield en met zweet eindigde, hielp het *Opium* niets, en hij bleef eerst na ruime giften *Kina* achterweeg. Hetzelfde ondervond ik nog eenmaal bij eenen anderen lijder, die door tusschenpoozende zenuwtoevallen met ijshoofdigheid aangetast werd, zij begonnen met kouderillingen, eindigden met zweet, en deden de krachten zeer spoedig en sterk verminderen. *Opium*, *Castoreum*, *Valeriaan*, *Liquor Anodynus Hoffm.* en andere middelen meer, bleven zonder de minste uitwerking. De *Kina* tot anderhalf oncen in poeder tusschen twee aanvallen gegeven, deed dezelve met den derden, nadat men met de *Kina* begonnen was, achterweeg blijven. Veertien dagen daarna werd de lijder door schrik andermaal van deze ziekte aangetast, die ook nu even als te voren regelmatig wederkerende aanvallen maakte, en door *Kina* moest genezen worden. Sedert (ruim een en een half jaar geleden) geniet de lijder de volkomenste gezondheid.

Zesde Aanwijzing. Behandeling der genezenden, en afwering der instortingen.

De behandeling der genezenden van tusschenpoozende koortsen, is in de meeste gevallen van het grootste belang, zoowel om de gezondheid duurzaam te doen zijn, als om wederkerende aanvallen en de zoo gewone naziekten, dikwijls belangrijker

ker en gevaarlijker als de koorts zelve te verhoe-
den.

Bij het opgeven der voorzorgen, die men in acht moet nemen, als de koortsverdrijvende geneesmidde-
len doelmatig zullen gegeven worden, is reeds veel
gezegd, dat hier vooral behartiging verdient. Zelden
zijn de gevallen, waar men den lijder, onmiddellijk
na het uitblijven der koortsaanvallen, gezond noe-
men, en alle verdere geneeskundige behandeling
voor overbodig houden kan. De meesten bevinden
zich zeer verzwakt, de eetlust ontbreekt, de slaap
is onrustig, zij zweeten sterk, na de minste bewe-
ging en des nachts, zijn zeer gevoelig tegen weers-
veranderingen, tegen de koude, en klagen over
koude rillingen, hoofdpijn en vermoeidheid. Zoo-
lang als deze toevallen of eenige van dezelve aan-
wezig zijn, moet de lijder even zorgvuldig, als ge-
durende de koorts behandeld worden. Men laat hem
tot dat einde, op de hier voren opgegevene wijze, de
kina voortgebruiken, tot zoo lang, dat de krachten
hersteld, en alle andere toevallen geweken zijn.

De herstellende lang zwak en zonder eetlust blij-
vende, niet tegenstaande dat de *kina* in toereikende
giften en aanhoudend gebruikt is; moet dezelve met bit-
tere middelen vermengd, of deze laatsten alleen toege-
diend worden. De buiksontlasting, die dan meerendeels
verstopt is, onderhoud men door kleine giften van
Rhabarber en *Aloë*; de *Middenzouten* zijn wegens
hunne verzwakkende uitwerkselen nadeelig, en be-
vorderen de instortingen; voor het overige moeten

de herstellende, even als na andere koortsen, zich nauwkeurig tegen de schadelijke invloeden wachten. Matige bewegingen in de open lucht, behoorlijke nachtrust, warme kleeding, eene goede leefregel, geruste en opgebeurde gemoedsgesteldheid zijn zeer nuttig; daarentegen zijn vermoeijende bewegingen, groote kracht-inspanning, buitensporige levenswijze, neerslagtigheid, kommer en verdriet, schadelijk.

Met de meeste zekerheid mag men hopen de instortingen te verhoeden, wanneer de lijdens niet eerder als na dat hunne krachten hersteld, en de tijdperken der instortingen voorbij zijn, uit de geneeskundige behandeling ontslagen worden. De lijdens te vroeg voor genezen te houden, en ze tot hunne gewone bezigheden, betrekkingen en levenswijze te laten terug keeren, zijn de meest gewone oorzaken der instortingen. De zwakte en groote aandoenlijkheid, die bij alle van koortsen herstelde personen, nog eenigen tijd terug blijft, heeft ten gevolge dat zij onbestand zijn tegen Endemische, Epidemische en alle andere schadelijke invloeden, die verzwakkend inwerken.

De eetlust, die gewoonlijk wanneer zij eenmaal wedergekeerd is, zeer sterk en overmatig wordt, dewijl de spijsverterings-werktuigen zich nog in eenen toestand van zwakte en kwijning bevinden, heeft ligtelijk gastrische ophopingen en daar uit spruitende instortingen ten gevolge. Zoo als ook de te groote aandoenlijkheid van het huid *Orgaan*, dezelve

voor

voor belemmeringen in de uitwasemingen vatbaar maakt.

Zelden is het de eene of andere schadelijkheid alleen, die instortingen veroorzaakt, meerendeels komen onderscheidene te gelijk bij elkanderen, en wordt de eene door de andere geholpen.

Indien het niet mogelijk geweest is, door eene doelmatige behandeling der herstellende, met *kina* en andere koortsverdrijvende geneesmiddelen, en door eene wel ingerigte leefregel met al wat daar onder kan begrepen worden, de instortingen te verhoeden; het zij, dat zij door fouten en verzuim des Geneesheers, des lijders, of andere toevallige omstandigheden zijn te weeg gebragt; kunnen zij nimmer naar eene en dezelfde aanwijzing, maar moeten even als de voorafgegane koortsen, volgens het bijzondere karakter en den aard der toevallen behandeld worden. Het is eene groote dwaasheid, die nog door vele begaan wordt, iedere wederkeerende koorts als een gevolg van gastrische ophooping te beschouwen, en de genezing onbepaald met braak- en laxermiddelen te beginnen, en voor aangewezen te houden.

Over het algemeen genomen kunnen de instortingen spoedig door *kina* onderdrukt en genezen worden; doch dit moet ons niet tot de stelling verleiden, dat men niet noodig heeft, op eenige andere aanwijzing acht te slaan.

De leefregel in de tusschenpozende koortsen, schikt zich naar hare langere of kortere duur, naar

den tijd van den aanval, den vrijen tusschentijd en het bijzondere karakter der koorts. Gedurende de eerste 3 tot 7 aanvallen, ontbreekt de eetlust geheel, maar de dorst is zeer sterk. Zoo lang er geene eetlust is, moet de lijder van het spijsgebruik geheel afzien, daar alles wat hij dan nuttigt, de maag bezwaart en de koortsaanvallen heviger maakt. Om de dorst te stillen, laat men naar welgevallen, den een of anderen drank voor koortslidders aangeprezen, drinken. De koorts langer geduurd hebbende, komt de eetlust en wel in versterkte maten op de koortsvrije dagen terug, de lijders zijn hongerig, gulzig in het gebruik van spijs, en hebben niet zelden, tot de eene of andere spijs een onweersaanbare trek. De eetlust geheel en onbepaald naar welgevallen des zieken te bevredigen, is doorgaans even schadelijk als eene al te strenge dieet, die de lijder uit hongerd. Het beste is, dat hierin met matigheid en dikwijls eten, voorzien worde terwijl de kost bij beschuit, vruchten, groentens, bouillon waar het vet van afgenomen is, jong vleesch in kleine hoeveelheid, bepaald blijft. Visch, vette spijsen, gebak, ingelegde groentens, peulvruchten, zwaar verteerbare vleeschsoorten moeten volstrekt vermeden worden.

In die gevallen, waarin zich de trek tot eene bijzondere spijs bepaald en zeer sterk is, mag met omzigtigheid daaraan voldaan worden, want men heeft niet zelden ondervonden, dat de koortsaanvallen daardoor achterwege blijven en de lijders spoedig ge-

genezen worden. (dit noemt de gemeene man, de koorts af ëten, waartoe onder hun, haringen en andere fcherpe, fterk gezoutene dingen in gebruik zijn).

De koorts nagelaten hebbende, ftaat men aan de herftelde een ruimer fpijsgebruik, en allenskens terugkeer tot hun gewoon voedsel toe.

Gedurende de koortsaanvallen moeten de zieken in het geheel geen voedsel gebruiken, en zich alleen tot dranken bepalen. Ook kort voor of na den aanval is het fchadelijk, er behoort ten minften een uur tufchen de maaltijd en den aanval in te zijn.

Ten aanzien van de bijzondere geaardheden der koortfen, behoort de leefregel ingerigt te worden, volgens al datgene, wat bij iedere koortsfoort deswegen gezegd is.

De fleepende naziekten, welke zoo dikwijls op tufchenpoozende koortfen volgen, of daaruit overig blijven, als: waterzucht, geelzucht, trommelzucht, gezwollene ingewanden, vallende ziekte, zenuwtoevallen, aamborstigheid, blindheid, doofheid enz., welke veelal aan eene verkeerde behandeling, en door het gemeen doorgaans aan de *kina* toegefchreven worden, moeten hier nog kortelijk worden aangehaald.

Eene ondoelmatige of verkeerde behandeling kan allezins deze naziekten ten gevolge hebben, maar dat de gebruikte *kina* zeldzaam daaraan eenig deel heeft, wordt door de ervaring in iedere koorts-Epidemie bewezen, want het zijn altijd die patien-

ten, welke er door aangetast worden, die weinig of in het geheel geene *kina* gebruikt hebben, maar met oplosfende en ontlastmiddelen mishandeld zijn. En men heeft ondervonden, dat de *kina* juist het meest vermogende middel is, om het zekerst deze naziekten te genezen.

Als de oorzaken der koorts wezenlijk materieel geweest zijn, in ziekelijke ophopingen in de eerste wegen, ziekelijke gesteldheden der ingewanden, venerische en andere smetstoffen bestaan hebben, of deze in den loop der koorts daar bij kwamen, kan zekerlijk een voorbarigen overmatig gebruik der koortsverdrijvende geneesmiddelen, tot deze naziekten aanleiding geven, die alleen door de wederkeerende koorts spoedig en zeker kunnen genezen worden. Eenige Geneesheeren hebben in zoodanige gevallen ook aangeraden, de behandeling zoo in te rigten, dat zij de instortingen bevordert of zelfs te weeg brengt, door braak-, laxeer- en oplosfende middelen in ruime giften toe te dienen, en eene verzwakkende leefregel te doen houden. Anderen willen dit bewerken, door den lijder met eenen anderen koortsljder gedurende dat zich deze in het zweet bevindt, in een bed en onder eene deken te laten liggen. Nog anderen, gelijk THOMSON, om de koorts-aanvallen na te bootsen, door den lijder eerst in een koud bad te brengen, en vervolgens sterk met wollene doeken te wrijven in een warm bed te leggen, en veel warme thee te doen drinken. Maar, behalve dat men zelden slagen zal,

noch

noch door het een of door het ander van deze middelen zijn oogmerk te bereiken en de koorts terug brengen, heeft zij, terug gekeerd zijnde eerder verslimming als genezing ten gevolge, daar de gebezigde methode in de meeste gevallen eenen zeer nadeeligen invloed uitoefent. Veel doelmatiger is het dierhalven gehandeld, deze naziekten volgens hare geaardheid en oorzaken te behandelen.

De gastrische ophoopingten moeten op de meest geschikte wijze ontlast worden enz.

Dikwijls staan de slepende naziekten met de koorts in hoegenaamd geen verband, de daarmede behepte lijdens, worden door de koorts aangetast, gelijk vele andere personen, die volkomen gezond waren. Of deze ziekten ontwikkelen zich gelijktijdig met of na den afloop der koorts.

Intusschen oefenen beide ziekten, waar zij met elkanderen bestaan eenen wederkeerigen invloed op elkanderen, en de behandeling moet zich volgens de geaardheden van beiden, regelen, of gewijzigd worden.

De vruchtbaarste oorzaak van alle naziekten, is zwakte en uitputting, te weeg gebragt door de langdurigheid der koorts en verzwakkende geneeswijze. Uit dit oogpunt beschouwd, is het gezegde van VON HOVEN, dat de slepende naziekten, de geelzucht, waterzucht, verstopte en gezwollene ingewanden enz., door de *Kina* zeker genezen worden, wanneer men ze in toereikende hoeveelheid roedient, toepasselijk, mits dat men de bijzondere

gestellen, en de deelen der bewerktuiging, die het meest geleden hebben en, nog lijden in het oog houde en de behandeling in diervoegen ingerigt is, dat daarmede aan de onderscheidene aanwijzingen voldaan worde.

Eene en dezelfde verzwakkende oorzaak, zoo als wij die kennen, brengt bij den eenen zwakte en onregelmatigheid in de verrigtingen van het klier en watervaatstelsel, bij den anderen zenuwzwakte, bij den derden eene opgeloste gesteldheid van het bloed, meest gepaard met groote zwakte der spieren, bij eenen vierden werkeloos- en traagheid in het eene of andere werktuig en ingewand voort; terwijl in andere gevallen uitputtende en smeltende ontlastingen het eenige gevolg der verzwakkende oorzaak schijnen te zijn, en de onderdrukking daarvan her vereischte is, om de gezondheid te herstellen.

Deze, zoo zeer verschillende uitwerking van eene en dezelfde oorzaak, geeft hoewel zij moeilijk te verklaren is, ten minsten regt, om te veronderstellen dat eene grootere of mindere voorgeschiktheid tot ziekte, in de onderscheidene stelsels en werktuigen onafhankelijk van de koorts moet aanwezig zijn, die de ontwikkeling van de slepende naziekte mogelijk maakt, en haar vooraf gaat.

Hetzelfde wat wij van de algemeene en bijzondere inwerking der verzwakkende oorzaken gezegd hebben, geldt ook ten aanzien der versterkende geneesmiddelen, die de geheele bewerktuiging versterken
en

en herstellen, en tevens ook op ieder afzonderlijk deel haren weldadigen invloed uitoefenen. Maar behalven deze bezitten wij ook nog andere geneesmiddelen, die meer bepaald op een stelsel en werktuig inwerken, zonder dat de overige daarin deelnemen.

Volgens deze grondbeginselen, behoort de behandeling der naziekte ingerigt te zijn, indier voege, dat men tevens een algemeen versterkend geneesmiddel geve, waartoe de *Kina*, de bittere, en de staalmiddelen het geschiktste zijn, en toegedient worden, om dat zij, blijkens de ondervinding, meer bepaald op het eene of het andere stelsel inwerken, en de kwijnende verrigtingen tot den gezonden toestand terug voeren.

Bij zuchtige zwellingen en waterzucht, geve men met de *Kina* pisdrijvende middelen, de *Squilla Digitalis* en de *Geneverbesen* in afkookfels of *Conferf*.

Bij verstoppingen of liever zwellingen der buiksgewanden, voege men kwikmiddelen, *Belladonna Cheledonium*, *Cicuta* en *Aconitum* daarbij, voornamelijk wanneer deze zwellingen met geelzucht gepaard gaan; ook inwrijvingen met kwikzalf in de leverstreek zijn alsdan zeer dienstig.

Tegen zenuwtoevallen verbinde men de *Valeriaan* de *Orange bladen*, de *Flores zinci*, het *Cuprum ammoniacum* met de *Kina*.

Zijn er smeltende buikonlastingen aanwezig, geve men *aluin*, *tormentilla* en *opium*.

Tegen uitpuittend zweet dezelfde middelen met de

Kina, voornamelijk echter met het *Saly-aftreksel*, en de *minerale* zuren vereenigd.

Voor de meeste lijdens zal het dan nog nuttig zijn, dagelijks eenige glazen wijn, ligt verteerbare en voedende spijzen, met terzijde stelling van alle warme verflappende dranken, te gebruiken. Als in den loop van deze behandeling de koorts terug komt, dan moet zij niet terstond onderdrukt, maar gedurende eenigen tijd aan zich zelve overgelaten worden.

In dien het de krachten toelaten, moet zich de lijder dagelijks zoo veel mogelijk bewegen, kleine wandelingen doen, te paard of in een wagen rijden, van tijd tot tijd een warm bad nemen, zich warm kleden, eene goede leefregel in allen opzigten volgen, en tot dat alle ziekelijke verschijnselen geweken, zijn met alles volhouden. Ook dan nog zal het bij de meesten noodig zijn, dat zij gedurende eenigen tijd, warme dranken, vette, moeilijk verteerbare spijszemijden, een goed uitgegerst en gehopt bier, en eenige glazen wijn op bittere kruiden getrokken, dagelijks drinken.

D R U K F O U T E N.

| | | | | | |
|------|-----|-------|----|--|------------------------------------|
| Pag. | 14 | regel | 6 | staat: de dus werkende lees: en dus wer- | kende die. |
| — | — | — | 22 | — | harc. |
| — | — | — | 20 | — | comentosa. |
| — | 21 | — | 30 | — | regtschapen |
| — | 25 | — | 1 | — | de sterke |
| — | 84 | — | 1 | — | moet echter |
| — | 106 | — | — | — | de aanmerking behoort in den text. |
| — | 121 | regel | 26 | staat: hals en voetbaden lees: halve- en voet- | baden. |
| — | 124 | — | 7 | — | Gr II |
| — | 125 | — | 5 | — | in de |
| — | — | — | 14 | — | verschillende |
| — | 126 | — | 18 | — | vaten |
| — | 133 | — | 3 | — | op hem |
| — | 139 | — | 25 | — | peterchiaë |
| — | — | — | 28 | — | metastasische ont- |
| — | — | — | — | — | stekingen. |
| — | 158 | — | 29 | — | die in hersenen |
| — | 161 | — | 1 | — | alle andere |
| — | 164 | — | 10 | — | . . . II. |
| — | 168 | — | 31 | — | halsbaden |
| — | 176 | — | 14 | — | Laud. Liq. Vid. |
| — | — | — | 29 | — | volstrekte |
| — | 177 | — | 14 | — | een zenuwtoeval |
| — | 185 | — | 1 | — | waar te nemen |
| — | 186 | — | 21 | — | typhns nervsa |
| — | 211 | — | 27 | — | ol. cin. unc. 3 I-II. |
| — | 229 | — | 16 | — | die ons de meest |
| — | 231 | — | 21 | — | of in een stuk |
| — | 246 | — | 16 | — | en de bijzondere |
| — | 252 | — | 23 | — | den winter |
| — | 256 | — | 13 | — | en de aanvallen |
| — | 267 | — | 2 | — | als braken |
| — | 274 | — | 27 | — | zoo lang als niet |
| — | 291 | — | 6 | — | te verminderen |
| — | 293 | — | 4 | — | loogzouten |
| — | 294 | — | 2 | — | pulv. rad. arnic. rec. |
| — | 295 | — | 21 | — | pulv. arnic. |
| — | 301 | — | 9 | — | verminderde |
| — | 301 | — | 26 | — | te oefenen |
| — | 302 | — | 20 | — | met |
| — | 308 | — | 15 | — | op slijm |
| — | 333 | — | 22 | — | halsbaden |
| — | 244 | — | 26 | — | verkouden |
| — | 345 | — | 3 | — | Typhus |
| — | — | — | — | — | naar. |
| — | — | — | — | — | Comatosa. |
| — | — | — | — | — | gezuiverde. |
| — | — | — | — | — | te sterke. |
| — | — | — | — | — | moet men echter |
| — | — | — | — | — | baden. |
| — | — | — | — | — | Gr. XII. |
| — | — | — | — | — | en de |
| — | — | — | — | — | verhittende. |
| — | — | — | — | — | vasten. |
| — | — | — | — | — | in zich |
| — | — | — | — | — | petechiae. |
| — | — | — | — | — | ontstekingen |
| — | — | — | — | — | door metastasis |
| — | — | — | — | — | ontstaan. |
| — | — | — | — | — | dieder hersenen |
| — | — | — | — | — | meer als alle |
| — | — | — | — | — | andere. |
| — | — | — | — | — | dr. II. |
| — | — | — | — | — | halve-baden. |
| — | — | — | — | — | Laud. Liq. Syd. |
| — | — | — | — | — | verstopten. |
| — | — | — | — | — | een zenuwtoeval |
| — | — | — | — | — | te beschouwen. |
| — | — | — | — | — | weg te nemen. |
| — | — | — | — | — | typhus nervosus |
| — | — | — | — | — | aquae cinnamo- |
| — | — | — | — | — | mi unc. I-II. |
| — | — | — | — | — | die ons de er- |
| — | — | — | — | — | varing voor de |
| — | — | — | — | — | meest. |
| — | — | — | — | — | of van eens. uk. |
| — | — | — | — | — | in de bijzondere |
| — | — | — | — | — | den zomer, |
| — | — | — | — | — | in de aanvallen. |
| — | — | — | — | — | als bloedbraken |
| — | — | — | — | — | zoo lang als men |
| — | — | — | — | — | te verhinderen. |
| — | — | — | — | — | middenzouten. |
| — | — | — | — | — | pulv. Ari rec. |
| — | — | — | — | — | pulv. ari. |
| — | — | — | — | — | veranderde. |
| — | — | — | — | — | uit te oefenen, |
| — | — | — | — | — | te bezitten. |
| — | — | — | — | — | tot |
| — | — | — | — | — | op de slijm. |
| — | — | — | — | — | halve-baden. |
| — | — | — | — | — | verhouden. |
| — | — | — | — | — | Typhus. |

| | | | |
|----------|----------|--|---|
| Pag. 352 | regel 10 | staat: halsbaden | lees: halve-baden. |
| — 357 | — 1 | intermitterenden | — remitterenden |
| | | typus | — typus. |
| — 372 | — 29 | werktuiging | — bewerktuiging |
| — 376 | — 28 | verschillenden | — verhittenden. |
| — 386 | — 29 | zingen | — zogen. |
| — 388 | — 13 | en de ziekte | — enaandezieken |
| — 401 | — 17 | de uiterste | — de geringste. |
| — 415 | — 9 | toe te nemen | — weg te nemen. |
| — 422 | — 26 | witte olie | — uit olie. |
| — 422 | — 10 | <i>Dulet</i> | — <i>Dulcet.</i> |
| — 426 | — 18 | de hulpmiddelen | — buiten de hulpmiddelen. |
| — 427 | — 5 | nuttig aangewezen | — nuttig en aangewezen. |
| — 443 | — 14 | poven | — poren |
| — 447 | — 6 | als hete ware | — als het ware. |
| — 448 | — 26 | niet | — het. |
| — 463 | — 28 | koort | — koorts. |
| — 480 | — 3 | den | — anderen van. |
| — 484 | — 2 | raauw-zenuw | — zenuw. |
| | | het zenuwen rotachtige | — het zenuw- en rotachtige, |
| — 484 | — 9 | <i>proximo</i> | — <i>proxima.</i> |
| — 494 | — 17 | door | — weer. |
| — 495 | — 16 | als anders | — als zij anders. |
| — 502 | — 17 | gehad geheel heeft | — gehad heeft. |
| — 506 | — 14 | verwarmd | — verwarme. |
| — 510 | — 18 | ligchamelijks | — ligchamelijke. |
| — 520 | — 24 | koortsverdrijven-zich vrij te waren | — koortsverdrijvende - geneeswijze. |
| — 520 | — 26 | voorzorgen, door | — voorzorgen, aan om door. |
| — 522 | — 5 | <i>asthenica synocha.</i> | — <i>Sthenica, Synocha.</i> |
| — 523 | — 5 | en aan de | — en de |
| — 524 | — 30 | na | — nu |
| — 526 | — 6 | den eer | — de meer. |
| — 526 | — 17 | met eene | — met. |
| — 527 | — 1-2 | <i>Liq. urn.</i> | — <i>Liq. corn. cervi</i> |
| — 536 | — 30 | toegediend | — toegediend worden. |
| — 537 | — | 536 | — 537. |
| — 536* | — 22 | gesteldheden | — gesteldheid. |
| — 552 | — 2 | en gebruik | — en het gebruik. |
| — 569 | — 4 | van deze | — tot deze |
| — 571 | — 8 | de om te zucht | — de zucht om te. |
| — | — 9 | toegediend | — toegekend. |
| — 590 | — 10-11 | de recidiven, en worden hierdoor ook de volkomene genezing oogenschijnlijk daardoor bevorderd. | — de recidiven, maar ook de volkomene genezing, worden er oogenschijnlijk door bevorderd. |









